




خلاصه درس



و در بازه $(1, +\infty)$ نمودار تابع $y = x^3$ پایین نمودار $y = x^3$ قرار می‌گیرد (چون اعداد بین صفر و یک هرچقدر دارای توان بیشتری باشند، مقدار کوچکتری ایجاد می‌کنند). اما در بازه $(-\infty, 1)$ نمودار $y = x^3$ از نمودار $y = x^3$ بالاتر است. در بازه $(-\infty, -1)$ نیز نمودار $y = x^3$ پایین نمودار $y = x^3$ قرار می‌گیرد.

رسم توابع درجه سوم پیچیده‌تر به کمک انتقال
به کمک قوانین انتقال نمودارها می‌توانیم توابع درجه سوم پیچیده‌تر را زیر $y = x^3$ را نیز رسم نماییم.

مثال: $y_1 = (x-2)^3$, $y_2 = x^3 - 2$, $y_3 = -x^3$ را به طور جداگانه رسم کنید.



برای رسم نمودار تابع $y_2 = x^3 - 2$, باید نمودار $y = x^3$ را دو واحد به سمت پایین انتقال دهیم.

و در پایان، برای رسم نمودار تابع $y_3 = -x^3$ را نسبت به محور x ها قرینه کنیم.

نوع صعودی و نوع نزولی

تعريف: تابع f را در بازه‌ای مانند I صعودی گوییم، هرگاه برای هر x_1 و x_2 عضو بازه I داشته باشیم:

به طور مشابه، تابع f را روی بازه I نزولی می‌نامیم، هرگاه برای هر x_1 و x_2 در این بازه داشته باشیم:

تابع یکنوا، اگر تابع f در بازه I صعودی یا نزولی باشد، آن‌گاه گوییم f بر این بازه یکنواست.

تابع اکیدا یکنوا، اگر تابع f در بازه I ، اکیداً صعودی یا اکیداً نزولی باشد، آن‌گاه گوییم f بر این بازه اکیدا یکنواست (روی نمودار تابع اکیدا یکنوا حتی دو نقطه که دارای عرض‌های یکسان باشند هم پیدا نمی‌کنیم).

فکر: هر تابع اکیداً صعودی (اکیداً نزولی)، صعودی (نزولی) هم محسوب می‌شود. اما عکس این مطلب لزوماً درست نیست. یعنی هر تابع صعودی (نزولی) را نمی‌توان اکیداً صعودی (اکیداً نزولی) محسوب کرد.

فصل ۱: تابع

درس اول: توابع چندجمله‌ای

تعریف تابع چندجمله‌ای

صورت کلی این گونه از توابع به زبان ریاضی به شکل زیر است:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \quad (a_n \neq 0)$$

که در آن ضریب‌های a_0, \dots, a_n اعدادی حقیقی و توان‌ها اعدادی حسابی هستند.

به بیان ساده، در تابع چندجمله‌ای، متغیر، زیر رادیکال یا در مخرج کسر با در توان قرار ندارد. برای نمونه تابع $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = \sqrt[3]{x}$ و $h(x) = x^{\frac{1}{3}}$ چندجمله‌ای نیستند، اما تابع $y = \frac{1}{3}x^3 + 2x^2$ چندجمله‌ای محسوب می‌شوند.

انواع چندجمله‌ای‌ها

به طور کلی، نوع یک تابع چندجمله‌ای با توجه به بزرگترین توان متغیر آن مشخص می‌گردد. بزرگترین توان متغیر در یک چندجمله‌ای را درجه آن چندجمله‌ای می‌نامیم.

تاکنون با چندجمله‌ای‌های درجه اول یا تابع خطی و درجه دوم یا سهمی‌ها آشنا شده‌ایم. اکنون می‌خواهیم با چندجمله‌ای‌های درجه سوم به فرم کلی $f(x) = a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ (با $a_3 \neq 0$) آشنا شویم.

چندجمله‌ای‌های معروف:

۱) تابع خطی:

(الف) تابع ثابت:

(ب) تابع همانی:

۲) تابع درجه دوم (سهمی‌ها):

۳) تابع درجه سوم:

بررسی تابع $y = x^3$ و ویژگی‌های آن

نمودار این تابع به شکل مقابل است:

■ دامنه و بُرد این تابع هر دو \mathbb{R} هستند.


■ نمودار این تابع نسبت به مبدأ مختصات متقارن است، یعنی اگر از هر نقطه روی این نمودار به مبدأ وصل کرده و به اندازه خود امتداد دهیم، به نقطه‌ای دیگر از همان نمودار می‌رسیم.

■ این تابع یکبهیک و در نتیجه وارون پذیر است.


مقایسه نمودار دو تابع $y = x^3$ و $y = x^2$: همان‌طور که در نمودار رویه رو می‌بینیم، این دو تابع دارای دو نقطه تقاطع هستند. زیرا داریم:

$$x^3 = x^2 \Rightarrow x^3 - x^2 = 0$$

$$\Rightarrow x^2(x-1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ x=1 \end{cases}$$



سهمی، اگر صفحه P در یکی از موقعیت‌ها با مولد سطح مخروطی، موازی باشد و از رأس عبور نکند، شکل حاصل یک سهمی است. در ادامه از بین مقاطع مخروطی، بیضی و دایره را مورد بحث قرار خواهیم داد.




مجموعه نقاطی از صفحه است که مجموع فواصل آن‌ها از دو نقطه ثابت واقع در صفحه، برابر با مقداری ثابت است. در بیضی زیر، مجموع فواصل نقطه M (واقع بر بیضی) از دو نقطه ثابت F و F' که به آن‌ها کانون می‌گوییم، مقدار ثابتی است. فرض کنیم این مقدار ثابت $2a$ باشد، یعنی:

$MF + MF' = 2a$

MF و MF' را شعاع‌های حامل نقطه M می‌نامیم. AA' را قطر بزرگ بیضی می‌نامیم و طول آن برابر با $2a$ می‌باشد. BB' را قطر کوچک بیضی می‌نامیم و طول آن را برابر با $2b$ فرض می‌کنیم. FF' را فاصله کانونی بیضی می‌نامیم و طولش را $2c$ فرض می‌کنیم.

O مرکز بیضی است و وسط AA' , BB' و FF' قرار دارد. رابطه طلایی بیضی، در مثلث قائم‌الزاویه OBF ، طبق رابطه فیثاغورس داریم:

$$a^2 = b^2 + c^2$$



از این رابطه نتیجه می‌گیریم که در بیضی $a > b$ و $a > c$ است. در بیضی اگر قطر بزرگ (AA') افقی باشد، آن‌گاه بیضی را افقی می‌نامیم و چنانچه قطر بزرگ، عمودی باشد بیضی را قائم می‌نامیم.

خروج از مرکز بیضی، خروج از مرکز، پارامتری است که انحنای بیضی را با دایره مقایسه می‌کند و به صورت مقابل تعریف می‌شود:

$$e = \frac{c}{a}$$

از آنجا که $c < a$ مقادیری مثبت‌اند و $c < a$ است، خروج از مرکز بیضی همواره عددی بین صفر و یک است. یعنی:

$$\frac{c}{a} < 1$$

هرقدر $\frac{c}{a}$ به یک نزدیک‌تر شود ($a \rightarrow c$), بیضی کشیده‌تر می‌شود و هرقدر

$\frac{c}{a}$ به صفر نزدیک شود ($a \rightarrow 0$), شکل بیضی به دایره شبیه‌تر می‌شود.

مثال کانون‌های یک بیضی نقاط $(3, 1)$ و $(-5, 1)$ است. الف) فاصله کانونی، مختصات مرکز بیضی و معادله قطرهای کوچک و بزرگ بیضی را بنویسید.
ب) اگر $a = 5$ باشد، اندازه قطر کوچک، بزرگ و خروج از مرکز بیضی را بیابید.

پاسخ الف) چون عرض کانون‌ها برابرند، پس بیضی، افقی است و داریم: $FF' = 3 - (-5) = 8 \Rightarrow 2c = 8 \Rightarrow c = 4$

مثال مستطیلی با ابعاد ۳ و ۴ واحد را حول طول آن دوران داده‌ایم. ابتدا شکل حاصل رارسم کنید. سپس تعیین کنید اگر صفحه‌ای یکبار موازی با قاعده شکل به وجود آمده و بار دیگر عمود بر آن، شکل را قطع کند، بیشترین مساحت سطح مقطع‌های حاصل چقدر خواهد بود؟

پاسخ شکل حاصل یک استوانه به ارتفاع ۴ و شعاع قاعده ۳ واحد خواهد بود. حال اگر صفحه‌ای موازی با قاعده استوانه (عمود بر محور) آن را قطع کند، سطح مقطع حاصل یک دایره خواهد بود (نظریه استوانه) و مساحت آن برابر است با:


$$S = \pi R^2 \Rightarrow S = \pi \times (3)^2 = 9\pi$$

اما اگر صفحه، عمود بر قاعده استوانه (موازی با محور) آن را قطع کند، سطح مقطع حاصل یک مستطیل خواهد بود. برای آن که مساحت این مستطیل ماکزیمم شود، باید شامل محور استوانه (h) باشد. در این حالت، مساحت آن برابر است با:

$$S = 4 \times 6 = 24 \Rightarrow S = \text{عرض} \times \text{طول} =$$

۲- آشنایی با مقاطع مخروطی


سطح مخروطی، دو خط متقطع d و ℓ را در شکل مقابل در نظر بگیرید.



اگر خط d را حول خط ℓ دوران دهیم، شکل حاصل یک سطح مخروطی خواهد بود که در آن، خط ثابت (یعنی ℓ) را محور دوران، خط متحرک (یعنی d) را مولد و نقطه تقاطع d و ℓ (یعنی نقطه A) را رأس سطح مخروطی می‌گوییم.

مقاطع مخروطی، شکل‌های حاصل از تقاطع یک صفحه با سطح مخروطی در حالات مختلف را مقاطع مخروطی می‌نامیم که عبارت‌اند از: دایره، بیضی، هذلولی و سهمی.

دایره، اگر صفحه P بر محور سطح مخروطی عمود باشد و از رأس آن عبور نکند، شکل حاصل دایره است.



بیضی، اگر صفحه P بر محور سطح مخروطی عمود نباشد و در هیچ حالتی با مولد سطح مخروطی موازی نشود و از رأس نگذرد، شکل حاصل، بیضی خواهد بود.

هذلولی، اگر صفحه P سطح مخروطی را هم در قسمت بالایی و هم در قسمت پایینی قطع کند و از رأس آن عبور نکند، شکل حاصل را هذلولی می‌نامیم.

ردیف	نمره	سوالات
فصل اول		
۱	۰/۵	درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را تعیین کنید. الف) اگر $k > 1$ باشد، نمودار $y = f(kx)$ از ابساط افقی نمودار $y = f(x)$ در راستای محور x ها بهدست می‌آید. ب) تابع $y = \frac{1}{x}$ در دامنه خود یکنوا است.
۲	۰/۲۵	نقطه $(-2, -4)$ واقع بر نمودار $y = f(x)$ در نمودار تابع $y = f(2x) + 1$ است.
۳	۱	با توجه به نمودار تابع f که در رویه رو رسم شده است، معین کنید: برنکار الف) f در چه بازه‌ای صعودی است و در کدام بازه نزولی است؟ ب) f در کدام بازه صعودی و در کدام بازه نزولی است. اما اکیداً صعودی یا اکیداً نزولی نیست؟
۴	۱/۲۵	به کمک نمودار $y = \sin x$ و قوانین انتقال نمودارها، نمودار تابع $y = -2\sin(\frac{1}{3}x)$ را در بازه $[-\pi, \pi]$ رسم کنید. برنکار
۵	۰/۵	تابع $\{(1, -1), (-2, -1), (-1, 0), (0, 1), (1, 0), (2, -1)\}$ صعودی است یا نزولی؟ چرا؟
۶	۱/۲۵	تابع $y = x^3 + ax^2 - bx + c$ به اندازه دو واحد در امتداد محور طول‌ها به سمت چپ و سه واحد در امتداد محور عرض‌ها به سمت پایین است. مقادیر a , b و c را باید.
۷	۱/۲۵	ابتدا صابطه تابع وارون $y = f(x) = x^3 - 2x$ را با شرط $(-\infty, 1) = D_f$ بیابید. سپس نمودار $(f^{-1})^{-1}(x)$ را رسم کنید.
۸	۱/۲۵	اگر $f(x) = \frac{x+2}{x^2-1}$ و $g(x) = \{(1, -2), (0, 1), (-2, 0)\}$ باشند، آن‌گاه تابع $g \circ f$ را مشخص کنید.
فصل دوم		
۹	۱	صابطه تابعی به شکل $y = a \sin bx + c$ را بنویسید که ماکزیمم آن -2 ، مینیمم آن 2 و دوره تناوبش 2 باشد. برنکار
۱۰	۱/۲۵	معادله مثلثاتی $-1 = \cos 2x + 3 \cos x$ را حل کنید و جواب‌های کلی آن را بنویسید. برنکار
۱۱	۱	مثلثی با مساحت 3 سانتی‌متر مربع مفروض است. اگر اندازه دو ضلع آن 2 و 6 واحد باشد، آن‌گاه چند مثلث با این مشخصات می‌توان رسم کرد؟ برنکار
۱۲	۰/۲۵	درستی یا نادرستی عبارت زیر را تعیین کنید. نقاطی به فرم $x = k\pi + \frac{\pi}{2}$: $k \in \mathbb{Z}$ در دامنه تانژانت قرار ندارند. برنکار
۱۳	۰/۲۵	جهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. الف) اگر $\alpha \in (0, 2\pi)$ باشد، آن‌گاه $\tan \alpha = \frac{3\pi}{2}$ است. $\sin \alpha$ است.
۱۴	۰/۵	ب) دوره تناوب تابع $y = 3 \cos(2x) + 5$ برابر با است. گزینه درست را انتخاب کنید.
۱۴	۰/۵	الف) کمترین مقدار تابع $y = 1 - \sin x \cos x$ در کدام است؟ $-\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 -1


ردیف	سوالات	نمره
۱۰	مشتق تابع‌های زیر را به دست آورید. (ساده کردن مشتق الزامی نیست). پرتابل الف $f(x) = \frac{3x+1}{\sqrt{x}}$ ب $g(x) = \left(\frac{1}{x}\right)(x^4 + 5x)^7$	۱/۷۵
۱۱	خودرویی در امتداد خط راست طبق معادله $d(t) = -5t^2 + 24t - 5$ حرکت می‌کند. که در آن $t \leq 5$ سرعت لحظه‌ای در $t = 2$ چقدر است؟ پرتابل	۰/۵
۱۲	اکسترمم‌های مطلق تابع $f(x) = x^3 - 3x + 2$ در بازه $[-1, 3]$ را در صورت وجود به دست آورید. پرتابل	۱/۵
۱۳	دو عدد حقیقی باید که تفاصل آن‌ها ۲۰ باشد و حاصل ضربشان کمترین مقدار ممکن گردد. پرتابل	۱/۲۵
۱۴	بخش انتخابی دانش آموز هر یز جهت کسب ۴ نمره از سوالات ۱۴ تا ۲۱ فقط ۴ سوال را به دلخواه انتخاب و پاسخ دهید. تابع $f(x) = -\frac{7}{2}x - 3$ را به دست آورید. پرتابل	۱
۱۵	مقدار $\sin 15^\circ$ را باید. پرتابل	۱
۱۶	با توجه به نمودار $y = f(x)$. پرتابل الف) حدود خواسته شده را بنویسید. ۱) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ۲) $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x)$ ب) تابع $y = f(x)$ در کدام نقطه یا نقاط مشخص شده، مشتق پذیر نیست؟	۱
۱۷	اگر تابع $f(x) = ax^3 + bx$ در $x = 1$ دارای اکسترمم تسبیبی برابر ۳ باشد، مقادیر a و b را باید. پرتابل	۱
۱۸	در هر قسمت، عبارت مناسب را انتخاب کنید. الف) اگر صفحه‌ای بر محور سطح مخروطی همود تباشد و در هیچ حالتی با مولد سطح مخروطی موازی نشود و از رأس نگذرد، شکل حاصل از تقاطع صفحه با سطح مخروطی خواهد بود. (بیضی - سهمی - هذلولی) پرتابل ب) اگر خروج از مرکز بیضی به صفر نزدیک شود، شکل بیضی به شکل تزدیک خواهد شد. (پاره خط - دایره - نقطه) پرتابل پ) دو پیشامد A و B را گوییم هرگاه وقوع B بر احتمال وقوع A بر احتمال A تأثیری نداشته باشد. (مستقل - ناسازگار - سازگار) پرتابل ت) احتمال وقوع پیشامد A به شرط اینکه بدایمی پیشامد B رخ داده است، به صورت تماش داده می‌شود. پرتابل $(P(A - B), P(A B), P(B A))$	۱
۱۹	کانون‌های یک بیضی نقاط $(2, 5)$ و $(-2, 5)$ است. مختصات مرکز و اندازه قطر کوچک بیضی را پیدا کنید. پرتابل	۱
۲۰	معادله دایره‌ای را بنویسید که بر خط $3x + 4y = 1$ عباس بوده و مرکز آن $(1, 2)$ باشد.	۱
۲۱	اگر احتمال انتقال نوعی بیماری عفوی به نوزاد پسر 0.7 و نوزاد دختر 0.4 باشد و خانواده‌ای منتظر به دنیا آمدن فرزندی باشند، با چه احتمالی نوزاد آنها به بیماری مذکور مبتلا خواهد شد؟ پرتابل	۱
۲۴	جمع نمره	۲۴



پاسخنامه تشریحی



در آخر قسمت واقع در بازه $[\pi, \pi]$ را از نمودار می‌بریم:



(فصل ۱ / تبدیل توابع)

۵ ابتدا x ها را مرتب می‌نویسیم:

$$x \Rightarrow -2, -1, 1, 3 \quad (\text{۰/۲۰})$$

$$y \Rightarrow -1, 0, 1, 2 \quad (\text{۰/۲۰})$$

سپس عرض هر کدام را زیرش قرار می‌دهیم:

همان‌طور که می‌بینیم تابع صعودی است (۰/۲۰)

(فصل ۱ / یکتوانی)

۶

$$f(x) = x^3 \xrightarrow{\substack{\text{۲ واحد انتقال افقی} \\ \text{به سمت چپ}}} y = (x+2)^3 \quad (\text{۰/۲۰})$$

$$\xrightarrow{\substack{\text{۳ واحد انتقال صعودی} \\ \text{به پایین}}} y = (x+2)^3 - 3 \Rightarrow y = x^3 + 6x^2 + 12x + 5 \quad (\text{۰/۲۰})$$

$$\xrightarrow{\text{مقایسه}} a = 6 \quad (\text{۰/۲۰}), b = -12 \quad (\text{۰/۲۰}), c = 5 \quad (\text{۰/۲۰})$$

(فصل ۱ / تبدیل توابع)

۷


$$y = (x^3 - 4x^2 + 1) - 1 \quad (\text{۰/۲۰})$$

$$\Rightarrow y = (x-1)^3 - 1 \Rightarrow y+1 = (x-1)^3 \Rightarrow \sqrt{y+1} = |x-1| \quad (\text{۰/۲۰})$$

$$\xrightarrow{x < 1} \sqrt{y+1} = -x+1 \quad (\text{۰/۲۰})$$

$$\Rightarrow x = 1 - \sqrt{y+1} \Rightarrow f^{-1}(x) = 1 - \sqrt{x+1} \quad (\text{۰/۲۰})$$

می‌دانیم: $(f^{-1} \circ f)(x) = x; x \in D_f$



(فصل ۱ / تابع وارون)

۸

$$g^{-1} = \{(-2, 1), (1, -2), (-1, 0)\} \quad (\text{۰/۲۰})$$

$$x = -2 \Rightarrow g^{-1}(-2) = 1$$

$$\Rightarrow f(g^{-1}(-2)) = f(1) = \frac{1+2}{(1)^2 - 1} = \frac{3}{0} \quad \text{تعريف نشده} \quad (\text{۰/۲۰})$$

$$x = 1 \Rightarrow g^{-1}(1) = -2 \Rightarrow f(g^{-1}(1)) = f(-2) = -2 \Rightarrow (1, -2) \quad (\text{۰/۲۰})$$

$$x = -1 \Rightarrow g^{-1}(-1) = 0 \Rightarrow f(g^{-1}(-1)) = f(0) = 0 \Rightarrow (0, 0) \quad (\text{۰/۲۰})$$

$$\Rightarrow f \circ g^{-1} = \{(1, -2), (0, 0)\}$$

(فصل ۱ / ترکیب توابع)

امتحان ۱ - نوبت اول



۱ الف) نادرست (اگر $k > 1$ باشد، منحنی در راستای افقی منقبض می‌شود). (فصل ۱ / تبدیل توابع) (۰/۲۰)

ب) نادرست (تابع $y = \frac{1}{x}$ در بازه‌های $(-\infty, 0)$ و $(0, +\infty)$ به طور جداگانه اکیداً نزولی است، ولی در دامنه‌اش غیریکنواست). (فصل ۱ / یکتوانی) (۰/۲۰)

۲ (۱, -1) (فصل ۱ / تبدیل توابع) (۰/۲۰)


۲ الف) f در بازه $(2, 3)$ نزولی اکید و در بازه $(3, 4)$ صعودی اکید است.



ب) f در بازه $(0, 2)$ نزولی است اما اکیداً نزولی نیست، همچنین f در بازه $(3, +\infty)$ صعودی است اما اکیداً صعودی نیست. (فصل ۱ / یکتوانی) (۰/۲۰)



۴ ابتدا نمودار $y = \sin x$ را در بازه $[-\pi, \pi]$ رسم می‌کنیم:



سپس آن را در راستای افقی با ضریب ۳ منبسط می‌کنیم، بعد در راستای عمودی با ضریب ۲ منبسط می‌کنیم و در آخر تسبیت به محور x ها قرینه می‌کنیم:

