

مقدمه مؤلف

و اما خان دوازدهم

دوران مدرسه با همه خاطرات تلخ و شیرین، قهرها و آشتی‌ها، اشکها و لبخندها آرام، آرام به روزهای آخرش نزدیک و نزدیکتر می‌شود و تو با اندوخته‌ای که از این سال‌ها کسب کرده‌ای، آماده ورود به مرحله جدیدی از زندگی خود می‌شوی؛ مرحله‌ای که در آن، جامعه از تو انتظار دارد تا خوب زندگی کنی و برای دیگران هم شرایط خوب زندگی کردن را فراهم کنی.

انتخاب رشته علوم انسانی مسئولیت شما را در این مرحله دوچندان می‌کند. اکثر مشکلات و نابسامانی‌های موجود در جامعه ما ریشه در کم‌توجهی و گاه‌آیی توجهی به علوم انسانی دارد و ورود شما به این عرصه با اندیشه‌های نو، ما را به آینده امیدوارتر می‌کند. من در کنار خانواده بزرگ خیلی سبز، تمام تلاشمان را کردیم تا کتاب حاضر به بهترین شکل ممکن به دست شما عزیزان برسد و بتواند کمک حال شما در رسیدن به اهداف بزرگتان باشد.

چند توصیه برای استفاده مؤثر از این کتاب:

- ۱- لطفاً بدون قلم و کاغذ سراغ این کتاب نیایید.
- ۲- با توجه به پیوستگی مطالب ریاضی لطفاً از وسط یک فصل شروع به مطالعه نکنید.
- ۳- در مثال‌های حل شده درس‌نامه، بعد از بررسی کامل پاسخ سؤال، سعی کنید بار دوم بدون نگاه به پاسخ، آن را به طور کامل حل کنید.
- ۴- بعد از مطالعه کامل درس‌نامه به سراغ نمونه سؤالات امتحانی آن بروید. در این مرحله با دقت خیلی زیاد صورت سؤال را بخوانید و هر چیزی که به ذهنتان می‌رسد را یادداشت کنید و سعی کنید با استفاده از آن‌ها به پاسخ مسئله برسید. در صورت نیاز، پاسخ‌های تشریحی این قسمت هم می‌تواند به شما کمک کند. لطفاً در این مرحله همان اول کار به سراغ پاسخ‌نامه نروید.
- ۵- سؤالاتی که در قسمت قبل به کمک پاسخ‌نامه حل کردید را علامت بزنید تا در فرصتی دیگر دوباره آن‌ها را حل کنید.
- ۶- بعد از مطالعه و تسلط روی هر فصل، می‌توانید آموخته‌های خودتان را با آزمون جمع‌بندی آخر فصل بسنجید. از خودتان آزمون بگیرید و سپس با اسکن QRcode موجود در شناسنامه کتاب حل ویدئویی سؤالات آزمون را ببینید.

توصیه‌های مشاوره‌ای:

- ۱- استفاده از جملات با بار معنایی منفی مانند «رباضی درس سختی است و من نمی‌توانم یاد بگیرم» را به طور کامل کنار بگذارید. حتی اگر سال‌های قبل نتیجه مناسبی کسب نکرده‌اید.
- ۲- با مطالعه مستمر در طول سال تحصیلی از انباشته‌شدن مطالب برای روزهای امتحان جلوگیری کنید.
- ۳- هر چند وقت یک بار به سؤالاتی که در حل آن‌ها دچار مشکل شده‌اید مراجعه و دوباره آن‌ها را بررسی کنید.

این اثر که حاصل کار گروهی افراد ارزشمندی با تخصص‌های مختلف از تایپ، صفحه‌بندی، ویراستاری، طراحی جلد، چاپ و ... است. (می‌توانید نام برخی از این دوستان ارزشمند را در صفحه اول کتاب مشاهده کنید) که تلاش در کنار آن‌ها باعث افتخار من است. از تمامی تلاش‌های این عزیزان قدردانی می‌کنم و سپاسگزارم.

همیشه سبز باشید

فرشاد پورالیاس



آمار و احتمال

۱
۷
۱۱
۱۸
۲۳
۳۳
۳۹
۴۶
۵۲

فصل اول: آمار و احتمال

- درس ۱: شمارش
- درس ۲: جایگشت
- درس ۳: ترکیب r تایی از n شیء
- درس ۴: پدیده‌های تصادفی و قطعی
- درس ۵: احتمال یک پیشامد
- درس ۶: چرخه آمار در حل مسائل (قسمت اول)
- درس ۷: چرخه آمار در حل مسائل (قسمت دوم)
- پاسخ سوال‌های امتحانی

الگوهای خطی

۶۴
۶۴
۷۵
۷۹
۸۳
۸۹

فصل دوم: الگوهای خطی

- درس ۱: مدل‌سازی و دنباله
- درس ۲: نمودار دنباله‌ها
- درس ۳: دنباله‌های حسابی
- درس ۴: ضابطه بازگشته دنباله‌های حسابی
- پاسخ سوال‌های امتحانی

الگوهای غیرخطی

۹۹
۹۹
۱۰۵
۱۱۰
۱۱۶
۱۲۲

فصل سوم: الگوهای غیرخطی

- درس ۱: دنباله هندسی
- درس ۲: واسطه هندسی
- درس ۳: ریشه n ام و توان گویا
- درس ۴: تابع نمایی
- پاسخ سوال‌های امتحانی

شماره صفحه امتحان شماره صفحه پاسخ

۱۳۲	۱۳۰	نمونه امتحان نیمسال اول: امتحان شماره ۱
۱۳۶	۱۳۴	نمونه امتحان نیمسال اول: امتحان شماره ۲
۱۴۰	۱۳۸	نمونه امتحان نیمسال دوم: امتحان شماره ۳ (خرداد ۱۴۰۱)
۱۴۳	۱۴۱	نمونه امتحان نیمسال دوم: امتحان شماره ۴ (خرداد ۱۴۰۰)
۱۴۶	۱۴۴	نمونه امتحان نیمسال دوم: امتحان شماره ۵ (شهریور ۱۴۰۰)
۱۴۸	۱۴۷	نمونه امتحان نیمسال دوم: امتحان شماره ۶ (دی ۱۴۰۰)

آمار احتمال

فصل اول



شمارش ۱

شمارش یعنی شمردن! فب، شمردن پی؟ شمردن تعداد حالتها و انتخاب‌هایی که می‌تواند در هر مسئله‌ای اتفاق بیفتد. فب می‌شینیم می‌شمریم!!! ای بابا در این درس می‌خواهیم تکنیک‌هایی برای شمارش سریع‌تر و دقیق‌تر حالتها یاد بگیریم. توصیه من به شما قبل از واردشدن به این درس این است که اصلاً در پاسخگویی به سوالات عجله نکنید و در صورت نیاز چندین بار صورت سوال را با صبر و حوصله بخوانید.

اصل جمع

در منوی یک کافی‌شاب، سه نوع بستنی و چهار نوع قهوه وجود دارد و شما تصمیم دارید بستنی «یا» قهوه میل کنید. به چند طریق می‌توانید این انتخاب را انجام دهید؟

با توجه به این که فقط یک نوع بستنی یا یک نوع قهوه انتخاب خواهد کرد، کافی است تعداد بستنی‌ها را با تعداد قهوه‌ها جمع کنید؛ یعنی شما $= 7$ + ۴ انتخاب دارید. در این سوال ما از اصل جمع استفاده کردیم.

اصل جمع: اگر عملی را بتوان به m طریق و عمل دیگری را بتوان به n طریق انجام داد، به طوری که این دو عمل را نتوانیم با هم انجام دهیم، آن‌گاه به $m + n$ طریق می‌توان عمل اول «یا» عمل دوم را انجام داد.

توجه: قبل از استفاده از اصل جمع در صورت سوال به دنبال لفظ «یا» و یا مفهومی باشید که این دو عمل همزمان انجام نشوند.

مثال: میترا به چند طریق می‌تواند فقط یک تبلت «یا» یک گوشی از بین ۱۲ تبلت و ۱۵ گوشی موجود در فروشگاه خریداری کند؟

پاسخ: در صورت مسئله از لفظ «یا» استفاده شده است. هم‌چنین با توجه به صورت سوال فقط یکی از دو عمل خرید تبلت یا خرید گوشی اتفاق خواهد افتاد؛ پس با توجه به اصل جمع $= 27 = 12 + 15$ حالت خرید برای میترا از این فروشگاه وجود دارد.

مثال: دبیر ورزش قصد دارد از ۷ نفر دانش‌آموز پایه دوازدهم و ۱۲ نفر دانش‌آموز پایه یازدهم فقط یک نفر را به عنوان سرگروه ورزشی انتخاب کند. این کار به چند طریق امکان‌پذیر است؟

پاسخ: در این سوال خبری از لفظ «یا» نیست. اما با توجه به این که فقط یک نفر قرار است از پایه دوازدهم یا یازدهم انتخاب شود و این عمل نمی‌تواند همزمان اتفاق بیفتد (یعنی سرگروه انتخاب‌شده نمی‌تواند هم از پایه یازدهم و هم از پایه دوازدهم باشد)، با توجه به اصل جمع تعداد نفرات هر دو پایه را با هم جمع می‌کنیم.

$19 = 7 + 12$ حالت برای انتخاب سرگروه وجود دارد.

تعمیم اصل جمع: اصل جمع را می‌توان برای بیشتر از دو عمل نیز به کار برد. به شرطی که این عمل‌ها را نتوانیم همزمان انجام دهیم.

مثال می خواهیم از بین ۱۰ خودروی سواری، ۱۲ خودروی وانت و ۶ خودروی کامیون یک خودرو انتخاب کنیم. به چند طریق می توانیم این خودرو را انتخاب کنیم؟


(نهایی شوربیر ۹۹)

پاسخ با توجه به این که قرار است یک خودرو از این سه نوع خودرو انتخاب شود و این کار نمی تواند هم زمان اتفاق بیفتد (خودروی انتخاب شده سواری یا وانت یا کامیون است) طبق اصل جمع داریم:

$$10 + 12 + 6 = 28$$

انتخاب یک خودرو از خودروهای موجود به ۲۸ طریق ممکن است.

اصل ضرب



دوباره به همان کافی شاپی که ۳ نوع بستنی و ۴ نوع قهوه داشت می رویم و این بار شما قصد دارید یک نوع بستنی «و» یک نوع قهوه میل کنید. به چند طریق می توانید این انتخاب را انجام دهید؟

برای روش ترشدن موضوع، بستنی ها و قهوه های موجود را شماره گذاری می کنیم و آن ها را در نمودار درختی نمایش می دهیم.

برای رسم نمودار درختی، ابتدا در مرحله اول بستنی ها را نوشتیم (انتخاب بستنی) و در مرحله دوم قهوه ها را قرار دادیم (انتخاب قهوه). با توجه به نمودار در کل ۱۲ حالت داریم که با ضرب کردن تعداد بستنی ها در تعداد قهوه ها، تعداد حالت های انتخاب یک نوع بستنی و یک نوع قهوه به دست می آید. $12 \times 4 = 48$ یعنی کسی که بستنی «۱» را انتخاب می کند، ۴ حالت برای انتخاب قهوه دارد. روشی که در به دست آوردن تعداد حالت ها استفاده کردیم اصل ضرب نام دارد.

برای درک بیشتر اصل ضرب به کافی شاپ مخلوط ببرید و انواع بستنی «و» قهوه ها را میل کنید و تعداد حالت ها را بشمرید و بعد با دندان های ترک فورده به دندان پزشکی مراجعه کنید. ☺

اصل ضرب: اگر عملی طی دو مرحله انجام پذیرد، طوری که در مرحله اول به m طریق «و» مرحله دوم به n طریق انجام پذیر باشند، در کل آن عمل به $m \times n$ طریق انجام پذیر است.

توجه: قبل از استفاده از اصل ضرب در صورت سوال به دنبال لفظ «و» یا مفهومی باشید که انتخاب ها مرحله به مرحله انجام شود.

مثال میترا به چند طریق می تواند یک تبلت «و» یک گوشی از بین ۱۲ تبلت و ۱۵ گوشی موجود در فروشگاه خریداری کند؟

پاسخ در صورت مسئله لفظ «و» بین تبلت و گوشی مشاهده می شود. همچنین با توجه به صورت مسئله، در مرحله اول باستی تبلت و در مرحله دوم گوشی انتخاب شود؛ پس طبق اصل ضرب $12 \times 15 = 180$ انتخاب برای خرید یک گوشی و یک تبلت برای میترا وجود دارد.

مثال با توجه به شکل مقابل به چند طریق می توان از شهر A به شهر C سفر کرد؟


پاسخ برای سفر از شهر A به C، در مرحله اول از A به B (۳ حالت) و در مرحله دوم از B به C (۴ حالت) را باید طی کرد. پس طبق اصل ضرب:

$$\begin{array}{c} 3 \\ \times \\ 4 \\ = 12 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ \text{مسیرها از} \\ B \text{ به } A \quad C \text{ به } B \end{array}$$

تعیین اصل ضرب: اصل ضرب را می توان برای بیشتر از دو عمل نیز به کار برد به شرطی که هر کدام از آن ها مرحله به مرحله انجام بگیرد.

مثال تعداد حالت های ممکن برای رمزگذاری کیف مقابل را به دست آورید. رمز این کیف شامل سه

رقم است که هر کدام می تواند یکی از رقم های صفر تا ۹ باشد.



پاسخ تعداد ارقام صفر تا ۹ برابر ۱۰ است. برای رمزگذاری این کیف هر کدام از قسمت ها مرحله به مرحله باید انجام گیرد. پس طبق اصل ضرب، تعداد حالت های هر کدام از مراحل را در هم ضرب می کنیم.

$$10 \times 10 \times 10 = 1000$$

مثال تعداد حالت های پاسخگویی به پنج سؤال یک آزمون چهار گزینه ای را در شرایط زیر به دست آورید.

الف) پاسخگویی به سؤالات اجباری باشد.

پاسخ الف پاسخگویی به سؤالات اجباری است و آزمون چهار گزینه ای یعنی حتماً یکی از گزینه های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) انتخاب خواهد شد؛

پس هر سؤال ۴ حالت دارد و همچنین به سؤالات مرحله به مرحله پاسخ داده می شود. طبق اصل ضرب داریم:

$$4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 = 4^5$$

پ پاسخگویی به سؤالات اختیاری است، یعنی علاوه بر گزینه های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) یک حالت دیگر پاسخ ندادن به سؤال (اختیاری است و اجباری نیست) اضافه می شود. پس برای هر سؤال ۵ حالت وجود دارد. پس طبق اصل ضرب داریم:

$$5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 5^5$$



سؤالهای امتحانی

- ۹- درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید.
- الف) در جایگشت r تایی از n شیء متمایز جایه‌جایی اشیا اهمیت ندارد.
- ب) تعداد جایگشت‌های r تایی n شیء متمایز برابر $\frac{n!}{(n-r)!}$ است.
- ۱۰- جاهای خالی را کامل کنید.
- (نهایی شهریور ۹۹) الف) هر حالت از کنار هم قرار گرفتن ۵ شیء متمایز را یک از آن ۵ شیء می‌نامیم.
- (نهایی دی ۹۹ و فروردین ۱۴۰۰) ب) تعداد جایگشت‌های n تایی از n شیء متمایز برابر است.
- پ) انتخاب r شیء از n شیء وقتی ترتیب و جایه‌جایی در انتخاب‌ها مهم باشد. r تایی از n شیء نامیده می‌شود.
- (نهایی فروردین ۱۴۰۰) ت) حاصل عبارت $P(2,2)$ برابر است.
- ۱۱- با توجه به حروف انگلیسی A, B, C, D, E و F به سؤالات زیر پاسخ دهید.
- الف) تعداد کل جایگشت‌های این ۶ حرف را به دست آورید.
- ب) تعداد جایگشت‌های ۶ تایی که A و B کنار هم باشند را به دست آورید.
- پ) تعداد جایگشت‌های ۶ تایی که D دقیقاً بعد از C بیاید را به دست آورید.
- ۱۲- ۳ دانش‌آموز پایهٔ یازدهم و ۴ دانش‌آموز پایهٔ دوازدهم به چند طریق می‌توانند در یک صفت باشند به طوری که:
- الف) دانش‌آموزان پایهٔ یازدهم در کنار هم باشند.
- ب) دانش‌آموزان پایهٔ یازدهم در کنار هم و دانش‌آموزان پایهٔ دوازدهم در کنار هم باشند.
- پ) دانش‌آموزان پایهٔ یازدهم و پایهٔ دوازدهم یک‌درمیان در صفت باشند.
- ۱۳- با حروف کلمه «برجام» و بدون تکرار حروف: (بامعنى یا بى معنى)
- الف) چند کلمهٔ ۵ حرفی می‌توان نوشت؟
- ب) چند کلمهٔ ۴ حرفی می‌توان نوشت؟
- پ) چند کلمهٔ ۳ حرفی می‌توان نوشت که به «م» ختم شود؟
- ت) چند کلمهٔ ۴ حرفی می‌توان نوشت که با «ب» شروع و به «ج» ختم شوند؟
- ۱۴- با حروف کلمه «انسانی» چند کلمهٔ ۶ حرفی متمایز می‌توان نوشت؟
- ۱۵- با حروف کلمه «خورشید» و بدون تکرار حروف: (بامعنى یا بى معنى)
- الف) چند کلمهٔ ۳ حرفی می‌توان نوشت که به «د» ختم شوند؟
- ب) چند کلمهٔ ۴ حرفی می‌توان نوشت که با «ی» شروع و به «خ» ختم شوند؟
- ۱۶- در یک لیگ فوتبال با ۱۴ تیم که بازی‌ها به صورت رفت و برگشت انجام می‌شود، چند بازی باید انجام شود؟
- ۱۷- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.
- الف) $P(6,2)$
- ب) $P(4,4)$
- پ) $P(5,3)$
- ۱۸- با ارقام ۱, ۲, ۴, ۶, ۷, ۸ و ۹ چند عدد سه‌رقمی بدون تکرار ارقام می‌توان نوشت؟
- ۱۹- با ارقام ۱, ۲, ۴, ۷, ۹ چند عدد سه‌رقمی فرد بدون تکرار ارقام می‌توان نوشت؟
- ۲۰- به چند طریق می‌توان با ارقام ۱ تا ۷ عددی چهاررقمی ساخت؟ (تکرار ارقام مجاز نیست).
- ۲۱- ارقام ۱ تا ۹ مفروض است. (بدون تکرار ارقام)
- الف) چند عدد ۵ رقمی می‌توان نوشت؟
- ب) چند عدد ۴ رقمی زوج می‌توان نوشت؟
- ۲۲- با ارقام ۳, ۴, ۵, ۶, ۷ و ۸ چند عدد سه‌رقمی و بدون تکرار ارقام می‌توان نوشت که:
- الف) عدد زوج باشد.
- ب) عدد فرد باشد.
- ت) عدد بزرگ‌تر از ۶۰۰ باشد.
- ۲۳- با ارقام صفر، ۱، ۲، ۳، ۵، ۷ و ۸ چند عدد چهاررقمی و بدون تکرار ارقام می‌توان نوشت که:
- الف) عدد زوج باشد.
- ب) عدد فرد باشد.
- ت) عدد بزرگ‌تر از ۶۰۰۰ باشد.
- پ) عدد مضرب ۵ باشد.

۳ ترکیب تایی از اشیاء

می خواهیم از یک کلاس ۱۵ نفره دو نفر انتخاب کنیم که ترتیب یا جایه جایی در انتخاب ها مهم نباشد. برای مثال در انتخاب هایمان اگر علی و سپس محمد انتخاب شود با این که اول محمد و سپس علی انتخاب شود فرقی ندارد. در این مثال، تعداد انتخاب های ۲ نفر از ۱۵ نفر که ترتیب یا جایه جایی در انتخاب ها مهم نباشد، ترکیب ۲ از ۱۵ تا از نامیده می شود.

تعداد انتخاب های ۲ شیء از n شیء در صورتی که ترتیب یا جایه جایی اشیا در انتخاب ها مهم نباشد، ترکیب ۲ شیء از n شیء نامیده می شود.

$$C_r^n = \binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)! r!} \text{ است و آن را با نماد } C_r^n \text{ نمایش می دهیم.}$$

مثال از یک کلاس ۱۴ نفره به چند طریق می توان ۳ نفر انتخاب کرد؟

پاسخ مدنظر سوال به دست آوردن تعداد انتخاب های ۳ نفر از ۱۴ نفر است. برای مشخص شدن اهمیت ترتیب و جایه جایی در انتخاب مان

یک انتخاب فرضی انجام می دهیم:

اعضای انتخابی را جایه جایی کنیم. ← قلی، ولی، علی

جایه جا کردن اعضای انتخاب شده تغییری در انتخاب مان به وجود نیاورد، ما می خواستیم سه نفر انتخاب کنیم که کردیم. این که کدام یک از

افراد اول یا دوم انتخاب شوند مهم نیست، پس با قراردادن $= 3$ و $n = 14$ در رابطه $\frac{n!}{(n-r)! r!}$ داریم:

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)! r!} \Rightarrow \binom{14}{3} = \frac{14!}{(14-3)! 3!} = \frac{14!}{11! 3!} = \frac{14! \times 12 \times 13 \times 14}{12! \times 3!} = \frac{14 \times 13 \times 14}{1 \times 2 \times 3} = 364$$


مثال با ۱۰ نقطه روی یک دایره:

ب) چند مثلث متمایز می توان رسم کرد؟

الف) چند وتر متمایز می توان رسم کرد؟

پ) چند چهارضلعی متمایز می توان رسم کرد؟


پاسخ الف) برای رسم هر وتر به دو نقطه روی دایره نیاز داریم. تعداد انتخاب های ۲ نقطه از ۱۰ نقطه را به دست می آوریم.



مواستون باشه اون هایی که انتخاب کردیم رو پایه ها کنیم. تکنه یوو نقطه هایی که انتخاب کردیم رو عوض کنیم!!! با توجه به شکل با جایه جا کردن دو نقطه انتخاب شده وتر جدیدی به دست نمی آید، پس ترتیب و جایه جایی انتخاب ها مهم نیست. در نتیجه:

$$\binom{10}{2} = \frac{10!}{(10-2)! 2!} = \frac{10!}{8! 2!} = \frac{\cancel{10!} \times 9 \times 10}{\cancel{8!} \times 2!} = \frac{9 \times 10}{1 \times 2} = 45$$

برای رسم هر مثلث به سه نقطه روی دایره نیاز داریم.



با جایه جا کردن سه نقطه انتخاب شده، مثلث دیگری ایجاد نمی شود (ترتیب مهم نیست)، برای به دست آوردن تعداد مثلث های متمایز، ترکیب ۳ نقطه از ۱۰ نقطه را به دست می آوریم:

$$\binom{10}{3} = \frac{10!}{(10-3)! 3!} = \frac{10!}{7! 3!} = \frac{\cancel{10!} \times 9 \times 10}{\cancel{7!} \times 3!} = \frac{9 \times 10}{1 \times 2 \times 3} = 120$$

برای به دست آوردن تعداد چهارضلعی های متمایز ترکیب ۴ نقطه از ۱۰ نقطه را به دست می آوریم.

$$\binom{10}{4} = \frac{10!}{(10-4)! 4!} = \frac{10!}{6! 4!} = \frac{\cancel{10!} \times 9 \times 8 \times 7}{\cancel{6!} \times 4!} = 210$$

تعداد همه پیشامدهای یک فضای نمونه Ω اعضوی برابر 2^n است. (چون یک مجموعه Ω اعضوی دارای 2^n زیرمجموعه است.)

مثال تمام پیشامدهای مربوط به پرتاپ یک سکه را بنویسید.

پاسخ فضای نمونه پرتاپ یک سکه به صورت $\{R, P\} = S$ است. هر کدام از زیرمجموعه‌های S , یک پیشامد از این آزمایش است برای $\emptyset, \{R\}, \{P\}, \{R, P\}$ مشخص کردن تمام پیشامدهای آن تمام زیرمجموعه‌های $\{R, P\} = S$ را می‌نویسیم: فضای نمونه، Ω اعضوی است، پس تعداد پیشامدها $= 2^n = 4$ است.

مثال تعداد پیشامدهای ممکن در پرتاپ یک تاس را به دست آورید.

پاسخ فضای نمونه پرتاپ یک تاس به صورت $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = S$ و دارای 6 عضو است. تعداد پیشامدهای ممکن برابر تعداد زیرمجموعه‌های S است. مجموعه S , Ω اعضوی است و تعداد زیرمجموعه‌های آن برابر $= 2^6 = 64$ است. (تعداد زیرمجموعه‌های مجموعه Ω اعضوی برابر 2^n است).

مثال بر روی سه کارت حروف a, b و c را نوشته‌ایم و در داخل کیسه‌ای قرار داده‌ایم. به تصادف یکی از کارت‌ها را از کیسه خارج می‌کنیم. تمام پیشامدهای دو عضوی این پدیده تصادفی را بنویسید.

پاسخ فضای نمونه این پدیده تصادفی به صورت $\{a, b, c\} = S$ است. برای نوشتن پیشامدهای دو عضوی آن کافی است زیرمجموعه‌های $\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}$ دو عضوی مجموعه S را بنویسیم:

مثال سکه‌ای را دو بار پرتاپ می‌کنیم (یا دو سکه را همزمان پرتاپ می‌کنیم):

(الف) فضای نمونه این پدیده تصادفی را با اعضاًیش مشخص کنید. ب) پیشامد این که فقط یک بار رو بباید را مشخص کنید.
پ) پیشامد این که حداقل یک بار رو بباید را مشخص کنید. ت) پیشامد این که حداًکثر یک بار رو بباید را مشخص کنید.

پاسخ (الف) برای هر سکه 2 حالت وجود دارد. طبق اصل ضرب $n(S) = 2 \times 2 = 4$, اولش تعداد شو هساب کن تا تو نوشتند فضای نمونه پیزی از قلم نیفته.
 $S = \{(R, R), (R, P), (P, R), (P, P)\}$

(ب) اوتایی که فقط یه R دارند رو انتقام کن.
حداقل یک بار «رو» یعنی کمترین تعداد «رو» یک بار باشد (دو بار می‌توانه باشه‌ها)، پس اوتایی که ۱ یا ۲ R دارند رو از فضای نمونه انتقام کن.
 $\{(R, P), (P, R), (R, R)\}$

(ت) حداکثر یک بار «رو» یعنی بیشترین تعداد «رو» یک بار باشد (می‌توانه اصلًا رو نداشته باشه)، پس اوتایی که ایا صفر، R دارند رو از فضای نمونه انتقام کن.
 $\{(R, P), (P, R), (P, P)\}$

مثال خانواده‌ای دارای 3 فرزند است:

(الف) فضای نمونه جنسیت فرزندان این خانواده را مشخص کنید.

(ب) پیشامد این که این خانواده یک دختر داشته باشد را بنویسید.

(پ) پیشامد این که این خانواده دو دختر داشته باشد را بنویسید.

(ت) پیشامد این که این خانواده حداقل دو دختر داشته باشد را بنویسید.

(ث) پیشامد این که این خانواده حداکثر یک دختر داشته باشد را بنویسید.

(ج) پیشامد این که این خانواده یک درمیان دختر و پسر داشته باشد را بنویسید.

(چ) پیشامد این که فرزند اول پسر و فرزند دوم دختر باشد را بنویسید.

پاسخ (الف) برای هر فرزند دو حالت (دختر - پسر) وجود دارد، پس طبق اصل ضرب:

$S = \{(p, p, p), (d, p, p), (p, d, p), (d, d, p), (p, p, d), (d, d, d)\}$

از فضای نمونه اون‌هایی که فقط یک دختر دارند را انتخاب می‌کنیم.

(ب) حداقل دو تا دختر یعنی اون‌هایی که ۲ تا یا ۳ تا دختر دارند.

(پ) حداکثر یک دختر یعنی اون‌هایی که یک دختر دارند یا هیچ دختری ندارند. $\{(p, p, p), (d, p, p), (p, d, p), (p, p, d)\}$

(ج) (د) (پ) (پ)

(چ) (د) (پ) (پ)

توجه در سؤالات مربوط به تاس، همواره دو تاس را متمایز در نظر می‌گیریم (با رنگ‌های مختلف)؛ یعنی حالت (۱,۲) و (۲,۱) یکسان نیستند.



مثال در پرتاب دو تاس پیشامدهای زیر را مشخص کنید.

- ب) مجموع دو عدد رو شده برابر ۵ باشد.
- ت) حاصل ضرب دو عدد رو شده برابر ۹ باشد.
- ج) حاصل ضرب دو عدد رو شده برابر ۲۸ باشد.

$$\{(1,2), (2,1)\}$$

$$\{(1,4), (4,1), (2,3), (3,2)\}$$

$$\{(2,6), (6,2), (3,5), (5,3), (4,4)\}$$

$$\{(3,3)\}$$

$$\{(2,6), (6,2), (3,4), (4,3)\}$$

پاسخ الف

ب

ت






ث

ج

پیشامد نشدنی (\emptyset) است.

اعمال برروی پیشامدها فرض کنیم A و B دو پیشامد از فضای نمونه S باشند. در این صورت طبق جدول زیر اجتماع، اشتراک و تفاضل

پیشامدها را تعریف می‌کنیم.

نماش توصیفی	نمایش مجموعه‌ای	نمودار ون	اعمال روی پیشامدها
پیشامد $A \cup B$ زمانی رخ می‌دهد که پیشامد A یا B رخدید. (حداقل یکی از دو پیشامد A و B رخدید).	$\{x \in S \mid x \in A \vee x \in B\}$ علامت یا		اجتماع دو پیشامد A و B ($A \cup B$)
پیشامد $A \cap B$ زمانی رخ می‌دهد که پیشامد A و B رخدید. (پیشامدهای A و B هر دو رخدند).	$\{x \in S \mid x \in A \wedge x \in B\}$ علامت و		اشتراک دو پیشامد A و B ($A \cap B$)
پیشامد $A - B$ زمانی رخ می‌دهد که پیشامد A رخدید و پیشامد B اتفاق نیفتد.	$\{x \in S \mid x \in A \wedge x \notin B\}$		تفاضل B از A ($A - B$)
پیشامد $B - A$ زمانی رخ می‌دهد که پیشامد B رخدید و پیشامد A اتفاق نیفتد.	$\{x \in S \mid x \in B \wedge x \notin A\}$		تفاضل A از B ($B - A$)
پیشامد A' زمانی رخ می‌دهد که A رخدید.	$\{x \in S \mid x \notin A\}$		متتم پیشامد A (A')

توجه

دو پیشامد A و A' هیچ‌گاه با هم رخدند (اشتراک دو پیشامد A و A' برابر تهی است) و اجتماع دو پیشامد A و A' برابر فضای نمونه $A \cap A' = \emptyset$, $A \cup A' = S$ است.

برای این که پیشامد رخدید، کافی است یکی از برآمدهای آن در آزمایش تصادفی رخدید.

مثال در پرتاب یک تاس، پیشامد روشدن عددی زوج را با A و پیشامد روشدن عددی بزرگ‌تر از ۳ را با B در نظر می‌گیریم. ابتدا

مفهوم پیشامدهای زیر را به زبان فارسی بنویسید؛ سپس هر کدام از پیشامدهای زیر را مشخص کنید.

$$A - B$$

$$A \cup B$$

$$A'$$

$$A \cap B$$

$$B - A$$

$$T$$

پاسخ فضای نمونه پرتاب یک تاس به صورت $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ است و پیشامد A (روشندن عددی زوج) $A = \{2, 4, 6\}$ و پیشامد B (عددی بزرگ‌تر از ۳) $B = \{4, 5, 6\}$ است.

سؤال‌های امتحانی

- ۴۹- جاهای خالی را با عبارت‌های مناسب کامل کنید.
- الف) A' را دو پیشامد می‌نامند و $P(A')$ است.
- ب) اگر A و B دو پیشامد ناسازگار باشند، در این صورت $= P(A \cup B)$ است.
- پ) احتمال پیشامد نشدنی برابر و احتمال پیشامد حتمی برابر است.
- ت) احتمال پیشامد A از فضای نمونه همواره عددی بین و است.
- ث) اگر A و B دو پیشامد از فضای نمونه S و $B \subseteq A$ باشد. در این صورت احتمال پیشامد B از احتمال پیشامد A است.
- ج) اگر $P(A) = 0$ باشد، در این صورت $P(A') =$ است.
- ۵۰- یک تاس و یک سکه را با هم پرتاب می‌کنیم.
- الف) فضای نمونه‌ای را بنویسید.
- ب) احتمال آن که سکه «پشت» و تاس عددی زوج بیاید را به دست آورید.
- پ) احتمال آن که عدد ظاهرشده برای تاس حداقل 3 باشد را به دست آورید.
- ۵۱- یک تاس و یک سکه را با هم پرتاب می‌کنیم، مطلوب است محاسبه احتمال این که عدد تاس حداقل 3 یا سکه «رو» بیاید. (نهایی فرداد ۹۹)
- ۵۲- احتمال این که ریحانه امشب سریال را تماشا نکند برابر $\frac{32}{99}$ است. مطلوب است محاسبه احتمال این که ریحانه سریال را تماشا کند. (نهایی شهریور ۹۹)
- ۵۳- در پرتاب دو تاس مطلوب است:
- الف) احتمال این که مجموع دو عدد رو شده برابر 5 باشد.
- پ) احتمال این که مجموع دو تاس مضرب 6 باشد.
- ت) احتمال این که حاصل ضرب دو عدد رو شده بزرگ‌تر از 10 نباشد.
- ۵۴- خانواده‌ای دارای 2 فرزند است.
- الف) فضای نمونه‌ای برای ترکیب جنسیت فرزندان این خانواده را بنویسید.
- ب) احتمال آن که هر دو فرزند از یک جنس باشند را به دست آورید.
- پ) احتمال آن که حداقل یک فرزند پسر باشد را به دست آورید.
- ۵۵- خانواده‌ای دارای سه فرزند است.
- الف) فضای نمونه‌ای برای ترکیب جنسیت فرزندان این خانواده را بنویسید.
- ب) مطلوب است احتمال آن که هر سه فرزند از یک جنسیت نباشند.
- ۵۶- در خانواده‌ای با چهار فرزند مطلوب است:
- الف) احتمال این که فرزند اول دختر و فرزند دوم پسر باشد.
- ب) احتمال این که سه فرزند آخر هم جنس باشند.
- ۵۷- یک تاکسی دارای 4 سرنوشتی است، مطلوب است محاسبه احتمال این که هر 4 نفر در ماه خرداد متولد شده باشند.
- ۵۸- برای 4 نفر که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند، مطلوب است:
- الف) احتمال این که تولد هر 4 نفر در آذار ماه باشد.
- ب) احتمال این که تولد هر 4 نفر در یک ماه خاص باشد.
- پ) احتمال این که تولد هر 4 نفر در هیچ‌کدام در یک ماه نباشد.
- ت) احتمال این که تولد هر 4 نفر در روز دوشنبه باشد.
- ث) احتمال این که تولد هر 4 نفر در یک روز خاص هفتۀ باشد.
- ج) احتمال این که تولد هر 4 نفر در روز 12 آذر باشد. (سال را 365 روز در نظر بگیرید).
- ۵۹- هر یک از اعداد فرد طبیعی 1 تا 15 را روی یک کارت نوشته و پس از مخلوط کردن کارت‌ها به طور تصادفی یک کارت را بر می‌داریم. مطلوب است محاسبه احتمال این که عدد روی کارت مضرب 3 باشد. (نهایی شهریور ۹۹)
- ۶۰- از بین 2 دانشآموز رشته ریاضی، 3 دانشآموز رشته تجربی و 2 دانشآموز رشته انسانی، 3 دانشآموز را به تصادف برای اردوی مشهد انتخاب می‌کنیم. چه قدر احتمال دارد از هر رشته یک دانشآموز انتخاب شود؟ (نهایی فرداد ۹۹)
- ۶۱- از جعبه‌ای شامل 7 مهره قرمز و 3 مهره سفید، 3 مهره را به طور تصادفی بر می‌داریم. مطلوب است احتمال این که دو مهره قرمز و یک مهره سفید باشد. (نهایی دی ۹۸)

الگوهای غیر خطی

فصل

۱ دنباله‌هندسی

در فصل گذشته با دنباله‌هایی که با جمع‌شدن هر جمله با یک مقدار ثابت (اختلاف مشترک) جمله بعدی به دست می‌آمد، آشنا شدیم (دنباله‌های حسابی). شاید این به ذهنتان می‌رسید که خوب تکلیف آن‌هایی که با ضرب‌شدن هر جمله در یک مقدار ثابت، جمله بعدی به دست می‌آید چه می‌شود؟ اثبات این قضیه سر دراز دارد. این شما و این هم ادامه مبحث دنباله‌ها ...

دنباله‌های هندسی

به دنباله‌هایی که هر جمله از ضرب‌شدن مقداری ثابت در جمله قبلی اش به دست می‌آید، دنباله‌های هندسی گفته می‌شود. این مقدار ثابت می‌تواند عددی مثبت یا منفی باشد. به دنباله‌های زیر توجه کنید:

الف $2, 6, 18, 54, \dots$

ب $1, -\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{27}, \dots$

ج $\sqrt{5}, \sqrt[3]{5}, \sqrt[4]{5}, \sqrt[5]{5}, \dots$

با ضرب‌شدن هر جمله در 3 ، جمله بعدی به دست آمده است:

با ضرب‌شدن هر جمله در $\frac{1}{3}$ ، جمله بعدی به دست آمده است:

با ضرب‌شدن هر جمله در 1 ، جمله بعدی به دست آمده است:

به مقدار ثابت ضرب شده در هر مرحله، **نسبت مشترک** دنباله هندسی می‌گوییم و معمولاً آن را با حرف انگلیسی r نمایش می‌دهیم.

در مثال (الف)، نسبت مشترک برابر 3 ، در قسمت (ب) برابر $\frac{1}{3}$ و در قسمت (پ) برابر 1 است. در واقع مقدار ثابت ضرب شده در هر مرحله یعنی r برابر نسبت دو جمله متولی (نسبت هر جمله، به جمله قبلی اش) دنباله هندسی است و چون این نسبت در هر دو جمله متولی یکسان است به آن نسبت مشترک گفته می‌شود. از این روش نیز می‌توان در تشخیص دنباله‌های هندسی استفاده کرد؛ یعنی نسبت جمله‌های متولی دنباله را به دست می‌آوریم و اگر در هر دو جمله متولی این مقدار یکسان بود، یک دنباله هندسی داریم:

برای مثال (الف) داریم:

$$\frac{6}{2} = 3 : \text{نسبت جمله اول و جمله دوم به اول}$$

$$\frac{18}{6} = 3 : \text{نسبت جمله سوم به دوم}$$

$$\frac{54}{18} = 3 : \text{نسبت جمله چهارم به سوم}$$

در دنباله‌های هندسی جمله اول و نسبت مشترک نمی‌توانند برابر صفر باشند.

مثال دنباله‌های هندسی را مشخص کنید و در هر قسمت نسبت مشترک آن‌ها را نیز به دست آورید.

$$2, 7, 12, 17, \dots$$


$$\frac{2}{3}, \frac{2}{9}, \frac{2}{27}, \frac{2}{81}, \dots$$

$$1, 1, 2, 3, 5, \dots$$

$$5, 0, 0, 0, 0, \dots$$

$$\frac{3\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \dots$$


یافش



$$a_1 = 2, \quad a_2 = \frac{7}{2}$$

$$\text{نسبت } a_2 \text{ به } a_1 = \frac{12}{7} \neq \frac{12}{7}$$

دنباله، دنباله هندسی نیست.



$$a_1 = \frac{2}{3}, \quad a_2 = \frac{2}{9} = \frac{1}{3}$$

$$a_2 = \frac{2}{27} = \frac{1}{3}$$

$$a_3 = \frac{2}{81} = \frac{1}{3}$$

دنباله، دنباله هندسی و نسبت مشترک آن $\frac{1}{3} = r$ است. (جملات در هر مرحله در $\frac{1}{3}$ ضرب شدند، پس دنباله هندسی با نسبت مشترک $\frac{1}{3}$ است).


$$1, 1, 2, 3, 5, \dots$$

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 1$$

$$a_2 = \frac{2}{1} = 2$$

$$1 \neq 2$$

دنباله هندسی نیست.




$$a_1 = 5, \quad a_2 = 0$$

$$a_2 = 0$$

$$a_3 = 0$$

خرج کسرها برابر صفر شده است. (مگه می‌شه مخرج کسری برابر صفر بشه؟)



$$a_1 = \frac{3\pi}{2}, \quad a_2 = \frac{3\pi}{2}$$

$$a_2 = \frac{3\pi}{2}$$

$$a_3 = \frac{3\pi}{2}$$

دنباله هندسی با نسبت مشترک $1 = r$ است.

جمله عمومی یا nام دنباله‌های هندسی

با در نظر گرفتن جمله اول a_1 و نسبت مشترک r می‌توانیم جمله n ام دنباله‌های هندسی را مشخص کنیم.

شماره جمله	۱	۲	۳	۴	۵	...	n	...
مقدار جمله	a_1	a_1r	a_1r^2	a_1r^3	a_1r^4	...	a_1r^{n-1}	

$\times r$ $\times r$ $\times r$ $\times r$

با توجه به شماره جمله و مقدار جمله، توان نسبت مشترک (r) همواره از شماره جمله n ام دنباله‌های هندسی به صورت زیر است:

$$a_n = a_1r^{n-1}$$

پس هر جمله دنباله‌های هندسی را می‌توان به صورت حاصل ضرب جمله اول در نسبت مشترک به توان یکی کمتر از شماره آن نوشت. با در نظر گرفتن جمله اول a_1 و نسبت مشترک r داریم:


$$a_n = a_1r^{n-1}, \quad a_{n-1} = a_1r^{(n-1)-1}$$

یکی کمتر

یکی کمتر

سؤال‌های امتحانی

- ۱۶- جاهای خالی را با عبارت‌های مناسب کامل کنید.
- (الف) اگر a_m و a_n دو جملهٔ یک دنبالهٔ هندسی باشند، در این صورت حاصل $\frac{a_m}{a_n}$ برابر r به توان است.
- (ب) اگر a ، b و c سه جملهٔ متولی دنبالهٔ هندسی باشند، رابطه بین آن‌ها برقرار است و b را میان a و c می‌نامند.
- (پ) با قراردادن n جملهٔ میان دو عدد a و b (شروع از a و ختم به b) دنبالهٔ هندسی با نسبت مشترک $r^{n+1} =$ به دست می‌آید.
- (ت) مجموع n جملهٔ اول یک دنبالهٔ هندسی با جملهٔ اول a و نسبت مشترک r از رابطه به دست می‌آید.
- ۱۷- در دنبالهٔ هندسی زیر جاهای خالی را پر کنید.
- (نهایی دی ۹۹) $4, 12, \dots, 108, \dots, \dots, \dots$
- ۱۸- در دنبالهٔ هندسی زیر با فرض نسبت مشترک مثبت آن را به دست آورید، سپس جاهای خالی را پر کنید.
- (نهایی فرداد ۹۹) $7, 112, \dots, \dots, \dots, \dots$
- ۱۹- اگر $x - 3, 4, x + 3$ سه جملهٔ متولی یک دنبالهٔ هندسی باشند، مقادیر x را به دست آورید.
- ۲۰- اگر $\sqrt{x} - 2, 3, \sqrt{x} + 2$ به ترتیب سه جملهٔ متولی یک دنبالهٔ هندسی باشند، مقدار x را به دست آورید.
- ۲۱- اگر $x, x + 2, x + 3$ سه جملهٔ متولی یک دنبالهٔ هندسی باشد، مقدار x را به دست آورید.
- ۲۲- یک واسطهٔ هندسی مثبت بین دو عدد $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{75}$ مشخص کنید.
- ۲۳- بین دو عدد $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{27}$ سه عدد را طوری قرار دهید که جملات با شروع از $\frac{1}{3}$ و ختم به $\frac{1}{27}$ تشکیل یک دنبالهٔ هندسی بدهند. (نسبت مشترک دنباله را مثبت در نظر بگیرید).
- ۲۴- بین دو عدد ۲ و 64 چهار واسطهٔ هندسی قرار دهید (شروع از ۲).
- ۲۵- اگر در یک دنبالهٔ هندسی جملهٔ سوم برابر 8 و جملهٔ هفتم برابر $\frac{81}{2}$ باشد، نسبت مشترک این دنباله را به دست آورید.
- ۲۶- مجموع شش جملهٔ اول دنبالهٔ زیر را با استفادهٔ از فرمول به دست آورید.
- (نهایی فرداد ۹۹) $1, 4, 16, \dots$
- ۲۷- در یک دنبالهٔ هندسی جملهٔ اول 1024 و نسبت مشترک دنبالهٔ $\frac{1}{2}$ است.
- (الف) چندمین جملهٔ دنبالهٔ برابر 64 می‌باشد؟
- (ب) مجموع شش جملهٔ اول این دنباله را به دست آورید.
- ۲۸- مجموع شش جملهٔ اول دنبالهٔ هندسی با جملهٔ اول 5 و جملهٔ هفتم 320 را به دست آورید. (نسبت مشترک دنباله را مثبت در نظر بگیرید).
- ۲۹- مجموع چند جملهٔ از دنبالهٔ هندسی با جملهٔ اول 4 و نسبت مشترک 3 برابر 160 می‌شود؟
- ۳۰- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.
- ۳۱- حد مجموع دنباله‌های زیر را به دست آورید.
- (الف) $3 + 6 + 12 + 24 + \dots + 1536$
- (ب) $\frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{4096}$
- (پ) $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{18} + \dots + \frac{1}{1458}$
- ۳۲- مربعی به ضلع واحد داریم، در هر مرحلهٔ $\frac{1}{7}$ قسمت رنگ نشدهٔ آن را رنگ می‌کنیم. بعد از ۷ مرحلهٔ چه مساحتی از این مربع رنگی شده است؟ (مربع در ابتدا سفید بوده است).
- ۳۳- اگر مطابق شکل مقابل در یک مثلث متساوی‌الاضلاع به ضلع ۱ وسطه‌های اضلاع آن را به یکدیگر وصل کنیم تا مثلث متساوی‌الاضلاع جدید پدید آید و همین روند را ادامه دهیم، آن‌گاه مجموع محیط‌های مثلث‌هایی به دست آمده پس از ۶ مرحلهٔ را به دست آورید.
- ۳۴- بعد از ۲۴ ساعت از مصرف 120 میلی‌گرم از دارویی با نیمه‌عمر 8 ساعتی میزان آن در بدن به چه مقداری می‌رسد؟



پاسخ سؤال‌های امتحانی

پ) دنباله هندسی و نسبت مشترک برابر ۱۰ است.

$$10, 100, 1000, \dots$$

$\times 10$ $\times 10$

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{100}{10} = 10, \quad \frac{a_3}{a_2} = \frac{1000}{100} = 10$$

۵- جمله عمومی دنباله‌های هندسی به صورت $a_n = a_1 r^{n-1}$ است.

در این دنباله هندسی $a_1 = \frac{1}{27}$ و $r = 3$ است؛ در نتیجه جمله

$$\text{عمومی آن به صورت } a_n = \frac{1}{27} r^{n-1} \text{ است.}$$

$$n=9 \Rightarrow a_9 = \frac{1}{27} \times 3^8 = 243 \Rightarrow a_9 = 243$$

۶- دنباله هندسی و $a_1 = \frac{1}{\lambda}$ و $r = 2$ است پس جمله عمومی این دنباله به صورت زیر است:

$$a_n = \frac{1}{\lambda} \times 2^{n-1}$$

$$n=9 \Rightarrow a_9 = \frac{1}{\lambda} \times 2^8 = \frac{1}{\lambda} \times 256 = 32 \Rightarrow a_9 = 32$$

$$n=6 \Rightarrow a_6 = \frac{1}{\lambda} \times 2^5 = \frac{1}{\lambda} \times 32 = 4 \Rightarrow a_6 = 4$$

$$\frac{14}{a_9 - a_6} = \frac{14}{32 - 4} = \frac{14}{28} = \frac{1}{2}$$

۷- ضابطه بازگشته دنباله‌های هندسی با نسبت مشترک r به صورت $a_{n+1} = r a_n$ است.

(الف) دنباله هندسی با نسبت مشترک ۳ است.

(ب) دنباله هندسی نیست.

(پ) دنباله هندسی نیست.

(ت) دنباله هندسی نیست.

۸- ضابطه بازگشته دنباله‌های هندسی با نسبت مشترک r به صورت

است، در نتیجه این دنباله، یک دنباله هندسی است و

نسبت مشترک این دنباله هندسی برابر $\frac{2}{3}$ و جمله اول آن $\frac{1}{2}$ است؛ پس داریم:

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{9}, \dots$$

$\times \frac{2}{3}$ $\times \frac{2}{3}$

$$a_n = \frac{1}{2} \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$$

(ب)

نسبت مشترک برابر $\frac{2}{3}$ و جمله اول برابر $\frac{1}{2}$ است.

(الف) دنباله هندسی است.

$$3, 9, 27, 81, 243, \dots$$

$\times 3$ $\times 3$ $\times 3$ $\times 3$

$$\frac{9}{3} = 3, \quad \frac{27}{9} = 3, \quad \frac{81}{27} = 3$$

۱- (الف) درست

ب) نادرست؛ جملات دنباله هندسی با نسبت مشترک منفی یکدربیان مثبت و منفی می‌شود و دنباله هندسی نه صعودی و نه نزولی است.

$$2, -6, 18, -54, \dots$$

$\times (-3)$ $\times (-3)$ $\times (-3)$

$$-2, -6, -18, -54, \dots$$

$\times 3$ $\times 3$ $\times 3$

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{4}{1} \neq \frac{a_3}{a_2} = \frac{9}{4}$$

ب) صفر

ت) $1 < r < 0$ (بین صفر و یک)

۲- (الف) هندسی

پ) $1 > r > 0$ (بزرگتر از ۱)

ث) $a_{n+1} = r a_n$

$$a_n = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

دنباله هندسی با $a_1 = \frac{1}{2}$ و $r = \frac{1}{3}$ است.

$$a_n = a_1 r^{n-1} = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

۳- در هر قسمت نسبتها دو جمله متوالی را به دست می‌آوریم؛ اگر برابر بودند، دنباله هندسی در غیر این صورت دنباله هندسی نیست.

(الف) دنباله هندسی نیست.

$$4, 12, 20, 28, \dots$$

$$\frac{12}{4} = 3, \quad \frac{20}{12} = \frac{5}{3} \neq \frac{5}{3}$$

ب) دنباله هندسی با نسبت مشترک $\frac{2}{3}$ است.

$$\frac{2}{3}, 1, \frac{2}{3}, \frac{4}{9}, \dots$$

$\times \frac{2}{3}$ $\times \frac{2}{3}$ $\times \frac{2}{3}$

$$\frac{2}{3} = \frac{2}{3}, \quad \frac{3}{1} = \frac{9}{3} = \frac{2}{3}$$

پ) دنباله هندسی با نسبت مشترک ۲ است.

$$\sqrt{5}, 2\sqrt{5}, 4\sqrt{5}, 8\sqrt{5}, \dots$$

$\times 2$ $\times 2$ $\times 2$

$$\frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 2, \quad \frac{4\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} = 2, \quad \frac{8\sqrt{5}}{4\sqrt{5}} = 2$$

ت) دنباله هندسی نیست.

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$$

$\times \frac{1}{2}$ $\times \frac{1}{3}$ $\times \frac{1}{4}$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{3} = \frac{1}{3}, \quad \frac{1}{2} \neq \frac{1}{3}$$

۴- (الف) دنباله هندسی و نسبت مشترک برابر ۴ است.

$$2, 8, 32, \dots$$

$\times 4$ $\times 4$

$$\frac{8}{2} = 4 = 4, \quad \frac{32}{8} = \frac{32}{8} = 4$$

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{1}{2} \neq \frac{a_3}{a_2} = \frac{14}{8}$$

ب) دنباله هندسی نیست.

$$a_6 = \frac{1}{3}, a_4 = \frac{3}{4}$$

-١٤

$$\begin{aligned} a_4 = a_1 r^3 &\Rightarrow \begin{cases} a_1 r^3 = \frac{3}{4} \\ a_6 = a_1 r^5 \end{cases} \Rightarrow \frac{a_1 r^3}{a_1 r^5} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{1}{3}} = \frac{3}{4} \times \frac{3}{1} = \frac{9}{4} \\ a_6 = a_1 r^5 &\Rightarrow \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r^2} = \frac{9}{4} \xrightarrow[\text{طرفین معادله}]{\text{معکوس کردن}} r^2 = \frac{4}{9} \Rightarrow r = \pm \frac{2}{3}$$

$r = \frac{2}{3}$ با توجه به صورت سؤال «نسبت مشترک دنباله مثبت است» را در نظر می‌گیریم.

$$a_1 r^3 = \frac{3}{4} \Rightarrow a_1 \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{3}{4} \Rightarrow \frac{8}{27} a_1 = \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow a_1 = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{8}{27}} = \frac{3 \times 27}{4 \times 8} = \frac{81}{32} \Rightarrow a_1 = \frac{81}{32}$$

با داشتن $r = \frac{2}{3}$ و $a_1 = \frac{81}{32}$ جملة عمومی دنباله را مشخص می‌کیم.

$$a_n = a_1 r^{n-1} \Rightarrow a_n = \frac{81}{32} \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$$

$$\xrightarrow[\frac{81=3^4}{32=2^5}]{\frac{r=2}{r=2}} a_n = \frac{2^4}{2^5} \times \frac{2^{n-1}}{3^{n-1}} = \frac{2^{n-1}}{2^5} \times \frac{3^4}{3^{n-1}}$$

$$\xrightarrow[\text{پایه ها برابر، توان ها را از هم کم می کنیم.}]{\frac{2^{n-1}}{3^{n-1}}} a_n = 2^{n-6} \times 3^{-n+5}$$

-١٥ جمله سوم این دنباله هندسی برابر ٩ و جمله ششم آن برابر ٢٤٣ است. ابتدا جمله عمومی این دنباله را مشخص می‌کیم:

$$a_3 = a_1 r^2 = 9, a_6 = a_1 r^5 = 243$$

$$\Rightarrow \frac{a_6}{a_3} = \frac{a_1 r^5}{a_1 r^2} = \frac{243}{9} \Rightarrow r^3 = 27 \Rightarrow r = 3$$

نسبت مشترک این دنباله برابر ٣ است.

$$a_3 = a_1 r^2 \Rightarrow 9 = a_1 \times 3^2 \Rightarrow 9 = 9a_1 \Rightarrow a_1 = 1$$

جمله اول این دنباله برابر ١ است؛ در نتیجه جمله عمومی این دنباله هندسی به صورت $a_n = 1 \times 3^{n-1}$ است و جمله دهم این دنباله نیز

به صورت $a_{10} = 3^9$ خواهد بود.

-١٦ (الف)

$$\frac{a_m}{a_n} = \frac{a_1 r^{m-1}}{a_1 r^{n-1}} = r^{m-n}$$

$$\frac{b}{a} = ac, \text{ واسطه هندسی پ) } \quad \text{ب) (پ)$$

$$S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r} \quad \text{(ت)}$$

-١٧ نسبت مشترک این دنباله هندسی برابر ٣ است.

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{12}{4} = 3$$

$$4, 12, 36, 108, 324, 972 \xrightarrow{x3} \xrightarrow{x3} \xrightarrow{x3}$$

$$\begin{cases} a_{n+1} = 3a_n \\ a_1 = 3 \end{cases} \quad \text{(ب)}$$

$$a_n = 3 \times 3^{n-1} = 3^n \quad \text{(ب)}$$

$$a_{10} = 3^9 \quad \text{(ت)}$$

-١٨ الف) دنباله هندسی با نسبت مشترک $\frac{1}{5}$ و جمله اول ١ است.

$$1, \frac{1}{5}, \frac{1}{25}, \dots \xrightarrow{\times \frac{1}{5}} \xrightarrow{\times \frac{1}{5}}$$

$$\frac{1}{5} = \frac{1}{5}, \frac{1}{25} = \frac{1}{5} \quad \text{جمله اول ١ است.}$$

$$\begin{cases} a_{n+1} = \frac{1}{5} a_n \\ a_1 = 1 \end{cases} \quad \text{(ب)}$$

$$a_n = 1 \times \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1} \quad \text{(ب)}$$

$$a_{11} = \left(\frac{1}{5}\right)^{10} \quad \text{(ت)}$$

-١٩ جمله اول دنباله هندسی برابر ٩٦ و نسبت مشترک آن برابر ٢ است. پس جمله عمومی این دنباله هندسی به صورت $a_n = 96 \times 2^{n-1}$ است. حال مقدار ٧٦٨ را برابر جمله عمومی این دنباله قرار می‌دهیم.

$$96 \times 2^{n-1} = 768 \Rightarrow 2^{n-1} = \frac{768}{96} = 8$$

$$\Rightarrow 2^{n-1} = 8 \Rightarrow 2^{n-1} = 2^3 \Rightarrow n-1 = 3 \Rightarrow n = 4$$

-٢٠ جمله اول دنباله هندسی برابر $\frac{1}{6}$ و نسبت مشترک آن برابر ٦ است؛ پس جمله عمومی این دنباله به صورت زیر است:

$$a_n = \frac{1}{6} \times 6^{n-1} = 6^{n-2} \quad \text{با برابر قراردادن ٢١٦ با جمله عمومی این دنباله داریم:}$$

$$a_n = 6^{n-2} = 216 = 6^3 \Rightarrow 6^{n-2} = 6^3 \Rightarrow n-2 = 3 \Rightarrow n = 5$$

$$a_6 = 320, a_3 = 40 \quad \text{-٢١}$$

$$\begin{aligned} a_3 = a_1 r^2 &\Rightarrow a_1 r^2 = 40 \\ a_6 = a_1 r^5 &\Rightarrow a_1 r^5 = 320 \end{aligned}$$

$$\xrightarrow[\text{معادله ها}]{\text{ تقسیم طرفین}} \frac{a_1 r^5}{a_1 r^2} = \frac{40}{320}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r^3} = \frac{1}{8} \xrightarrow[\text{طرفین معادله}]{\text{معکوس کردن}} r^3 = 8 \Rightarrow r = 2$$

حال با توجه به $a_1 r^2 = 40$ ، جمله اول دنباله را به دست می‌آوریم:

$$a_1 r^2 = 40 \Rightarrow a_1 \times 2^2 = 40 \Rightarrow 4a_1 = 40 \Rightarrow a_1 = 10$$

با داشتن $a_1 = 10$ و $r = 2$ جمله عمومی دنباله را مشخص می‌کنیم.

$$a_n = a_1 r^{n-1} \Rightarrow a_n = 10 \times 2^{n-1}$$

ردیف	نمونه امتحان نیمسال اول	امتحان شماره ۱	مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	رشته انسانی	ریاضی و آمار ۳	نمره
۱	با توجه به شکل مقابل به چند طریق می‌توان از شهر A به شهر D رفت؟					۰/۷۵
۲	با توجه به ارقام ۰، ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ به سؤالات زیر پاسخ دهید. (تکرار ارقام در این سؤال مجاز نیست).					۰/۵
	(الف) چند عدد چهار رقمی می‌توان نوشت؟					۰/۵
	(ب) چند عدد چهار رقمی با یکان ۲ می‌توان نوشت؟					۰/۵
	(پ) چند عدد چهار رقمی مضرب ۵ می‌توان نوشت؟					۰/۷۵
۳	روی محیط یک دایره ۱۰ نقطه وجود دارد.					
	(الف) چند وتر متمایز می‌توان با این نقاط تشکیل داد؟					۰/۵
	(ب) چند مثلث متمایز می‌توان با این نقاط تشکیل داد؟					۰/۵
۴	در یک دوره بازی فوتbal بین ۱۶ تیم که بازی‌ها به صورت رفت و برگشت انجام می‌شود، اگر همهٔ تیم‌ها با هم بازی داشته باشند، در پایان دوره چند بازی انجام خواهد شد؟					۰/۵
۵	از بین ۱۰ نفر دانش‌آموز پایهٔ یازدهم و ۱۵ نفر دانش‌آموز پایهٔ دوازدهم یک مدرسه:					
	(الف) به چند طریق می‌توانیم دو نفر انتخاب کنیم؟					۰/۵
	(ب) به چند طریق می‌توانیم دو نفر یکی برای امور ورزشی و دیگری برای امور آموزشی انتخاب کنیم؟					۰/۵
۱	(پ) به چند طریق می‌توانیم سه نفر انتخاب کنیم به طوری که دو نفر پایهٔ یازدهم و یک نفر از پایهٔ دوازدهم انتخاب شود؟					
۶	سکه‌ای را پرتاب می‌کنیم. اگر «رو» ظاهر شد، آن‌گاه تاس را می‌ریزیم، در غیر این صورت یک بار دیگر سکه را می‌اندازیم.					
	(الف) فضای نمونهٔ این آزمایش تصادفی را با اعضاً مشخص کنید.					۰/۷۵
	(ب) پیشامد این که عدد ظاهرشده روی تاس فرد یا سکه پشت بیاید را با اعضاً مشخص کنید.					۰/۵
۷	اگر A، B و C سه پیشامد از فضای نمونه S باشند، پیشامدهای زیر را با نماد مجموعه‌ها نشان داده و سپس نمودار ون آن‌ها را رسم کنید.					
	(الف) پیشامدهای A و B رخ دهندهٔ ولی پیشامد C اتفاق نیفتند.					۰/۷۵
	(ب) پیشامدهای A یا B رخ دهندهٔ ولی پیشامد C اتفاق نیفتند.					۰/۷۵
۸	از جعبه‌ای شامل ۷ مهرهٔ قرمز و ۵ مهرهٔ آبی، سه مهره به تصادف انتخاب می‌کنیم. مطلوب است احتمال این که:					
	(الف) هر سه مهره آبی باشد.					۰/۷۵
۱	(ب) دو مهره قرمز و یک مهره آبی باشد.					
	(پ) حداقل یک مهره قرمز باشد. (با محاسبه $P(A')$)					۰/۵
۹	خانواده‌ای دارای ۴ فرزند است:					
	(الف) فضای نمونهٔ جنسیت فرزندان این خانواده دارای چند عضو است؟					۰/۲۵
	(ب) احتمال این که فرزند سوم و چهارم این خانواده دختر باشد را مشخص کنید. (نوشتن اعضای پیشامد الزامی است).					۰/۷۵
۱۰	مشخص کنید در بررسی کدامیک از موارد زیر، اندازهٔ نمونهٔ بزرگ‌تری لازم است؟ پاسخ خود را توضیح دهید.					۰/۷۵
	(الف) سن دانش‌آموزان کلاس شما					
	(ب) معدل سال گذشته دانش‌آموزان کلاس شما					

ریاضی و آمار ۲		رشته انسانی		نمونه امتحان نیم سال دوم	
نمره	kheilisabz.com	امتحان نهایی خردادماه ۱۴۰۱	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	امتحان شماره ۳	ردیف
۱					درستی یا نادرستی جمله‌های زیر را مشخص کنید.
					الف) حاصل $\frac{1}{3}$ برابر $\frac{1}{2}$ است.
					ب) احتمال روشندن عدد ۷ در پرتاب یک تاس برابر صفر است.
					پ) در دنباله $a_{n+1} = a_n + 3$, اگر جمله پنجم ۱۷ باشد، جمله ششم آن ۲۳ است.
					ت) نمایش $\sqrt[3]{-7}$ را به صورت $(-7)^{\frac{1}{3}}$ می‌توان نوشت.
۰/۷۵					گزینه صحیح را انتخاب کنید.
					الف) فضای نمونه برای ترکیب جنسیت فرزندان خانواده‌ای با ۳ فرزند، چند عضو دارد؟
	۱۲ (۴)	۹ (۳)	۸ (۲)	۶ (۱)	
					ب) احتمال این که فردا بارانی باشد، $\frac{1}{10}$ است. احتمال این که فردا بارانی <u>نباشد</u> , چقدر است؟
	۰/۹۹ (۴)	۰/۹ (۳)	۰/۱ (۲)	۰/۰۹ (۱)	
					پ) تفسیر نتایج به دست آمده، کدام گام در چرخه حل مسائل آماری است؟
	۴) بحث و نتیجه‌گیری	۳) تحلیل داده‌ها	۲) گردآوری داده‌ها	۱) بیان مسئله	
۰/۵					مسئله‌ای طرح کنید که پاسخ آن به صورت $\left(\frac{5}{3}\right)$ باشد.
۰/۵					کدام یک از پدیده‌های زیر تصادفی و کدام یک قطعی است؟
					الف) مشاهده عدد ۳ در پرتاب یک تاس که روی هر شش وجه آن، عدد ۳ حک شده باشد.
					ب) نتیجه یک آزمون چهار گزینه‌ای که نیمی از سوالات آن را شانسی پاسخ داده‌ایم.
۱/۵					از بین ۴ مهره سفید و ۳ مهره سیاه، به تصادف ۲ مهره انتخاب می‌کنیم. احتمال این را که هر دو مهره سفید باشد، محاسبه کنید.
۱/۲۵					داده‌های زیر، میزان حقوق ماهیانه (برحسب میلیون تومان) کارمندان یک شرکت خصوصی را نشان می‌دهد: ۸,۶,۶,۵,۱۱,۲۰,۹,۸,۳۵,۱۲,۱۰
					الف) دامنه تغییرات و میانه داده‌ها را به دست آورید.
					ب) آیا میانه معیار گرایش به مرکز مناسبی برای توصیف این داده‌ها است؟ چرا؟
۱/۷۵					الف) چهار جمله اول دنباله $2n + 3n = a_n$ را بنویسید.
					ب) رابطه بازگشتی دنباله $5, 11, 17, \dots$ را بنویسید.
۲					در یک دنباله حسابی، جمله اول ۵ و اختلاف مشترک برابر ۷ است.
					الف) جمله یازدهم این دنباله را به دست آورید.
					ب) کدام جمله دنباله، برابر ۹۶ است؟
۱/۵					در دنباله حسابی $\dots, 15, 11, 7, 3$ ، مجموع بیست جمله اول این دنباله را به دست آورید.
۱					کدام یک از دنباله‌های زیر هندسی است؟ در صورت مثبت بودن جواب، نسبت مشترک را به دست آورید.
	الف) $\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \frac{1}{81}, \dots$	ب) $1, 4, 9, 16, \dots$			
۲					جمله دوم یک دنباله هندسی، ۶ و جمله پنجم همین دنباله، ۴۸ است.
					الف) نسبت مشترک این دنباله را بیندا کنید.
					ب) جمله هفتم این دنباله را بنویسید.
۱					عبارت توان دار را به صورت رادیکالی و عبارت رادیکالی را به صورت توان دار بنویسید.
	الف) $\sqrt[5]{12^3}$	(ب) $\frac{1}{7}(0/24)$			
۱					در تساوی $8^x = 8^{10}$ ، مقدار x را مشخص کنید.



پاسخ نامه تشریحی

$$a_n = a_1 + (n-1) \times d \Rightarrow a_n = -17 + (n-1) \times 3 \quad (0/25)$$

ب) $m \times n \quad (0/25)$

-1 الف) $1 \quad (0/25)$

$$a_n = 3n - 2 \quad (0/25)$$

ت) جعبه‌ای $(0/25)$

پ) $n! \quad (0/25)$

$$S_n = \frac{n}{2} [2a_1 + (n-1)d] \quad -9$$

ج) $A \cap B = \emptyset \quad (0/25)$

ث) $1 \quad (0/25)$

$$S_{16} = \frac{16}{2} [2 \times (11) + 15 \times (-3)] \quad (0/25)$$

-2 الف) درست $(0/25)$

$$\Rightarrow S_{16} = 8(22 - 45) = -184 \quad (0/25)$$

ب) نادرست؛ برای توصیف داده‌های کمی، گزارش درصد همیشه با گزارش تعداد همراه است. $(0/25)$

۱۰ ب) دنباله حسابی هست. $(0/25)$

$$-3, 0, 3, 6, \dots \Rightarrow d = 3 \quad (0/25)$$

پ) نادرست؛ مرتب کردن داده‌ها در گام سوم اتفاق می‌افتد. $(0/25)$

ت) درست $(0/25)$

$$\text{الف) } \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{9} \quad (0/25)$$

-3 الف) گزینه «۳» $(0/25)$

$$\text{ب) } r = \frac{1}{3} \div \frac{1}{2} = \frac{2}{3} \quad (0/25) \quad a_n = \frac{1}{2} \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \quad (0/25)$$

ب) گزینه «۱» $(0/25)$

$$a_n = a_1 \times r^{n-1} \Rightarrow 768 = 96 \times 2^{n-1} \quad (0/25) \quad -12$$

پ) گزینه «۴» $(0/25)$

$$\Rightarrow \lambda = 2^{n-1} \quad (0/25) \Rightarrow n-1=3 \Rightarrow n=4 \quad (0/25)$$

$$\binom{\lambda}{3} = \frac{\lambda!}{(\lambda-3)!3!} = \frac{\lambda!}{5!3!} = \frac{\lambda \times 7 \times 6 \times 5!}{5! \times 1 \times 2 \times 3} = 56 \quad (0/25)$$

$$\text{الف) } \sqrt[4]{4} \quad (0/25)$$

$$\text{ب) } \sqrt[4]{(0/\lambda)} \quad (0/25)$$


$$\text{الف) } \lambda^4 \times 9^x = \lambda^4 \times 9^4 \Rightarrow x = 4 \quad (0/25) \quad -14$$

$$\text{ب) } 5^{dx} = 5^{-2} \Rightarrow dx = -2 \Rightarrow x = \frac{-1}{3} \quad (0/25)$$

$$\text{ب) } (0/5)^{x+4} = (0/5)^{\lambda} \Rightarrow x+4=\lambda \Rightarrow x=4 \quad (0/25)$$

$$\text{الف) } \frac{a^{\frac{x}{2}}}{a^{\frac{4}{5}}} = \frac{a^{\frac{2}{5}}}{a} = a \quad (0/25) \quad \text{ب) } 5^{\frac{1}{3}-\frac{1}{3}} = 5^0 = 1 \quad (0/25) \quad -15$$

$$\text{الف) } a^{\frac{4}{5}} \quad (0/25) \quad \text{ب) } 5^{\frac{1}{3}-\frac{1}{3}} = 5^0 = 1 \quad (0/25) \quad -16$$



-17

$$y = 2 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot (1+0/2)^x \quad (0/25)$$

ت) گزینه «۳» $(0/25)$

$$\Rightarrow y = 2 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot (1/44) \quad (0/25) \Rightarrow y = 288 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 \quad (0/25)$$

$$P(2, 2) = \frac{2!}{(2-2)!} = \frac{2!}{0!} = \frac{2!}{1} = 2 \quad (0/25)$$

ت) گزینه «۳» $(0/25)$

۱۴ از C به A، ۳ مسیر و از D به B مسیر در نتیجه:

$$3 \times 4 = 12 \quad (0/25)$$

$$\left. \begin{aligned} n(S) &= \binom{7}{3} = \frac{7!}{3! \times 4!} = 35 \quad (0/25) \\ n(A) &= \binom{2}{1} \times \binom{3}{1} \times \binom{2}{1} = 12 \quad (0/25) \end{aligned} \right\} \Rightarrow P(A) = \frac{12}{35} \quad (0/25)$$

۱۵ ۳, ۵, ۷, ۹: چهار جمله اول دنباله $\lambda, 5, 7, 9$ (1)

۱۶ فرمول بازگشتی $a_{n+1} = a_n + 2, a_1 = 3 \quad (0/25)$

$$a_1 = 3 = \lambda \quad (0/25), b_4 = \frac{15}{5} = 3 \quad (0/25),$$

$$c_7 = \left(\frac{1}{7}\right)^{\circ} = 1 \quad (0/25)$$

$$a_1 - b_4 + c_7 = \lambda - 3 + 1 = 6 \quad (0/25)$$

۱۷ با توجه به فرمول $d = \frac{t_m - t_n}{m-n}$ داریم:

$$d = \frac{10 - (-17)}{10 - 1} = \frac{27}{9} = 3 \quad (0/25)$$