

فهرست

۷	فصل ۱: مولکول‌های اطلاعاتی
۷	گفتار ۱: نوکلئیک اسیدها
۲۳	گفتار ۲: همانندسازی DNA
۳۶	فصل ۲: تقسیم یاخته
۳۶	گفتار ۱: کروموزوم
۴۸	گفتار ۲: میتوز (رشمنان)
۶۰	گفتار ۳: میوز و تولیدمثل جنسی
۷۵	فصل ۳: انتقال اطلاعات در نسل‌ها
۷۵	گفتار ۱: مقاهم پایه
۹۰	گفتار ۲: انواع صفات
۱۱۹	فصل ۴: تغییر در اطلاعات و راثتی
۱۲۰	گفتار ۱: تغییر در ماده و راثتی جانداران
۱۳۶	گفتار ۲: تغییر در جمعیت‌ها
۱۵۲	گفتار ۳: تغییر در گونه‌ها
۱۶۷	فصل ۵: فناوری‌های نوین زیستی
۱۶۸	گفتار ۱: زیستفناوری و مهندسی زنتیک
۱۸۰	گفتار ۲: فناوری مهندسی پروتئین و بافت
۱۸۶	گفتار ۳: کاربردهای زیستفناوری
۲۰۰	فصل ۶: بررسی ژن و مسائل ژنتیک در گیاهان
۲۲۹	پاسخ‌نامهٔ تشریحی

بررسی ژن و مسائل ژنتیک در گیاهان

پیش‌گفتار

چگونگی انتقال صفات در گیاهان و بررسی مباحث ژنتیک گیاهی، از جمله موضوعات کتاب درسی است که متأسفانه به طور کامل و با جزئیات کافی به آن پرداخته نشده است! در حالی که در آزمون‌های کنکور سراسری ۱۰ سال گذشته، مکرراً تست‌های متنوعی از این موضوع مطرح شده است؛ بنابراین ما تصمیم گرفتیم در اینجا، این نقص کتاب درسی را با اختصاص دادن یک فصل کامل به این موضوع، جبران نماییم تا مبادا شما داوطلبان عزیز کنکور خدای ناکرده، از این کاستی! متضمر شوید. در این فصل ابتدا مفاهیم پیش‌نیاز را یادآوری کرده و سپس به بررسی ژن‌ها و مسائل ژنتیک در گیاهان می‌پردازیم. در ادامه فصل، با طرح چندین پرسش ژنتیکی و پاسخ به آن‌ها، به حل تمرینی مسائل ژنتیک گیاهی پرداخته و دانستنی‌ها و یادگیری‌های خود را در ذهنمان مرور و تثبیت می‌کنیم.

أنواع صفات در گیاهان

■ گیاهان مانند سایر جانداران واجد ویژگی‌هایی هستند که بسیاری از آن‌ها تحت کنترل ژن‌های است، به این ویژگی‌ها صفت می‌گویند. در بروز برخی از این صفات، محیط نیز علاوه بر ژن مؤثر است. صفات را بر حسب تعداد جایگاه‌های ژنی کنترل کننده آن‌ها در یکی از ۲ گروه زیر قرار می‌دهیم:

صفات تک‌جایگاهی ← مانند رنگ گل میمونی (درس‌نامه فصل^(۳))

صفات چند‌جایگاهی ← مانند رنگ نوعی دانه ذرت (درس‌نامه فصل^(۳))



بررسی ژن و مسائل ژنتیک در گیاهان درس نامه

■ به اشکال مختلف یک ژن، ال (دگره) گفته می‌شود و ال‌های یک ژن، در جایگاه‌های یکسانی بر روی کروموزوم‌های همتا قرار می‌گیرند. تعداد ال‌هی صفت تک‌جایگاهی در انواع یاخته‌های گیاهی: در هر یاخته گیاهی تعداد یک نوع جایگاه ژنی برابر است با تعداد کروموزوم‌های همتا در آن یاخته؛ به طور مثال در یک یاخته $2n$ کروموزومی، از هر نوع جایگاه ژنی، ۲ عدد مشاهده می‌شود.

تعداد جایگاه‌های ژنی مشابه در یاخته	تعداد نسخه‌های یک نوع کروموزوم	تعداد مجموعه‌های کروموزومی یاخته
۱	۱	 n
۳	۳	 $3n$
به تعداد مجموعه‌ها	...	پلی‌پلوجید



حست‌گویی

برای صفت رنگ گل میمونی، یک جایگاه ژنی روی کروموزوم خاصی مشاهده می‌شود. در هر یاخته نرم‌آکنه‌ای این گیاه، برای این صفت چند ال (دگره) وجود دارد؟

پاسخ گل میمونی، ۲۱ کروموزومی است؛ بنابراین از هر نوع کروموزوم، ۲ عدد در هر هسته دیپلولئیدی خود دارد ← یاخته نرم‌آکنه‌ای آن نیز دیپلولئیدی است ← ۲ ال دارد.

حست‌گویی

اگر گیاه گل میمونی واجد گل سفید باشد در یاخته‌های نرم‌آکنه‌ای آن، چه ژنوتیپی (ژن نمود) خواهیم داشت؟

WW **پاسخ**

اگر گیاه گل میمونی واجد گل صورتی باشد در یاخته‌های هاپلولئیدی آن، چه ژنوتیپی برای این صفت خواهیم داشت؟

پاسخ برای گل صورتی، ژنوتیپ RW در نظر می‌گیریم؛ این ژنوتیپ مربوط به یک یاخته دیپلولئیدی است ← یاخته هاپلولئیدی آن، برای این صفت ژنوتیپ R و یا W دارد.

انواع روش‌های تکثیر و تولیدمثل در گیاهان

گیاهان می‌توانند به روش‌های غیرجنسی و جنسی تکثیر پیدا کنند، در تولیدمثل غیرجنسی از بخش‌های رویشی گیاه (ریشه، ساقه، برگ و جوانه) در ایجاد گیاه جدید استفاده می‌شود ولی در تولیدمثل جنسی، گیاه جدید حاصل لقاح دو گامت نر و ماده (اسپرم و تخمزا) است.

تولیدمثل غیرجنسی

تولیدمثل به روش غیرجنسی در گیاهان، با استفاده از بخش‌های رویشی آن‌ها صورت می‌گیرد.



بررسی ژن و مسائل ژنتیک در گیاهان درس نامه

روش‌های تولید مثل رویشی (غیر جنسی) در گیاهان	
فناوری تکثیر گیاهان	ساختارهای ویژه برای تولید مثل رویشی مورد استفاده انسان
استفاده از یاخته یا قطعه‌ای از بافت گیاهی	جوانه‌های روی ریشه برخی گیاهان (مانند جوانه‌های روی ریشه آبالو) ساقه‌های ویژه شده:
تکثیر در محیط کشت سترنون	قطعات ساقه قلمه‌زدن
تولید کال	قطعاتی از گیاه مانند جوانه یا شاخه (پیوندک) پیوندزدن
با استفاده از هورمون‌های گیاهی از کال گیاهچه تولید می‌شود.	پوشاندن بخشی از ساقه یا شاخه که واجد گره است در زیر خاک خوابانیدن

بادموں
باش

نکاتی که لازم است بدانیم:

- در تولید مثل غیر جنسی، از نظر ژنوتیپی، گیاه جدید مشابه گیاه والد است.
- در روش پیوندزدن می‌توان در یک گیاه، دو نوع ژنوتیپ در یاخته‌های هسته‌دار (با مجموعه‌های کروموزومی مشابه هر دو دیپلولئید) مشاهده کرد.
- در تولید مثل غیر جنسی، تنها یک والد ژن‌های خود را به نسل بعد می‌دهد.
- در روش پیوندزدن، والد همان گیاهی است که جوانه یا شاخه (پیوندک) از آن گرفته شده است.
- سرعت تکثیر در تولید مثل غیر جنسی بیشتر از جنسی است.
- گیاهان حاصل از تولید مثل غیر جنسی تنوع ندارند یا بسیار کم هستند.
- فقط در صورت جهش یاخته‌های جدید با یاخته مادری متفاوت خواهند شد.

۱ تکثیر فقط با تولیدمثل غیرجنSSI، توان بقای جمعیت آن گیاه را کاهش می‌دهد. (در صورت تغییر محیط!) ۲ گیاهانی که ویژگی‌های مطلوب دارند بهتر است با تولیدمثل غیرجنSSI تکثیر یابد تا زاده‌های نسل بعد، همان ویژگی‌های مطلوب را داشته باشند.

فناوری و تکثیر گیاهان

- از فن کشت بافت برای تولید گیاهان با ویژگی‌های مطلوب و تولید انبوه آن‌ها در آزمایشگاه استفاده می‌شود.
- در این فن، یاخته یا قطعه‌ای از بافت گیاهی (بافت زنده و هسته‌دار) را در محیط کشت سَتَرَوْن و دارای مواد موردنیاز برای رشد و نمو گیاه قرار می‌دهیم. یاخته و بافت در شرایط مناسب با تقسیم می‌توز، توده‌ای از یاخته‌های هم‌شکل را به وجود می‌آورد که کال نامیده می‌شود.
- حضور هورمون‌های گیاهی در تولید گیاهچه از کال مؤثر است (هورمون اکسین در ریشه‌زایی و هورمون سیتوکینین در ساقه‌زایی).

BOOK BANK

از نظر ژنی، گیاهچه‌های حاصل از توده یاخته کال به هم شبیه‌اند و ژن‌هایی مشابه با ژن‌های یاخته یا قطعه بافت گیاهی اولیه را دارند.

تولیدمثل جنسی

- تولیدمثل جنسی را در گروه نهان‌دانگان (گیاهان گلدار) بررسی می‌کنیم. از لقاح دو گامت (اسپرم × تخمزا)، تخم اصلی تشکیل شده و گیاه جدید از رشد و نمو این تخم شکل می‌گیرد.
- نهان‌دانگان واجد ساختارهای تخصص یافته برای تولیدمثل جنسی هستند؛



این ساختار، گل نامیده می‌شود (به همین دلیل نهان‌دانگان، گیاهان گلدار هم نامیده می‌شوند).

اجزای گل: در یک گل کامل، اجزای گل در ۴ حلقه هم‌مرکز روی بخشی به نام نهنج قرار می‌گیرند:

حلقه اول کاسبرگ‌ها هستند که در خارجی‌ترین حلقه قرار دارند.

حلقه دوم گلبرگ‌ها هستند و معمولاً به رنگ‌های متفاوت‌اند.

حلقه سوم پرچم‌ها هستند که اندام نر گل‌ها به حساب می‌آیند.


حلقه چهارم مادگی (اندام ماده): مادگی، از یک یا چند برچه

ساخته شده است و هر برچه شامل ۳ بخش کلاله، خامه و تخدمان است.

در تخدمان (بخش حجیم مادگی) تخمک یا تخمک‌ها مشاهده می‌شود.

از نظر ژنتیکی، همه یاخته‌های ۲۱ کروموزومی بخش‌های مختلف

گل، ژنتیک همان یاخته تخم اصلی را دارند که از رشد و نمو آن تخم، گیاه موردنظر تشکیل شده است.



- گل‌ها براساس بودن هر چهار حلقه یا نبودن بعضی از حلقه‌ها در دو گروه گل‌های کامل و یا ناکامل قرار می‌گیرند.
- گل‌هایی که هر دو حلقة پرچم و مادگی را داشته باشند گل دوجنسی و آن‌هایی که فقط یکی از این حلقه‌ها (پرچم یا مادگی) را دارند گل تک‌جنسی می‌نامند.
- گل دوجنسی می‌تواند کامل یا ناکامل باشد (برحسب حضور یا عدم حضور سایر حلقه‌های گل).
- گل تک‌جنسی قطعاً گل ناکامل است (یکی از دو حلقة سوم یا چهارم را ندارد).
- تشکیل یاخته‌های جنسی (اسپرم و تخمزا)
- یاخته‌های جنسی نر و ماده (اسپرم و تخمزا) در نهان‌دانگان در اندام گل تشکیل می‌شوند. در برخی از گیاهان مانند خزه‌ها، گامت نر وسیله حرکتی دارد (تاژکدار است) و در قطره‌های آب پوشاننده سطح گیاه شنا می‌کند و به گامت ماده می‌رسد؛ ولی در نهان‌دانگان، گامت نر غیرمتحرک است، بنابراین برای انتقال گامت نر، ساختاری به نام لوله گرده در بخش تولیدی ماده (مادگی) تشکیل می‌شود. **تولید گامت نر:** (اسپرم = زامه): نیمی از تعداد کروموزوم‌های گیاه اصلی را دارند، در تشکیل این یاخته‌ها، یاخته‌های دیپلوبتیدی موجود در پرچم نقش دارند.
- پرچم: حلقة سوم گل و شامل میله و بخشی حجیم به نام بساک است. اگر بساک را برش عرضی برزیم کیسه‌های گرده مشاهده می‌شوند. یاخته‌های دیپلوبتیدی موجود در کیسه گرده در تشکیل دانه گرده رسیده، نقش دارند.




نکته تئوری

بانجام یک بار میتوز و سپس سیتوکینز نابرابر در هر گرده نارس، ۲ یاخته، یکی یاخته رویشی بزرگ‌تر و دیگری یاخته زایشی کوچک‌تر ایجاد می‌شود که به مجموع آن‌ها، دانه گرده رسیده می‌گویند.



بررسی تشکیل دانه گرده رسیده با یک طرح ژنتوتیپی فرضی:




نکته مهم دانه گرده رسیده واجد ۲ پوسته است که پوسته داخلی صاف و پوسته خارجی واجد تزئینات خاصی است.

مسئله اگر یک صفت تک‌جایگاهی در گیاه لوبيا فرض شود به شرط داشتن ژنوتیپ Aa در گیاه والد، انواع ژنوتیپ دانه‌های گرده رسیده آن چیست؟



پاسخ



استگزین اگر یک صفت دوجایگاهی در گیاه لوبيا فرض شود به شرط داشتن ژنوتیپ **AaBb** از گیاه والد، انواع ژنوتیپ دانه گرد رسیده آن چیست؟

پاسخ

۴ نوع ژنوتیپ احتمالی از تقسیم میوزی
 $2 \times 2 = 4$
 یاخته‌های دیپلولئیدی بساک حاصل می‌شود.
 ↓ ↓
 نوع ژنوتیپ

یاخته لوبيا با ژنوتیپ **AaBb**، ۲ نوع آرایش متافازی در میوز می‌تواند نشان دهد:

۱ آرایش متافازی اول: میوز ۲ دانه گرد با ژنوتیپ **AB** و **ab** تولید می‌شود.

۲ آرایش متافازی دوم: میوز ۲ دانه گرد با ژنوتیپ **Ab** و **aB** تولید می‌شود.

یادمن باش

در کيسه گرده بساک، تعداد زیادي یاخته دیپلولئیدی، تقسیم میوز انجام می‌دهند؛ پس می‌توانیم همه انواع میوزها (آرایش‌های متافازی) را در نظر بگیریم ۴ نوع ژنوتیپ در دانه‌های گرد رسیده موجود در پرچم خواهیم داشت.



نکته قرآنی

در بخش تولید مثلی نر (پرچم) نهان دانگان، لوله گرده و گامت های نر (اسپرم) به وجود نمی آیند! لوله گرده و گامت های نر (اسپرمها)، در بخش تولید مثلی ماده نهان دانگان (مادگی) به وجود می آیند. در بخش مادگی هم تخمزا و هم اسپرم تولید می شود. در نهان دانگان، یاخته های جنسی نر و ماده (اسپرم و تخمزا) در یک حلقه گل به وجود می آید (حلقه چهارم). البته منشأ یاخته های تشکیل دهنده اسپرم در بساک پرچم (حلقه سوم) است.

تولید گامت ماده: در حلقه چهارم گل، مادگی را مشاهده می کنیم، مادگی از یک یا چند برچه ساخته شده است.

هر مادگی (یا برچه) شامل ۳ بخش است:


تخدمان خامه کلاله

تخدمان بخش متورم مادگی است و محل تشکیل تخمک یا تخمک هاست (در گیاهان مختلف در هر تخدمان، یک یا چند تخمک تشکیل می شود). در نهان دانگان، هر تخمک جوان شامل پوشش دولایه ای است که یاخته های دیپلوفیدی را در بر می گیرد. مجموع این یاخته ها، بافت خورش (نوعی بافت نرم آکنه ای) را می سازد.

برای تشکیل گامت ماده (تخمزا) مراحل زیر انجام می شود:



تشکیل گامت ماده با بررسی یک ژنوتیپ فرضی:



گرده‌افشانی و لقاح



- دقت کنید که نمودار بالا فقط برای گیاهانی که باخته‌های پیکری دیپلولوئید ($2n$) دارند صادق است! و برای گیاهان گل مغربی ($4n$ و $6n$) و گندم ($6n$ و $9n$) صادق نیست!
- تخم اصلی به رویان ($2n$) نمو می‌یابد و تخم ضمیمه، درون‌دانه یا آندوسپرم ($3n$) را ایجاد می‌کند.



نکته تنویر

به دلیل انجام شدن دو لقاح در کیسه روبانی، گفته می‌شود
که نهان دانگان لقاح مضاعف (دوتایی) دارند.

انواع آندوسپرم: ۱) اگر تخم ضمیمه (۳n)، تقسیم میتوز بدون سیتوکینز انجام دهد، آندوسپرم حالت مایع پیدا می‌کند (مانند شیر نارگیل).


۲) اگر تخم ضمیمه (۳n)، میتوز با سیتوکینز انجام دهد، آندوسپرم حالت جامد و گوشتی دارد (مانند بخش سفید نارگیل).

تشکیل روبان از تخم اصلی: تخم اصلی پس از تشکیل، اولین تقسیم میتوزی خود را با سیتوکینز نامساوی انجام می‌دهد. از یاخته کوچک آن، روبان و از یاخته بزرگ آن، یک ساختار بندمانند برای اتصال روبان به تخمرک ایجاد می‌شود. هم‌زمان با تقسیم تخم اصلی، تخم ضمیمه هم تقسیم می‌شود و آندوسپرم را ایجاد می‌کند.

■ بخش قلبی شکل که از یاخته کوچک تخم اصلی شکل می‌گیرد بخش‌های مختلف روبان را به وجود می‌آورد: ۱) لپه‌ها مشخص ترین بخش روبان‌اند.

۲) ساقه و ریشه روبانی نیز در دو انتهای روبان تشکیل می‌شوند.

■ پوسته‌های تخمرک هم تغییر می‌کند و پوسته دانه را می‌سازند.



■ در تک‌لپه‌ای‌ها در زمان رویش دانه، لپه، مواد مغذی آندوسپرم را جذب می‌کند و به روبان انتقال می‌دهد.

■ در دولپه‌ای‌ها در زمان نمو دانه، لپه، مواد مغذی آندوسپرم را جذب کرده و رشد می‌کند.

نتیجهٔ نهایی: در گیاهان دولپه‌ای مثل حبوبات، لپه نقش ذخیره‌ای دارد در حالی که در تکلپه‌ای‌ها مثل گندم و ذرت، لپه نقش انتقال ذخایر برای رویان در حال رشد را دارد.

دولپه‌ای‌ها	تکلپه‌ای‌ها	اجزای دانه نارس
رویان آندوسپرم پوشش تخمک	رویان آندوسپرم پوشش تخمک	اجزای دانه رسیده
رویان پوسته دانه	رویان آندوسپرم پوشش دانه	ماقایسهٔ موارد مربوط به دانه در ۲ گروه
ساقة رویانی ریشه رویانی ۲ عدد لپه	ساقة رویانی ریشه رویانی ۱ عدد لپه	اجزای رویان از نهان دانگان
۲ عدد لپه	آندوسپرم	ذخیره دانه
ذخیره دانه در حال رشد	انتقال آندوسپرم به رویان در حال رشد	نقش لپه
پوسته تخمک تغییریافته	پوسته تخمک تغییریافته	پوسته دانه

بررسی ژنتیک‌های بخش‌های مختلف دانه:

بخش دانه	ژنوتیپ
لپه	$\text{ژنوتیپ تخم اصلی} = \text{ژنوتیپ اسپرم} \times \text{ژنوتیپ تخمزا}$
ساقة رویانی	$\text{ژنوتیپ تخم اصلی} = \text{ژنوتیپ تخمزا} \times \text{ژنوتیپ اسپرم}$
ریشه رویانی	$\text{ژنوتیپ تخم اصلی} = \text{ژنوتیپ تخمزا} \times \text{ژنوتیپ اسپرم}$



بررسی ژن و مسائل ژنتیک در گیاهان درس نامه

بخش دانه	ژنوتیپ
آندوسپرم	ژنوتیپ تخم ضمیمه = (مجموع ژنوتیپ دو هسته یاخته دوهسته‌ای) × اسپرم
پوسته دانه	ژنوتیپ پوسته تخمک = ژنوتیپ والد ماده

۱ یاخته‌های حاصل از تقسیم میوزی در گیاهان، برخلاف انسان توانایی تقسیم میتوz را دارند. یاخته‌هایی مشابه عدد کروموزومی خود تولید می‌کنند؛ بنابراین در تولید گامت‌های نر (اسپرم) و ماده (تخم‌زا) نقش دارند. از نظر ژنتیکی همه هسته‌های کیسه روبانی مشابه ژنوتیپ یاخته بزرگ باقی‌مانده از تقسیم میوزی هستند. از نظر ژنتیکی یاخته رویشی و یاخته زایشی (و دو اسپرم حاصل از میتوz آن)، مشابه ژنوتیپ گرده نارس هستند.



الف اگر ژنوتیپ یاخته بزرگ حاصل از میوز در تخمک Ab باشد ژنوتیپ تخم‌زا و یاخته دوهسته‌ای را تعیین کنید:

$$Ab \Rightarrow \begin{cases} \text{تخم‌زا} = Ab \\ \text{دوهسته‌ای} = Ab + Ab \end{cases}$$

ب اگر ژنوتیپ گرده نارس AB باشد یاخته‌های رویشی، زایشی و اسپرم چه ژنوتیپی دارند؟

$$AB \Rightarrow \begin{cases} \text{اسپرم} = AB \\ \text{یاخته زایشی} = AB \\ \text{دانه گرده نارس} = AB \\ \text{یاخته رویشی} = AB \end{cases}$$

اگر ژنوتیپ یاخته‌های خورش تخمک یک گیاه AB و ژنوتیپ یاخته‌های دیپلولئیدی پرچم گیاه دیگر از همین گونه، CD باشد به شرط آمیزش بین دو گیاه فوق، انواع ژنوتیپ‌های رویانی و آندوسپرم دانه را بنویسید.

پاسخ ابتدا محصولات میوزی تخمک و پرچم را تعیین می‌کنیم:

$$2n = AB \Rightarrow \text{والد ماده}$$

محصولات میوزی

$$\begin{cases} n = A \\ n = B \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{انواع کیسه‌های} \\ \text{رویانی} \end{array}$$

$$\begin{cases} n = A \\ n + n = A + A \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{تخمزا} \\ \text{یاخته دوهسته‌ای} \end{array}$$

$$\begin{cases} n = B \\ n + n = B + B \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{تخمزا} \\ \text{یاخته دوهسته‌ای} \end{array}$$

$$2n = CD \Rightarrow \text{والد نر}$$

محصولات میوزی

$$\begin{cases} n = C \\ n = D \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{انواع اسپرم‌ها} \\ \text{بعد از گرده‌افشانی} \end{array}$$

$$\begin{cases} n = C \\ n = D \end{cases}$$

آمیزش بین اسپرم‌ها و یاخته‌های خاصی از کیسه‌های رویانی را انجام می‌دهیم:

$$\text{اسپرم} \times \text{تخمزا} = \text{تخم اصلی} = \text{رویان}$$

$$\text{اسپرم} \times \text{یاخته دوهسته‌ای} = \text{تخم ضمیمه} = \text{آندوسپرم}$$

$$C \times \begin{cases} \text{اسپرم} \\ C \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{ll} \text{تخمزا} & \\ \overbrace{\begin{array}{l} A \\ A + A \end{array}} & \end{array}$$

رویان $2n = AC$

آندوسپرم $3n = AAC$

دوهسته‌ای



بررسی ژن و مسائل ژنتیک در گیاهان درس نامه

$$\begin{array}{l} \text{اسپرم} \\ C \times \begin{cases} B & 2n = BC \\ B+B & 3n = BBC \end{cases} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{رویان} \\ \text{آندوسپرم} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{اسپرم} \\ D \times \begin{cases} A & 2n = AD \\ A+A & 3n = AAD \end{cases} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{رویان} \\ \text{آندوسپرم} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{اسپرم} \\ D \times \begin{cases} B & 2n = BD \\ B+B & 3n = BBD \end{cases} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{رویان} \\ \text{آندوسپرم} \end{array}$$

اگر والد ماده $2n = aa$ و والد نر $2n = Aa$ باشد، ژنوتیپ

انواع آندوسپرم‌های حاصل از دگرلقارحی این ۲ پایه گیاهی را بنویسید.

پاسخ آندوسپرم از رشد یاخته ضمیمه حاصل می‌شود و تخم ضمیمه حاصل آمیزش اسپرم با یاخته دوهسته‌ای است.

$$2n = Aa \quad \text{والد ماده}$$

$$\frac{\begin{array}{l} \text{میوز} \\ \text{BOOK BANK} \end{array}}{\begin{array}{l} n = A \\ n = a \end{array}} \xrightarrow{\begin{array}{l} \text{ژنوتیپ انواع یاخته‌های} \\ \text{کیسه رویانی} \end{array}} \begin{array}{l} \text{نخجرا} \\ \left\{ \begin{array}{l} n = A \\ n + n = A + A \end{array} \right. \\ \text{یا} \\ \left\{ \begin{array}{l} n = a \\ n + n = a + a \end{array} \right. \\ \text{یاخته دوهسته‌ای} \end{array}$$

$$2n = aa \quad \text{والد نر}$$

میوز

$$n = a \Rightarrow \text{اسپرم} = a$$

$$\begin{array}{l} \text{ژنوتیپ آندوسپرم} \\ \text{یا} \end{array} \Rightarrow \text{آمیزش} \quad a \times (A + A) = AAa$$

$$\begin{array}{l} \text{ژنوتیپ آندوسپرم} \\ \text{یا} \end{array} \Rightarrow \text{آمیزش} \quad a \times \underbrace{(a + a)}_{\text{یاخته دوهسته‌ای}} = aaa$$

یاخته دوهسته‌ای

$$\begin{pmatrix} \text{تعداد تنوع} \\ \text{ژنتیکی یاخته‌های} \\ \text{میوزی پرچم} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \text{تعداد تنوع} \\ \text{ژنتیکی یاخته‌های} \\ \text{میوزی بافت خورش} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{تعداد تنوع} \\ \text{ژنتیکی} \\ \text{آندوسپرم} \end{pmatrix}$$

۷ ژنتیک پوسته دانه لوبيا Aa است، به شرط دگرلقارحی در تشکیل این دانه، کدام یک از ژنتیک‌های زیر قابل تشخیص است؟ تخمرا، اسپرم، لپه، ساقه رویانی

پاسخ پوسته دانه ژنتیک پایه مادری را نشان می‌دهد و مشابه پوسته تخمک است. اگر مادر ژنتیک Aa داشته باشد تخمرا می‌تواند A یا a باشد. با توجه به این که در سؤال ژنتیک پرچم داده نشده، پس نمی‌توانیم ژنتیک اسپرم را تعیین کنیم. بنابراین ژنتیک اسپرم نامعلوم، لپه = A؟ و ساقه رویانی = a؟ یا A؟

ژنتیک آندوسپرم دانه ذرت Aaa است. ژنتیک‌های زیر را در این دانه مشخص کنید. «دانه فوق به فرض، حاصل خودلقارحی است.» تخمرا - اسپرم - لپه - ساقه رویانی - پوسته دانه

پاسخ با توجه به ژنتیک آندوسپرم یاخته‌ای دوهسته‌ای a + a و اسپرم A خواهد بود. تخمرا a از طرفی چون دانه حاصل خودلقارحی است، بنابراین الاهای A و a از یک پایه حاصل شده است؛

بنابراین والد Aa = پوسته دانه = a، تخمرا = a، اسپرم = A، ساقه رویانی = تخم اصلی = Aa و پوسته دانه = Aa.

اگر همه تخمراها در همه تخمک‌های یک گیاه ژنتیک a داشته باشد ژنتیک یاخته‌های بافت خورش چیست؟

بررسی ژن و مسائل ژنتیک در گیاهان درس نامه

پاسخ با توجه به این که از تقسیم میوزی یاخته بافت خورش فقط یک یاخته باقی می‌ماند نمی‌توانیم ۱۰۰٪ ژنوتیپ یاخته بافت خورش را تعیین کنیم \leftarrow ژنوتیپ بافت خورش = ?

پاسخ اگر در ۱۰ تخمک در ۱۰ گل یک گیاه تخمزا ژنوتیپ a و در یکی از تخمک‌های این گیاه تخمزا ژنوتیپ A داشته باشد ژنوتیپ یاخته خورش چیست؟

پاسخ هر دو ال (دگره) یاخته بافت خورش در سؤال فوق معلوم شد و فراوانی الها اهمیتی ندارد \leftarrow ژنوتیپ یاخته بافت خورش = Aa

صفت رنگ دانه نوعی ذرت ۳ جایگاهی می‌باشد، به شرطی که تخمزا ژنوتیپ aBD و اسپرم ژنوتیپ AbD داشته باشد ژنوتیپ لپه، آندوسپرم در دانه‌های حاصل از لقادو گامت فوق را تعیین کنید.

پاسخ اگر ژنوتیپ تخمزا aBD است \leftarrow ژنوتیپ یاخته دوهسته‌ای نیز (aBD + aBD) است.

ژنوتیپ تخم اصلی = اسپرم \times تخمزا \leftarrow ژنوتیپ تخم اصلی = ژنوتیپ لپه \leftarrow aBD \times AbD = AaBbDd

ژنوتیپ تخم ضمیمه = اسپرم \times یاخته دوهسته‌ای = ژنوتیپ آندوسپرم \leftarrow (aBD + aBD) \times AbD = AaaBBbDDD \leftarrow

پاسخ اگر ژنوتیپ آندوخته دانه ذرت برای یک صفت ۳ جایگاهی AaaBBbDDd باشد. در این دانه ژنوتیپ ساقه رویانی را مشخص کنید.

پاسخ با توجه به ژنوتیپ آندوخته ذرت که در واقع همان بافت آندوسپرم می‌باشد می‌توان یاخته دوهسته‌ای و تخمزا را تعیین کرد.

AaaBBbDDd \Rightarrow اسپرم \leftarrow (یاخته دوهسته‌ای) \times اسپرم



(Abd)(aBD+aBD)

ژنوتیپ تخمزا = aBD = ژنوتیپ ساقه رویانی = ژنوتیپ تخم اصلی و
ژنوتیپ تخم اصلی = تخمزا \times اسپرم

$\Rightarrow Abd \times aBD$ = ژنوتیپ ساقه رویانی $\Rightarrow AaBbDd$

لطفاً دو دستگرمی شماره ۱۵ و ۱۶ را حل کرده و آنها را مقایسه کنید،
حتماً یک نکته کنکوری از مطالب آنها یاد می‌گیرید.

اگر ژنوتیپ لپه در دانه لوبيا **Aa** و ژنوتیپ پوسته دانه
baشد ژنوتیپ آندوسپرم دانه نارس لوبيا را تعیین کنيد.

پاسخ با توجه به اين که پوسته دانه ژنوتیپ پوسته تخمک را دارد
پوسته تخمک = aa

ژنوتیپ پوسته تخمک = ژنوتیپ یاخته بافت خورش در تخمک \leftarrow در
لپه فوق، قطعاً ژنوتیپ تخمزا a است و اسپرم A خواهد بود؛ حال می‌توانید
با تعیین ژنوتیپ یاخته دوهسته‌ای، ژنوتیپ آندوسپرم را تعیین کنید.
دوهسته‌ای = a + a \Rightarrow تخمزا = a + a

دوهسته‌ای \times اسپرم = ژنوتیپ تخم ضمیمه = ژنوتیپ آندوسپرم
 $= A \times (a + a) = Aaa$

اگر ژنوتیپ لپه در دانه لوبيا **Aa** باشد ژنوتیپ آندوسپرم
را در دانه نارس لوبيا تعیین کنيد.

پاسخ در سؤال فوق نمی‌توانیم با توجه به ژنوتیپ لپه، تخمزا و اسپرم
را مشخص کنیم؛ بنابراین دو حالت پیش‌بینی می‌کنیم.

$$\begin{array}{l} \text{۱ تخمزا = a و اسپرم = آندوسپرم} \\ \text{۲ تخمزا = A و اسپرم = آندوسپرم} \end{array}$$

یا



اگر گیاه اصلی $6n$ کروموزومی باشد تعداد مجموعه‌های کروموزومی تخمزا، اسپرم، یاخته دوهسته‌ای و آندوسپرم را تعیین کنید.

پاسخ اگر گیاه اصلی $6n$ باشد \Rightarrow تخمزا = $3n$ و اسپرم = $3n$ \Rightarrow آندوسپرم = $3n \times (3n + 3n) = 9n$ یاخته دوهسته‌ای ریاضی نیست! بلکه به معنی تقاطع و مختلطشدن است به طوری که در واقع همه مجموعه‌های کروموزومی با لفاح (آمیزش) در کنار هم قرار می‌گیرند.

اگر آندوسپرم نوعی گیاه $12n$ کروموزومی باشد تعداد مجموعه‌های کروموزومی تخمزا، اسپرم و یاخته دوهسته‌ای را تعیین کنید.

پاسخ $(\text{یاخته دوهسته‌ای}) \times \text{اسپرم} = \text{آندوسپرم}$
 $12n = ?n \times (?n + ?n) \Rightarrow 12n = 3?n \Rightarrow 4 = ?$

$(4n + 4n)$	یاخته دوهسته‌ای
$4n = 4n$	اسپرم
$\left. \begin{matrix} \\ \end{matrix} \right\} \text{تخمزا}$	=

اگر از یک نوع جایگاه کروموزومی در یاخته‌های آندوسپرم، ۶ نسخه مشاهده شود تعداد مجموعه‌های کروموزومی اسپرم، تخمزا، یاخته دوهسته‌ای و گیاه اصلی را تعیین کنید.

پاسخ چون از یک نوع جایگاه کروموزومی در یاخته‌های آندوسپرم، ۶ نسخه مشاهده می‌شود یعنی، آندوسپرم $6n$ کروموزومی است.

$$6n = ?n \times (?n + ?n) \quad (\text{یاخته دوهسته‌ای}) \times \text{اسپرم}$$

$$6n = 3?n \Rightarrow ? = 2$$

$2n = 2n$	اسپرم
$\left. \begin{matrix} \\ \end{matrix} \right\} \text{تخمزا}$	=
$2n + 2n = 4n$	یاخته دوهسته‌ای



زنگان

تعريف: به محتوای ماده وراثتی یاخته‌های یک گونه گیاهی خاص، زنگان آن گونه می‌گویند.

برای مطالعه زنگان یک گونه گیاهی، محتوای ماده وراثتی هسته به علاوه ماده وراثتی سیتوپلاسم بررسی می‌شود. برای مطالعه محتوای ماده وراثتی هسته، از هر نوع کروموزوم، فقط یک نسخه بررسی می‌شود. همچنین برای شناسایی محتوای ماده وراثتی سیتوپلاسم، DNA میتوکندری به علاوه DNA کلروپلاست بررسی می‌شود.

چند نکته مهم کنکوری درمورد تنظیم بیان ژن در یاخته‌های گیاهی:
1 ژن‌های سنتز آنزیم‌های مؤثر در تولید کوتین در یاخته‌های روپوستی بیان می‌شود.

2 ژن‌های سنتز آنزیم روپیسکو در یاخته‌های کلروپلاست دار بیان می‌شود.
3 ژن سنتز هورمون‌های گیاهی در شرایط خاص بیان می‌شود، مانند ژن‌های مؤثر در تولید آبسیزیک اسید، در شرایط نامناسب (کم آبی) بیان می‌شود.

4 هورمون جیبرلین در بیان ژن‌های سنتز آنزیم‌های گوارشی در دانه در حال رویش مؤثر است.

5 ژن‌های مؤثر در تولید آنزیم‌های مؤثر در واکنش‌های قندکافت و گلیکولیز در یاخته جنسی نر خزه‌ها به مقدار زیاد بیان می‌شود (یاخته نر متحرک است و ATP مصرف می‌کند).

6 در گیاهان به علت عدم تحرک می‌توانند با تنظیم بیان ژن‌ها و تنظیم الگوهای رشد به شرایط متفاوت محیطی پاسخ مناسب دهند و بقای خود را در همه شرایط محیطی حفظ کنند.



گونه‌زایی در گیاهان

تعريف گونه: با توجه به تعریف ارنست مایر، گونه مجموعه افرادی هستند که می‌توانند با هم آمیزش موفق داشته باشند و فرزندانی زیستا و زایا تولید کنند. با توجه به تعریف فوق اگر دو گیاه سالم، آمیزش موفق نداشته باشند قطعاً از ۲ گونه گیاهی خواهند بود.

در گیاهان، گونه‌زایی به شکل هم‌میهنی مشاهده می‌شود. (البته گونه‌زایی دگر میهنی نیز وجود دارد!) در گونه‌زایی هم‌میهنی، قطعاً خطای میوزی و گامت‌های غیرطبیعی شکل می‌گیرد.

از گونه‌زایی هم‌میهنی می‌توان گونه جدید در گیاهان مشاهده کرد:

از یک گونه، گونه جدید شکل می‌گیرد. (گیاهان پلی‌پلوئیدی)


پیدایش گیاهان پلی‌پلوئیدی گونه‌زایی هم‌میهنی محسوب می‌شود. اگر در یک گونه، گامت غیرطبیعی با تمام کروموزوم‌های والدی تولید شود و این گامت با یک گامت غیرطبیعی مشابه خود آمیزش دهد گونه جدید که نوعی پلی‌پلوئیدی است به وجود می‌آید؛ مانند گونه جدید (۴n) گل مغربی.

BOOK BANK \Rightarrow گیاه اولیه $\Rightarrow 2n = 14$

گامت طبیعی $(n = 7)$ $(n = 7)$

ل-fashion گامت‌های طبیعی

$2n = 14$



برای اثبات این که $2n = 4n$ یک گونه جدید است به درسنامه فصل ۴ همین کتاب مراجعه کنید.

نکات داغ کنکوری

در هر یاخته زنده (به جز یاخته آبکشی) قند کافت (گلیکولیز) انجام می‌شود.
در هر یاخته زنده (به جز یاخته آبکشی)، انرژی زیستی در غیاب اکسیژن تولید می‌شود (ATP تشكیل شده در گلیکولیز).
در هر یاخته واجد کلروپلاست، قطعاً واکنش‌های تنفس یاخته‌ای انجام می‌شود.
در هر یاخته‌ای که گلیکولیز انجام شود ممکن است فتوسنتز انجام نشود.
ممکن است از برخی از یاخته‌های رویان بتوان همه اطلاعات و راثتی (زنگان) گیاه را مشخص کرد (منظور لپه‌هایی است که بیرون از خاک فتوسنتز می‌کنند و علاوه بر هسته و میتوکندری، واجد کلروپلاست هم خواهند بود).
در هر یاخته زنده واجد میتوکندری همه محصولات و آنزیم‌های گلیکولیز و کربس مشاهده می‌شود.

در هر یاخته زنده کلروپلاستدار، ATP به هر ۳ شکل ساخته می‌شود:
(۱) تولید ATP در سطح پیش‌ماده، (۲) تولید ATP در واکنش‌های اکسیشی و (۳) تولید ATP در حضور نور)

همه آنزیم‌ها و محصولات کالوین در یاخته‌های کلروپلاستدار وجود دارند. (البته خود چرخه کالوین در یاخته‌های میانبرگ گیاهان $4n$ انجام نمی‌شود!)

در یک گیاه $2n$ کروموزومی با ژنتیپ ناخالص می‌توان یاخته‌هایی با ۲ ال مشابه یافت (یاخته دوهسته‌ای).

در یک گیاه $2n$ کروموزومی با ژنتیپ ناخالص می‌توان یاخته‌هایی با ۲ ال مشابه در یک هسته یافت (یاخته تخم ضمیمه و آندوسپرم دانه).



پرسش‌های تستی

- ۹۳- چند عبارت جمله مقابله به درستی تکمیل می‌کند؟ «هر».
- (الف) دانه‌ای که لپه در آن نقش اندوخته دارد، بافت ۳n کروموزومی تشکیل نمی‌دهد
- (ب) دانه‌ای که اندوخته جزئی از رویان است، لپه نقش انتقال ذخایر را ندارد
- (پ) رویان دانه حاصل خودلقاحی، ژنوتیپ خالص دارد
- (ت) دانه واجد آندوسپرم، قطعاً لپه نقش انتقال ذخایر به دانه در حال رشد را دارد
- ۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)
- ۹۴- چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟ «در دانه‌ای که آندوسپرم آن در زمان نمو دانه مصرف می‌شود».
- (الف) آندوسپرم، در انتقال ذخایر نقشی ندارد
- (ب) در یاخته‌های لپه، انرژی زیستی در غیاب اکسیژن تولید می‌شود
- (پ) می‌توان تولید اکسیژن را مشابه تولید آب مشاهده کرد
- (ت) قطعاً رویش دانه، رو زمینی است
- ۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)
- ۹۵- چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟ «اگر ژنوتیپ لپه در دانه لوبيای حاصل خودلقاحی، Aa باشد قطعاً ژنوتیپ دارد.»
- (الف) تخمزا - a
- (پ) پوسته دانه - Aa
- ۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)
- ۹۶- چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟ «اگر ژنوتیپ لپه در دانه ذرت Aa باشد قطعاً ژنوتیپ دارد.»
- (الف) تخمزا - a
- (پ) پوسته دانه - Aa
- ۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)



۹۷- چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

«ممکن نیست در گیاهی مشاهده کرد.»

الف) با ژنتیپ ناخالص، یاخته‌ای با ۲ الی مشابه

ب) آندوسپرم واجد ۶ جایگاه ژنی مشابه

پ) جذب بخشی از رویان توسط آندوسپرم

ت) گلی ناکامل، واجد پرچم و مادگی

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۹۸- در گیاهانی که آندوخته دانه بخشی از رویان نیست، تعیین ژنتیپ آندوخته

در تعیین ژنتیپ چند مورد مؤثر نیست؟ (دانه حاصل دگرلقارحی فرض شود.)

الف) تخمزا

ب) اسپرم (پ) یاخته دوهسته‌ای

ت) پوسته دانه

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۹۹- اگر آندوخته دانه ذرت Aaa فرض شود به شرطی که دانه حاصل خودلقارحی

فرض شود، چند ژنتیپ، قابل تشخیص است؟

الف) تخمزا (ب) اسپرم

ت) پوسته دانه (پ) یاخته دوهسته‌ای

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۰۰- اگر آندوخته دانه ذرت AAA فرض شود، به شرطی که دانه حاصل خودلقارحی

فرض شود، چند ژنتیپ قابل تشخیص است؟

الف) تخمزا (ب) اسپرم

ت) پوسته دانه (پ) یاخته دوهسته‌ای

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۰۱- اگر ژنتیپ پوسته دانه ذرت AB باشد کدام مورد ممکن نیست؟

(۱) آندوسپرم (۲) تخم ضمیمه = AAC

(۳) ساقه رویانی (۴) پوشش تخمک = AB



بررسی ژن و مسائل ژنتیک در گیاهان پرسشنامه

۱۰۲- اگر در اندوخته دانه نوعی ذرت از هر کروموزوم ۱۲ نسخه مشاهده شود تعداد مجموعه‌های کروموزومی کدامیک صحیح بیان شده است؟

$$4n = \text{ساقة رویانی} \quad (1) \text{ آندوسپرم}$$

$$8n = \text{پوسته دانه} \quad (3) \text{ تخم‌زا}$$

۱۰۳- اگر در ریشه رویانی از هر نوع جایگاه ژنی چهار نسخه مشاهده شود تعداد مجموعه‌های کروموزومی در چند مورد صحیح است؟

$$8n = \text{تخم اصلی} \quad (6) \text{ آندوسپرم دانه}$$

$$4n = \text{پوسته دانه} \quad (2) \text{ تخم‌زا}$$

$$4(4) \quad 3(3) \quad 2(2) \quad 1(1)$$

۱۰۴- چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟
برای رنگ دانه نوعی ذرت، سه جایگاه ژنی متفاوت نقش دارد، با توجه به این صفت، برای ژنوتیپ ممکن است.

$$\text{الف) تخم‌زا} - AAB \quad \text{ب) اسپرم} - ABD$$

$$\text{ت) یاخته دوهسته‌ای} - AaBbDd \quad \text{پ) آندوسپرم} - ABD$$

$$\text{ث) ساقه رویانی} - AAbbDD \quad (1) \quad 1(1)$$

$$4(4) \quad 3(3) \quad 2(2)$$

۱۰۵- چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟
در تعیین ژنگان آبالو هر یاخته مناسب است.
الف) نرم‌آکنه‌ای
ب) زنده در میانبرگ
ت) احیاکننده $NADP^+$

$$4(4) \quad 3(3) \quad 2(2) \quad 1(1)$$

۱۰۶- چند عبارت نادرست بیان شده است؟
الف) ممکن نیست در گیاهان یاخته تمایز یافته، آرایش‌های ریزلوله‌ای در سیتوپلاسم تشکیل دهد.
ب) از یاخته‌های رگبرگ در ذرت ممکن نیست ژنگان گیاه را تعیین کرد.



پ) در گل مغربی، همانندسازی اطلاعات وراثتی توسط دورگه‌های نازا ممکن نیست.

ت) می‌توان یاخته‌های تریپلوبئیدی در گیاه زیستا و زایا مشاهده کرد.

- ۴ (۴) ۳ (۳) ۲ (۲) ۱ (۱)

۱۰۷- چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کنند؟

در شکل روبرو از تکثیر یاخته حاصل از تقسیم می‌توان را مشاهده کرد.»

- الف) گرددہ نارس
 - ب) کیسه رویانی
 - پ) دانہ گردہ رسیدہ
 - ت) تخم زما

- ۴۴ ۳۳ ۲۲ ۱۱

۱۰۸- از تقسیم یک پاخته گیاهی در محل تشکیل خود حاصل نمی شود.

- ۱) دانه گرده رسیده
۲) کیسه رویانی
۳) آندوسپیرم
۴) اسپرم

..... ۱۰۹ - در تشکیل یک گونه جدید در گیاهان به روش هم میهنه قطعاً مشاهده می شود.

- ۱) گامت طبیعی، ۲) گونه اولیه

۳) دورگه‌های زیستا و زایا ۴) خطای میوزی

۱۱۰- چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

«اگر ژنوتیپ بافت خورش برای یک صفت دو حایگاهی AaBb و ژنوتیپ باخته‌های دیبلوئیدی $aabb$ باشد، در آزمیش بین دو گیاه فوچ

ایجاد بازنویسی ممکن است.»

الف) آندوسیم - AAAaBbb ب) لیہ - aaBb

پرسش‌نامه گیاهان زن و مسائل زنیک در

aabb - و بانه ساقة ت)

ب) بسته دانه AaBb -

۴۰۴ ۳۰۳

۲۸۱

۱۱۱- کدام یک محتوای بیشتری از ژنگان گیاه لوسا را دارد؟

۲) دانہ گدہ، سیدھ

کسٹہ، وہ بانے

٤٦

۱۱۲- هر گیاه که موذوم، قطعاً

(۱) ۴۷ - از تخم ۴۷ ک و موزو و م بدید آمده است

(۲) ۲n - گامت n کی ممکنہ تشكیل میں دھد

^{۴۱} - از گونه مشایه خود پدید آمده است

۴۱) گامت‌های طبیعی، تشکیل، می‌دهد

۱۱۳- با توجه به انواع یاخته‌ها در بی‌گ ذرت، چند مورد درست بیان شده است؟

الف) آغاز و پایان ترجمه از mRNA مربوط به آنزیم‌های گلیکولیزی در

سیتوپلاسم رخ می دهد.

ب) در بُرخی از پاخته‌های رگیرگ، عدد اکسایشی NADP^+ کاهش می‌یابد.

ب) در نوعی از پاخته‌های روپوستی، می‌توان آنژیمی با دو نقش متفاوت

مشاهده کرد.

ت) در همه یاخته‌های زنده، الی‌های مشابه تخم تشکیل‌دهنده این گیاه

مشاهدہ میں شود۔

۴ (۴) ۳ (۳)

۲۷

1 (1)

¹¹⁴- با قارگفتن دانه گده گل میمونی سفید (WW) ب روی کلاله گل

میمونی صورتی (RW)، کدام رخنمود (فنوتیپ) برای رویان و کدام ژن نمود

(زنوتیپ) یا ای درون دانه (آندوسیپ) مورد انتظار است؟

RRR - تهیی

WWR - تیکو)

WWW - سفید ۴

WRR - سفید ۳



۱۱۵- با توجه به مراحل تکثیر جنسی در یک گیاه نهان دانه که گل های کامل دارد، چند مورد درست بیان شده است؟
(سراسری خارج از کشور ۹۸)

الف) همه یاخته های تک لاد (هاپلوفئیدی)، پس از تشکیل به یکدیگر متصل باقی میمانند.

ب) بعضی یاخته های تک لاد (هاپلوفئیدی)، پس از نظر دیواره دستخوش تغییر میگردند.

پ) همه یاخته های تک لاد (هاپلوفئیدی)، در ابتدای تشکیل، تقسیم رشتمان (میتوز) انجام میدهند.

ت) بعضی یاخته های تک لاد (هاپلوفئیدی)، در زمان تشکیل، توسط یاخته های دولاد (دیپلوفئیدی) احاطه میشوند.

۱) ۱ (۴) ۲ (۳) ۳ (۲) ۴ (۱)

۱۱۶- همه یاخته های تک لاد (هاپلوفئیدی) موجود در یک گیاه دو جنسی چه مشخصه ای دارند؟
(سراسری خارج از کشور ۹۸)

۱) پس از تشکیل، به یکدیگر متصل باقی میمانند.

۲) پس از تشکیل، از نظر دیواره دستخوش تغییر میشوند.

۳) در ابتدای تشکیل، تقسیم رشتمان (میتوز) انجام میدهند.

۴) در زمان تشکیل، توسط یاخته های دولادی (دیپلوفئیدی) احاطه میشوند.

۱۱۷- با قرار گرفتن دانه گرده گل میمونی صورتی (RW) بر روی کلاله گل میمونی سفید (WW)، کدام رخ نمود (فنتیپ) برای رویان و کدام ژن نمود (ژنوتیپ) برای درون دانه (آندوسپرم) مورد انتظار است؟
(سراسری خارج از کشور ۹۸)

۱) قرمز - RRR WWW -

۲) صورتی - RRW RWW -

