

## مقدمه ناشر

آقای لئوناردو فیبوناچی یه ریاضی دان قرون وسطاییه. وقتی بجه بود «بیگالونه» صداش می‌کردن (بیگالونه یعنی کله بوک و احمق). همین جناب بیگالونه، شد ریاضی دان بزرگ و یک دنباله کشف کرد که ما الان بهش می‌گیم دنباله فیبوناچی:  $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots$

در این دنباله، جمع هر دو جمله متولی می‌شه جمله بعدی و دیگه این که به غیر از چندتا جمله اول، نسبت جمله  $n$  به جمله  $n-1$  با تقریب خوبی برابر با  $\Phi = 1/\sqrt{5}$  می‌شه. این نسبت معروف به «تناسب الهی» یا «تناسب طلایی». حُب همه اینا درست! آخرش که چی؟

جالبی داستان اینه که، دنباله آقای بیگالونه و نسبت طلاییش یکی از گُدها و رمزهای طبیعته. مثلاً در موجودات زنده رشد سریع‌تر بافت‌های داخلی نسبت به بافت‌های خارجی باعث شکل‌گرفتن انحناها و پیچ‌وتاب‌هایی می‌شه که منطبق با تناسب طلاییه: تراشه‌های چوب درخت چنار، میوه‌کاج، چنگال‌های گربه‌سانان، حلزون‌گوش میانی، دندان‌های نیش ببر و حتی انحنای طریف و شاعرانه لب معشوق!

فکر کنم این جمله از گالیله‌ست که: «قوانین طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده» حتی نسبت طول به عرض منحنی‌های سینوسی مولکول‌های RNA و DNA هم برابر نسبت طلاییه؛ یعنی ما چه بخوایم چه نخوایم ریاضی تو وجودمنه، فقط باید بیگالونه باشیم و کشف کنیم. حتماً خوندن این کتاب ریاضی دان درون شما رو بیدار می‌کنه. بی‌هیچ ترتیب و آدابی از رفقاء خوبم سروش، کوروش و رسول ممنونم واقعاً که کتاب خوبی نوشته‌ین و مطمئنم هر کی بخونه کیف می‌کنه.

مرسی از همه دوستای خیلی‌سبزی که برای کتابشدن این کتاب زحمت کشیدن به ویژه آقای محسن فراهانی و خانم مریم نظری که زحمت از صفر تا صد این پرتوه روی دوششون بود و بروپجه‌های تولید و ویراستاری خوبی‌مون. هم‌چنین از آقای علیرضا محمدی و خانم آرزو کامیار سپاسگزارم.

شاد باشید و خوشحال درس بخونید.

## مقدمه مؤلفان

سلام

به کلاس دهم و متوسطه دوم خوش آمدید.

سه سال دیگر باید در دبیرستان درس بخوانید تا برای چالش‌های بزرگتر و جذاب‌تر زندگی آماده‌تر شوید. ریاضیات سال دهم یا همان ریاضی (۱)، کتاب خیلی مهمی است و شما هم که به چیزهای مهم علاقه‌مندید و قرار است با کتاب تست ریاضی دهم خیلی سبز، ریاضی‌تان را قوی‌تر کنید.

هر چه قدر که در سال‌های دهم و یازدهم درس بخوانید، تست بزنید و زحمت بکشید جای دوری نمی‌رود؛ این سال‌ها مثل پسانداز هستند. کتاب دهم هفت فصل دارد: در فصل اول سه مطلب جدا از هم به نام‌های مجموعه، الگو و دنباله دارید. با مجموعه از دوره متوسطه اول آشنا هستید، الگو و دنباله مطالب جدید و نسبتاً ساده‌ای هستند. کل مطالب این فصل در همین سال به پایان می‌رسد و سال‌های بعد کاری با آن‌ها ندارید.

در فصل دوم با مطلب جدیدی به نام مثلاً آشنا می‌شوید که بسیار مهم است و در سال یازدهم و دوازدهم نیز حضور دارد. مثلاً را با علاقه و آینده‌نگری، خوووووب یاد بگیرید.

در فصل سوم مفاهیم توان و ریشه را از سال نهم می‌شناسید. با اتحادها هم یک آشنا‌یی مختصر دارید که امسال تکمیل می‌شود. آخر این فصل، تجزیه و عبارت‌های گویا منتظران هستند.

فصل چهارم مهم است، خیلی مهم! معادله درجه‌دوم و نمودار سهمی و تعیین علامت و نامعادله، در سال‌های بعد و مبحث‌های دیگر هم به کارتان می‌آید. این فصل را هم با عشق بخوانید و خیلی تمرین حل کنید. مرررسی.

در فصل پنجم صحبت از مفهوم تابع است. تابع در سال یازدهم و دوازدهم هم هست و هر سال کامل‌تر و مهم‌تر می‌شود. توصیه می‌کنیم از همین اول کار با تابع دوست شوید.

در فصل‌های ششم و هفتم، فضای درس کمی عوض می‌شود. بحث شمارش و احتمال شبیه هم هستند. صحبت از سکه، تاس، انتخاب، چیدن افراد، اشیا، عددسازی، کلمه‌سازی و این‌ها است. بادتان هست که در سال‌های هفتم و هشتم، احتمال داشتید و در اینجا همان مطالب را دوره می‌کنید و بیشتر یاد می‌گیرید. این فصل مهم، مثل تابع و مثلاً، احتمال هم در سال‌های یازدهم و دوازدهم مهمان شما است. میزبان خوبی باشیدا

آخر فصل هفتم، کتاب درسی چند صفحه از آمار و انواع متغیرها گفته است که ادامه‌اش را در سال یازدهم می‌بینید. اگر داوطلب رشته ریاضی هستید که باید ریاضی را عاشقانه بخوانید. اگر تجربی هستید هم از الان خبر داشته باشید که کسب نمرات بالا در ریاضی امتحان نهایی و کنکور، برای رسیدن به اهدافتان خیلی مفید است. پس همه با صدای بلند: ریاضی را می‌خوانیم و تمرین می‌کنیم و تست می‌زنیم. ساختار این کتاب به ترتیب درس‌نامه، تست و پاسخ است. در درس‌نامه مثال‌های کافی شما را گرم می‌کنند تا برای حل تست‌های آماده بشوید. در تست‌های هر فصل، چند سوال با لوگوی آمده‌اند که از تست‌های عادی دشوارترند. اگر نتوانستید آن‌ها را به راحتی حل کنید، نگران نباشید ولی سعی کنید از راه حل‌ها ایده بگیرید. توصیه می‌کنیم حل تمام تست‌ها را بخوانید، چرا؟ خب شاید روش بهتر یا نکته‌ ریزی داشته باشد که به دردتان بخورد. کتاب درسی دهم اولین بار در سال تحصیلی ۱۳۹۵ وارد نظام آموزشی ایران شد. کتاب تست خیلی سبز نسبت به چاپ اولش، تغییرات زیادی داشته و کتابی که از الان دست شماست، کمالاً بازنویسی شده است. تلاش زیادی کرده‌ایم که درس‌نامه‌های پرمثال، تست‌های کافی و متنوع و پاسخ‌های تشریحی گویا، به شما بیش از پیش کمک کنند. در مسیر تألیف کتاب از راهنمایی و نظرات همکاران بسیاری بهره بردیم. در این میان تشکر از آقایان مصطفی کرمی، مقداد حسن‌زاده و احسان سجادیان ضروری است که تجربه‌های خود را با ما در میان گذاشته باشند.

بالآخره تشکرها درون انتشاراتی ...

سپاس از دو دکتر نصیری، که در خیلی سبز، خیلی خیلی سبز هستند. تشکر ویژه از دکتر کمیل که مدیریت کار تألیف را بر عهده داشتند. سپاس ویژه از آقای محسن فراهانی و خانم مریم نظری که امور هماهنگی و پیگیری را صبورانه انجام دادند. تشکر از تیم تایپ و رسم شکل و صفحه‌آرایی و گرافیک و ... که در امور اجرایی همراه این کتاب بودند. ویراستاران چاپ جدید کتاب آقایان محسن فراهانی، آرین توسل، علیرضا محمدی و خانم‌ها زهرا زهرا جالینوسی، شفاقی راهبریان، آرزو کامیار، مریم نظری و اکرم امیدی زحمت کنترل محاسبات و سؤال و پاسخ و شکل و همه‌چیز را به نحو احسن کشیدند. طرح جلد و نظارت چاپ و پخش و امور مالی و اداری دست به دست هم دادند تا کتاب به موقع و زینده، به دستتان برسد. ممنون از همه. خدا قوت ...

@mathmohsenimanesh

@soroushmueneen

# فهرست

## مجموعه، الگو و دنباله

- درس ۱: یادآوری مجموعه‌ها  
درس ۲: مجموعه‌های مهم اعداد – بازه  
درس ۳: مجموعه‌های متناهی و نامتناهی  
درس ۴: مجموعه مرجع و متهم  
درس ۵: تعداد اعضای اجتماع دو مجموعه  
درس ۶: الگوی خطی  
درس ۷: الگوی درجه دوم  
درس ۸: دنباله و سایر الگوهای آن  
درس ۹: دنباله حسابی (تصاعد حسابی یا تصاعد عددی)  
درس ۱۰: دنباله هندسی  
آزمون  
پاسخ‌نامه تشریحی  
پاسخ‌نامه آزمون

## مثلثات

- درس ۱: نسبت‌های مثلثاتی  
درس ۲: دایره مثلثاتی  
درس ۳: روابط بین نسبت‌های مثلثاتی  
آزمون  
پاسخ‌نامه تشریحی  
پاسخ‌نامه آزمون

## توان‌های گویا و عبارت‌های چربی

- درس ۱: ریشه و توان  
درس ۲: ریشه  $n$ ام  
درس ۳: توان‌های گویا  
درس ۴: اتحادها و تجزیه  
درس ۵: عبارت‌های گویا / گویاکردن مخرج‌های گنگ  
آزمون  
پاسخ‌نامه تشریحی  
پاسخ‌نامه آزمون

## معادله‌ها و تابعیت‌های معادله‌ها

- درس ۱: معادله درجه دوم و روش‌های مختلف حل آن  
درس ۲: سهمی  
درس ۳: تعیین علامت آزمون  
پاسخ‌نامه تشریحی  
پاسخ‌نامه آزمون

## (فصل ۵)

### تابع

- درس ۱: مفهوم تابع و بازنمایی‌های آن  
درس ۲: دامنه و برد  
درس ۳: مقدار تابع و نمایش ریاضی تابع  
درس ۴: تابع خطی  
درس ۵: انواع تابع  
درس ۶: رسم نمودار برخی توابع به کمک انتقال آزمون  
پاسخ‌نامه تشریحی  
پاسخ‌نامه آزمون

## شمارش، بدون شمردن

- درس ۱: شمارش  
درس ۲: جایگشت  
درس ۳: ترکیب آزمون  
پاسخ‌نامه تشریحی  
پاسخ‌نامه آزمون

## (فصل ۷)

### آمار و احتمال

- درس ۱: احتمال یا اندازه گیری شانس  
درس ۲: مقدمه‌ای بر علم آمار، جامعه و نمونه آزمون  
پاسخ‌نامه تشریحی  
پاسخ‌نامه آزمون

# الگو و دناله

(درس ۱)



## پادآوری مجموعه‌ها

مجموعه، دسته‌ای از اشیا است که خوب مشخص شده باشند؛ یعنی دقیقاً معلوم باشد کدام عضوها در مجموعه هستند و کدام عضوها نیستند. پس مثلاً مجموعه «شاعران معروف ایرانی» یا «گل‌های خوشبو» از نظر ریاضی مجموعه نیستند. اما مجموعه اعداد اول یکرقمی یک مجموعه است که آن را به صورت  $\{2, 3, 5, 7\} = A$  نشان می‌دهیم.

$$A = \{2, 3, 5\}$$

گاهی اوقات این مجموعه را به صورت نمودار ون شکل مقابل هم نشان می‌دهیم:

$A$  نام مجموعه است. می‌نویسیم  $2 \in A$  یعنی ۲ عضو مجموعه  $A$  است و  $6 \notin A$  یعنی عدد ۶ عضو مجموعه  $A$  نیست.

در مجموعه‌ها عضوهای تکراری را یک بار می‌نویسیم و ترتیب اعضا اهمیتی ندارد؛ پس مثلاً  $\{2, 1, 1, 2, 2\} = \{1, 1, 1, 2, 2\}$  است.

اگر تمام عضوهای مجموعه  $A$  در مجموعه  $B$  هم باشند، می‌نویسیم  $A \subseteq B$  و می‌خوانیم  $A$  زیرمجموعه  $B$  است. مثلاً  $\{1, 2, 3\} \subseteq \{1, 2, 3, 4\}$ . دقت کنید که  $\{2, 3, 5\} \not\subseteq \{1, 2, 3\}$ ، چون عضو ۱ در مجموعه اول هست اما در دومی نیست.

مجموعه‌ای که هیچ عضوی ندارد را  $\emptyset$  یا  $\{\}$  یا تهی می‌نامیم. مثلاً مجموعه اعداد اول دورقمی که یکان آن‌ها ۵ باشد، تهی است چون چنین عددی وجود ندارد. حواستان هست که  $\{\} = \emptyset$  تهی نیست، یک مجموعه اعضوی است!

تست اگر  $\{1, 2, 3\} = A$  و  $\{1\} = B$  چندتا از روابط  $\subseteq$ ,  $\subset$ ,  $\subsetneq$ ,  $\supset$ ,  $\supsetneq$ ,  $\neq$  درست هستند؟

۵ (۴)

۴ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

**پاسخ گزینه** خوب گوش کنید...  $A \subseteq B$  همواره درست است؛ هر مجموعه زیرمجموعه خودش است.

$$A = \{1, 2, \{\}\}$$

این  $B$  است.

$$A = \{1, 2, \{\}\}$$

عضو  $B$  در  $A$  هم هست.

$\emptyset \subseteq B$  نیز همیشه درست است؛  $\emptyset$  زیرمجموعه تمام مجموعه‌ها است.

$B \in A$  درست است؛ چون  $\{\} = B$  را به صورت عضو در مجموعه  $A$  می‌بینیم:

$B \subseteq A$  نیز درست است؛ چون عضو  $B$  یعنی عدد ۱، در  $A$  هم هست:

و بالاخره رابطه  $2 \in A$  درست است؛ چون عضو ۲ را در  $A$  داریم، پس ۵ رابطه درست‌اند.

تا اینجا هستید ببینید که  $\{\} \in B$ ,  $\emptyset \in B$ ,  $2 \in B$ , هیچ کدام درست نیستند.

## احتمال، اشتراک و تقاضل مجموعه‌ها

۱ اشتراک  $A$  و  $B$  مجموعه اعضاًی است که در هر دوی آن‌ها باشند. اشتراک دو مجموعه  $A$  و  $B$  را با  $A \cap B$  نشان می‌دادیم. پس مثلاً  $\{1, 2, 3\} \cap \{0, 1, 3, 4, 5\} = \{1, 3\}$   $\{1, 2, 3\} \cap \{4, 5, 6\} = \emptyset$

در ذهن داشته باشید که:

این را هم حتماً به یاد دارید:

يعنى اگر  $A$  زیرمجموعه  $B$  باشد، اشتراکشان می‌شود  $A \cap B = A$ .

اگر  $A$  و  $B$  عضو مشترکی نداشته باشند، یعنی  $A \cap B = \emptyset$ ، می‌گوییم  $A$  و  $B$  جدا از هم یا ناسازگارند.

احتمال  $A$  و  $A$  مجموعه اعضاًی است که در  $A$  یا در  $B$  یا در هر دوی آن‌ها باشند.

می‌گوییم اعضایی که در حداقل یکی از آن‌ها هستند. بینید:  $\{1, 2, 3\} \cup \{0, 2, 5\} = \{1, 2, 3, 0, 5\}$  (عضو تکراری را یک بار می‌نویسیم).

$$\{2, 4\} \cup \{-1, 3\} = \{-1, 2, 3, 4\}$$

$$A \cup \emptyset = A, A \cup A = A$$


$$A \cup B = B$$

لازم به تأکید هست که:


و هم‌چنین اگر  $A \subseteq B$  باشد، داریم:



نمودار ون را ببینید:



در حالتی که  $A \subseteq B$  است، نمودارهای اجتماع و اشتراک را ببینید:




تفاضل دو مجموعه  $A$  و  $B$  به صورت  $A - B$  یعنی مجموعه عضوهایی از  $A$  که در  $B$  نیستند. از آن طرف  $B - A$  یعنی مجموعه عضوهایی از  $B$  که در  $A$  نیستند.

پس مثلاً با دو مجموعه  $\{4, 5, 6\}$  و  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  و  $B = \{4, 5, 6\}$  داریم:

$$B - A = \{4, 5, 6\} - \{1, 2, 3, 4\} = \{5, 6\}$$

$$A - B = \{1, 2, 3, 4\} - \{4, 5, 6\} = \{1, 2, 3\}$$

نمودار ون خیلی خوب تر است:



موافقید که  $B - A$  و  $A - B$  مساوی نیستند، مگر این که خود  $A$  و  $B$  مساوی باشند.

در مورد اینها نظرتان چیست؟

$$A - A = \emptyset, A - \emptyset = A$$

$$\emptyset - A = \emptyset$$

$$A \subseteq B \Leftrightarrow A - B = \emptyset$$

$$A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow A - B = A, B - A = B$$

اگر  $A \subseteq B$  باشد،  $A - B$  می‌شود  $\emptyset$ . به زبان ریاضی:

اگر  $A$  و  $B$  اشتراک نداشته باشند،  $A - B$  می‌شود  $A$ . این طوری:

**تست** کدام با بقیه فرق دارد؟



$$(A \cup B) - B \quad (4)$$

(۳)


$$A - (A \cap B) \quad (2)$$

$$A - B \quad (1)$$

نمودار ون را برای  $(4)$  و  $(3)$  ببینید.



پس  $(1)$ ،  $(2)$  و  $(3)$  همگی  $A - B$  هستند، اما  $(4)$  فرق دارد:




**تست** کدام نادرست است؟

$$A \cap B \subseteq B \quad (4)$$

$$A \subseteq A \cup B \quad (3)$$

$$A - B \subseteq B - A \quad (2)$$

$$A - B \subseteq A \quad (1)$$



یک بار دیگر نمودار ون را ببینید:

داریم:


$$(A - B) \subseteq A, (A \cap B) \subseteq A, (A \cap B) \subseteq B$$

$$A \subseteq A \cup B, B \subseteq A \cup B$$

و البته هر سه مجموعه  $A \cup B$ ،  $B - A$  و  $A - B$ ، زیرمجموعه  $A \cup B$  هستند.


با نگاهی به نمودار ون، درستی رابطه‌های زیر را تأیید کنید.

$$A \cup (A \cap B) = A \cap (A \cup B) = A$$




$$(A \cap B) \cup (A - B) = A$$

$$(A - B) \cup B = A \cup B$$



**تست** اگر  $A$  مجموعه اعداد اول کمتر از ۲۰ و  $B$  مجموعه اعداد فرد کمتر از ۱۲ باشد،  $(A - B) \cup (B - A)$  چند عضوی است؟



۷ (۴)

۶ (۳)


۵ (۲)

۴ (۱)

در  $A$  عضوهای ۲، ۳، ۵، ۷، ۱۱، ۱۳، ۱۷ و در  $B$  اعضای ۱، ۵، ۷، ۹ و ۱۱ را داریم.

نمودار را ببینید:

پس  $A - B$  چهار عضو و  $B - A$  دو عضو و اجتماع آنها ۶ عضو دارد.



$$(A \cup B) - (A \cap B) = (A - B) \cup (B - A)$$

(A - B) همان  $(A \cup B) - (A \cap B)$  است. ببینید: یک مثال فانتزی هم از ترکیب اجتماع و اشتراک و تفاضل می‌بینیم:

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

**تست** اگر  $\{x \mid x \in \mathbb{Z}, (-1)^k \leq x \leq k\}$  چند عضو دارد؟

$$A_1 = \{x \mid x \in \mathbb{Z}, -1 \leq x \leq 1\} = \{-1, 0, 1\}$$

اولین کار نوشتن  $A_1$ ,  $A_2$  و  $A_3$  است. باید به جای  $k$  اعداد ۱، ۲ و ۳ را بگذاریم:

$$A_2 = \{x \mid x \in \mathbb{Z}, 1 \leq x \leq 2\} = \{1, 2\}$$


$$A_3 = \{x \mid x \in \mathbb{Z}, (-1)^3 \leq x \leq 3\} = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$$

$$A_1 \cap A_2 = \{-1, 0, 1\} \cap \{-1, 0, 1, 2, 3\} = \{-1, 0, 1\}$$

پس داریم:

$$\{-1, 0, 1, 2, 3\} - \{-1, 0, 1\} = \{2, 3\}$$

و در نتیجه تفاضل می‌شود: که دو عضو دارد.



$$A \subseteq C, 2 \in (A \cup B), 4 \in (A \cup B), 3 \subseteq A$$

۱- با توجه به نمودار مقابل، چندتا از عبارت‌های مقابل درست نیست؟

(۱) صفر

۲ (۳)

$$\{\{\}\} \subseteq A$$

$$\{\{\}\} \in A$$

$$\{\}\in A$$

$$\{\} \subseteq A$$

$$B \in C$$

$$A \in B$$

$$A \subset B$$

$$B \subset C$$

۲- در مجموعه  $\{ \{ \} , \{ \{ \} \}, \{ \{ \} , \{ \{ \} \} \}$  کدام گزینه نادرست است؟

$$A - B = \{C\}$$

$$B - C = \{1, 2\}$$

$$B - C = \emptyset$$

$$A - B = C$$

$$(A - C) \cup (B - C) = (A \cup B) - C$$

۳- اگر  $C = \{1, 2, \{2, 2\}\}$  و  $B = \{2, \{2\}\}$  ،  $A = \{2\}$  ،  $A \subseteq C$  و  $B \subseteq A$  ، کدام رابطه نادرست است؟

۵ (۴)

۴ (۲)

۳ (۱)

۴- اگر  $C = \{1, 2, 3\}$  و  $B = \{1, 2, 3, \{1, 2\}\}$  ،  $A = \{1, 2, \{1, 2, 3\}\}$  باشد، کدام رابطه درست است؟

۵- اگر  $A - B = \{C\}$  و  $B - C = \{1, 2\}$  ،  $B - C = \emptyset$  و  $A - B = C$  باشد، کدام گزینه نادرست است؟


۶- مجموعه  $\{ \{ \} , \{ \{ \} , \{ \{ \} \} \}, \{ \{ \} , \{ \{ \} , \{ \{ \} \} \} \}$  را در نظر بگیرید. کدام گزینه نادرست است؟

$$n(A \cap B) = n(A \cap C)$$

$$n((A \cup B) - C) = 7$$

$$n(C \cup \emptyset) = n(B \cap B)$$

۷- با توجه به شکل زیر، اجتماع دو مجموعه  $B - (B - A)$  و  $A - (A - B)$  چند عضو دارد؟



۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

۸- اگر  $A = \{2, 3, 6, 7, 8\}$  و  $B = \{2, 4, 5, 6\}$  باشند، مجموعه  $(A \cup B) - [A - (A \cap B)]$  چند عضو دارد؟

۵ (۴)

۴ (۳)

۳ (۲)

۲ (۱)

۹- اگر  $A$  مجموعه اعداد دورقی و  $B = \{7k : k \in A\}$  باشد، آنگاه مجموعه  $A \cap B$  چند عضو دارد؟





۵ (۴)

۴ (۳)

۳ (۲)

۱ (۱)

- نمایش هندسی مجموعه  $(A - B) \cup (B - C)$  کدام است؟



- قسمت رنگی شکل مقابل، نمودار ون کدام مجموعه است؟

$$(A \cap B) \cup C$$

$$(A \cup B) \cap C$$

(۱)

$$A - (B \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C)$$

(۳)

- اگر  $A$  و  $B$  دو مجموعه غیر تهی باشند، حاصل  $A - (B - (A \cap B))$  کدام مجموعه است؟

$$A \cup B$$

$$A \cap B$$

$$B$$

(۴)

- اگر  $A$ ,  $B$  و  $C$  سه مجموعه غیر تهی به طوری که  $A \subset B$  باشد، آن گاه مجموعه  $(A \cap (B - C)) - (A \cap B \cap C)$  کدام است؟

$$B$$

$$A$$

$$A \cap C$$

$$A - C$$

(۱)

$$B = \emptyset$$

$$A = \emptyset$$

$$B \subseteq A$$

$$A \subseteq B$$

(۴)

- اگر  $A \cap C = \emptyset$  و  $A \cap B = \emptyset$  و آن گاه کدام نتیجه‌گیری درست است؟

$$A \cap (B - C) \neq \emptyset$$

$$A \cap (B \cup C) = \emptyset$$

$$B \cap C \neq \emptyset$$

$$B \cap C = \emptyset$$

(۱)

- اگر  $A_n = \{m \in \mathbb{Z} \mid m \geq -n, 2^m \leq n\}$  باشد، آن گاه مجموعه  $A_4 \cap A_n$  چند زیرمجموعه دارد؟

۳۶ (۴)

۳۲ (۳)

۱۶ (۲)

۸ (۱)

## (درس ۲)



# مجموعه‌های مهم اعداد-بازه

نحوه دفعه اول

این مجموعه‌ها را از سال نهم می‌شناسید:

توضیح	عضوها	نماد	نام
$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{W} \subseteq \mathbb{W}$ است. در $\mathbb{W}$ علاوه بر اعداد طبیعی، صفر را داریم.	$1, 2, 3, \dots$	$\mathbb{N}$	اعداد طبیعی
$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$ است. $\mathbb{Z}$ شامل قرینه اعداد طبیعی هم هست.	$0, 1, 2, 3, \dots$	$\mathbb{W}$	اعداد حسابی
$\mathbb{Z}$	$0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$	$\mathbb{Z}$	اعداد صحیح
$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{W} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$ است. اعداد کسری مثل $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{5}$ ... علاوه بر اعداد صحیح، در $\mathbb{Q}$ هستند.	$\left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$	$\mathbb{Q}$	اعداد گویا
اعدادی مانند $\sqrt{2}$ و $\pi$ ، نمایش کسری ندارند.	$\mathbb{Q}^c$		اعداد گنگ
کل نقاط محور اعداد حقیقی را دارد.	$\mathbb{R}$		اعداد حقیقی

تست عدد  $\frac{\sqrt{98}}{\sqrt{8}}$  عضو چندتا از مجموعه‌های  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{Q}^c$  و  $\mathbb{R}$  است؟


۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

$$\frac{\sqrt{49 \times 2}}{\sqrt{4 \times 2}} = \frac{\sqrt{49}}{\sqrt{4}} = \frac{7}{2}$$

پاسخ گزینه به جای ۹۸ می‌نویسیم  $49 \times 2$  و به جای ۸ هم  $4 \times 2$  می‌گذاریم، پس داریم: پس این عدد  $\frac{7}{2}$  است. در  $\mathbb{Z}$  و  $\mathbb{Q}^c$  نیست و در  $\mathbb{R}$  و  $\mathbb{Q}$  هست. یعنی در دو تا از مجموعه‌ها.




در اعداد گنگ، تعداد رقم‌های اعشاری بی‌شمار است و دوره تناوب ندارد. مثلاً  $0.1010010001000010000010000001$ ، جذر اعدادی که مریع کامل نیستند و  $\pi$  گنگ هستند مجموعه اعداد گنگ را به صورت  $\mathbb{Q}^c$  یا  $\overline{\mathbb{Q}}$  هم نشان می‌دهیم. این خاصیت‌ها را ببینید:

$$\mathbb{Q} - \mathbb{Q}' = \mathbb{Q}, \mathbb{Q}' - \mathbb{Q} = \mathbb{Q}', \mathbb{Q}' \cap \mathbb{Q} = \emptyset, \mathbb{R} - \mathbb{Q} = \mathbb{Q}'$$

این مجموعه را در نمودار ون ببینید:

برای نمایش اعداد  $\sqrt{5}$  روی محور از رابطه فیثاغورس استفاده می‌شود، مثلاً نمایش  $\sqrt{5}$  روی محور را ببینید:  $OA = 2$ ,  $AB = 1$

$$OB^2 = OA^2 + AB^2 = 2^2 + 1^2 = 5 \Rightarrow OB = \sqrt{5} = OM$$


**تست**  $\mathbb{Q}$  با کدام مجموعه، اشتراک ندارد؟

$$\{x | -1 < x < 0\} \quad (2)$$

$$\{x | x^2 = \frac{4}{9}\} \quad (1)$$

$$\{x | x \notin \mathbb{Z}\} \quad (4)$$

$$\{x | x^2 = 3\} \quad (3)$$

**پاسخ گزینه** اعضای ۱ اعداد  $\frac{2}{3} \pm$  هستند که مربع آنها می‌شود  $\frac{4}{9}$  و با  $\mathbb{Q}$  اشتراک دارد، چون  $\frac{2}{3} \pm$  در  $\mathbb{Q}$  هستند. در ۲ اعداد گویای  $\pm \sqrt{3}$  باشند. با  $\mathbb{Q}$  مشترک‌اند. در ۴ هم اعداد غیرصحیح مانند  $\frac{1}{3} -$  با  $\mathbb{Q}$  مشترک‌اند. اما در ۳، اعدادی که  $x^2 = 3$  باشد هستند که در  $\mathbb{Q}$  قرار نمی‌گیرند؛ پس با  $\mathbb{Q}$  اشتراک ندارد.

**تست** اگر  $\{x | x \in A, (2x-1)(2x+3)=0\}$  باشد،  $A$  می‌تواند چندتا از مجموعه‌های مقابله باشد؟  $\mathbb{Q}'$ ,  $\mathbb{Q}-N$ ,  $\mathbb{Q}-Z$ ,  $\mathbb{Q}-W$ ,  $\mathbb{R}-Z$ ,  $\mathbb{R}-W$ ,  $\mathbb{R}-N$ ,  $\mathbb{R}$ .

۴ (4)

۳ (3)

۲ (2)

۱ (1)

**پاسخ گزینه**  $(2x-1)(2x+3) = 0$  یعنی مقدار  $x$  برابر  $-3$  یا  $\frac{1}{2}$  است. اما مجموعه فقط برابر  $\left\{\frac{1}{2}\right\}$  شده، پس  $-3$  در  $A$  نیست و  $\frac{1}{2}$  در آن هست.  $\mathbb{Q}'$ ,  $\mathbb{Q}-N$ ,  $\mathbb{Q}-W$ ,  $\mathbb{R}-Z$ ,  $\mathbb{R}-W$ ,  $\mathbb{R}-N$  مناسب است؛ چون  $-3 - \frac{1}{2}$  را ندارد و  $\frac{1}{2}$  را دارد، پس فقط یکی از مجموعه‌ها مناسب است.

### بازه‌ها

بازه‌ها، زیرمجموعه‌هایی از اعداد حقیقی هستند که همه اعداد حقیقی بین دو عدد مشخص را نشان می‌دهند. اول انواع بازه‌ها را در جدول رو به رو می‌بینیم:

دقت کنید که در بازه‌ها باید  $b > a$  باشد.  
راستی بازه باز  $(a, b)$  در واقع  $\emptyset$  است و بازه بسته  $[a, a]$  مجموعه تک‌عضوی  $\{a\}$  است.

بازه	نوع	نمایش مجموعه‌ای	نمایش هندسی
$(a, b)$	باز	$\{x \in \mathbb{R}   a < x < b\}$	
$[a, b)$	نیم‌باز	$\{x \in \mathbb{R}   a \leq x < b\}$	
$(a, b]$	نیم‌باز	$\{x \in \mathbb{R}   a < x \leq b\}$	
$[a, b]$	بسته	$\{x \in \mathbb{R}   a \leq x \leq b\}$	
$(a, +\infty)$	باز	$\{x \in \mathbb{R}   x > a\}$	
$[a, +\infty)$	نیم‌باز	$\{x \in \mathbb{R}   x \geq a\}$	
$(-\infty, b)$	باز	$\{x \in \mathbb{R}   x < b\}$	
$(-\infty, b]$	نیم‌باز	$\{x \in \mathbb{R}   x \leq b\}$	
$(-\infty, +\infty)$	باز	$\mathbb{R}$	

**تست** در اعداد  $1, \sqrt{2}, \sqrt{10}, 1/2$  و  $3$  چندتا عضو بازه  $[1, 3]$  هستند؟

۴ (4)

۳ (3)

۲ (2)

۱ (1)

**پاسخ گزینه** بازه از طرف ۱ باز است؛ پس شرط آن  $3 \leq x < 1$  است و در نتیجه ۱ عضو آن نیست اما ۳ عضو بازه هست.  $\sqrt{2}$ ,  $\frac{3}{2}$  و  $1/2$  نیز در این فاصله هستند اما  $\sqrt{10}$  عددی بیشتر از ۳ است و در بازه قرار ندارد.

بنابراین اعداد  $1, \sqrt{2}$  و  $\frac{3}{2}$  در بازه هستند که می‌شود ۴ تا.

$$\{\sqrt{2}, \frac{3}{4}\}, \emptyset, (0, 1), (-1, 2], \{1, 2\}$$

**تست** چندتا از مجموعه‌های مقابل، زیرمجموعه  $(-1, 2]$  هستند؟

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

**پاسخ** گزینه  $\textcircled{-}$  است، پس عدد ۲ را ندارد و  $\{1, 2\}$  و  $(-1, 2]$  زیرمجموعه آن نیستند، اما  $\frac{3}{4}$  و  $\sqrt{2}$  را دارد و کل بازه  $(0, 1)$  در آن هست.  $\emptyset$  هم زیرمجموعه تمام مجموعه‌های است، پس از بین مجموعه‌های داده شده ۳ تای آنها قبول آنند.

### اجتماع، اشتراک و تفاضل بازه‌ها

برای محاسبه اجتماع، اشتراک و تفاضل بازه‌ها، از نمایش آنها روی محور استفاده می‌شود. مثال زیر را ببینید:


**تست** در کدام گزینه اعداد صحیح کمتری هست؟

$[-1, 4] - \{1, 2\}$  (۴)

$(-2, 6) \cap [-6, 1)$  (۳)

$[0, 4] - (2, 4)$  (۲)

$[0, 1, 2] \cup (1, 2)$  (۱)



**پاسخ** گزینه ۴

جواب آخر گزینه‌ها را هم ببینید:



**تست** اگر  $\{x \mid -2 < x < 1\}$  بازه‌ای نیم‌باز باشد، چند مقدار برای  $x$  وجود دارد؟

۴ (۴) بی‌شمار

۳ (۳) هیچ

۲ (۲)

۱ (۱)

**پاسخ** گزینه  $\textcircled{۳}$  در چه صورت اجتماع بازه باز و مجموعهٔ تک‌عضوی، نیم‌باز می‌شود؟ فقط دو امکان وجود دارد:

$$1 (a, b) \cup \{a\} = [a, b)$$

$$2 (a, b) \cup \{b\} = (a, b]$$

$$x - 1 = 2 \Rightarrow x = 3$$

$$-2 < x < 1 \Rightarrow 1 < x \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

پس باید عدد ۲، مساوی عدد اول یا آخر بازه باشد:

$$x = 3 \Rightarrow (x - 1, 3 - 2x) = (2, -3) \Rightarrow \text{غیرق}$$

حالا بازه را ببینید:

$$x = \frac{1}{2} \Rightarrow (x - 1, 3 - 2x) = \left(-\frac{1}{2}, 2\right) \Rightarrow \text{قق}$$

پس فقط یک مقدار برای  $x$  داریم.

حوالستان هست که همیشه باید در بازه  $(a, b)$  داشته باشیم  $b < a$ . پس بازه به شکل  $(-3, -2)$  بی‌معنی است.

$$1 (0, 3) \cup \{3\}, [1, 3] - \{1\}, (-7, 3] - [-10, 1], [0, 3] \cap (1, 7)$$





۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

**پاسخ** گزینه  $\textcircled{۱}$  هر ۴ بازه یکسان‌اند!



$$(0, 3) \cup \{3\} = (0, 3]$$

$$[1, 3] - \{1\} = (1, 3]$$

$$(-7, 3] - [-10, 1] = (1, 3]$$

$$[0, 3] \cap (1, 7) = (0, 3]$$

$[a, b] \cap [c, d] = [c, d]$  عدد کمترین  $b$  و  $d$ ، عدد بیشترین  $a$  و  $c$

اگر فرمول دوست دارید، این‌ها هم هست:

$[a, b] \cup [c, d] = [c, d]$  عدد بیشترین  $b$  و  $d$ ، عدد کمترین  $a$  و  $c$

به شرطی که بازه‌ها اشتراک داشته باشند.

**تست** اگر  $(n - 2, m + 1) = A \cup B$  و اجتماع آن‌ها  $(-1, 6) = A \cup B$  باشد،  $m \times n$  کدام نمی‌تواند باشد؟

۷ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

۵ (۱)

**پاسخ** گزینه  $\textcircled{۷}$  اجتماع دو بازه از طرف چپ بسته است، پس حتماً اجتماع از اعضای بازه  $B$  شروع شده است و  $n - 2 = -1$  است، پس  $n = 1$ .



همچنین در انتهای بازه، اجتماع عدد ۶ به صورت باز است، پس انتهای بازه A یعنی  $3m+1$  از  $3m$  بیشتر نیست.  
به خاطر شرط بازه A

$$1 < 3m < 5 \Rightarrow \frac{1}{3} < m \leq \frac{5}{3}$$

چون  $n$  برابر ۱ بود، پس  $m \times n$  عددی بین  $\frac{1}{3}$  و  $\frac{5}{3}$  است و خود  $\frac{5}{3}$  هم می‌تواند باشد، اما  $\frac{7}{4}$  نیست. ( $\frac{5}{3}$  از  $\frac{7}{4}$  بیشتر است).


تست کدام یک بازه است؟

(۱)  $(-1, 4] - \{7, 4\}$

(۲)  $[-2, 2] - (1, 2)$

(۳)  $(-2, 3) - \{1, 2\}$

(۴)  $(-5, 1) - \{0\}$



پاسخ گزینه

۱ اجتماع دو بازه است:

۲ اجتماع ۳ بازه است:

۳ یک بازه و یک مجموعه تک عضوی است (در واقع ۲ تا بازه).

۴ اما یک بازه است:

بعضی وقت‌ها سر و ته بازه بر حسب یک متغیر هستند. کار سختی نداریم، فقط باید خودمان بازه‌ها را مشخص کنیم. مثلاً وقتی می‌گویند

$$A_n = (\frac{n}{2}, n) \text{ و از ما } A_2 \text{ را می‌خواهند؛ یعنی جای } n \text{‌ها باید ۲ قرار دهیم و بازه به صورت } (\frac{1}{2}, 2) \text{ به دست می‌آید.}$$

تست اگر  $A_i$  بازه  $(-1^i, 1^i)$  باشد، حاصل  $(A_1 \cup A_2) - (A_2 \cap A_3)$  شامل چند عدد صحیح است؟

(۱) ۱۲

(۲) ۱۱

(۳) ۱۰

(۴) ۹


پاسخ گزینه

$$i=1 \Rightarrow A_1 = ((-1)^1, 1^1) = (-1, 1) \quad i=2 \Rightarrow A_2 = ((-1)^2 \times 2, 1^2) = (2, 1) \quad i=3 \Rightarrow A_3 = ((-1)^3 \times 3, 1^3) = (-3, 1)$$

$$(A_1 \cup A_2) - (A_2 \cap A_3) = (-3, 1) - (2, 1) = (-3, 1) \cup [4, 1) \quad \text{پس } A_2 \cap A_3 = (2, 1) \text{ و بنابراین:}$$

به شکل هم توجه کنید:

در  $[-3, 1]$  اعداد صحیح  $\pm 2$  و  $\pm 1$  و صفر را داریم (پنج عدد صحیح) و در  $[4, 1]$  اعداد صحیح  $4, 5, 6, 7$  و  $8$  را داریم (پنج عدد صحیح) یعنی روی هم ۱۰ عدد صحیح دارد.



## پرسش‌های چهارگزینه‌ای

### مجموعه‌های مهم اعداد

۱۷- در میان اعداد  $\sqrt{2}$ ،  $\sqrt{41}$ ،  $1/\sqrt{41}$ ،  $1/\sqrt{2}$  و  $1/4$  به ترتیب چند عدد گویا و چند عدد گنگ هست؟

(۱) ۴، ۱

(۲) ۱، ۴

(۳) ۲، ۳

(۴) ۳، ۲

کتاب درسی

$\mathbb{W} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{R}$

$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}' \subseteq \mathbb{R}$

$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{W} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$

$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{W} \subseteq \mathbb{Q}$

۱۸- کدام رابطه درست است؟

$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{W} \subseteq \mathbb{Q}$

کتاب درسی

$\mathbb{W} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{R}$

$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}' \subseteq \mathbb{R}$

$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{W} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$

$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{W} \subseteq \mathbb{Q}$

۱۹- کدام مجموعه تهی نیست؟

$\mathbb{N} \cap \mathbb{Q}'$

$\mathbb{W} - \mathbb{Z}$

$\{x \in \mathbb{Z} \mid 2 < x < 3\}$

$\{x \in \mathbb{N} \mid -2 \leq x \leq 2\}$

$\mathbb{N} \cap \mathbb{Q}'$

$\mathbb{W} - \mathbb{Z}$

۲۰- چندتا از تساوی‌های مقابله‌دارست این است؟

(۱) ۲

۴

(۳) ۳

۲۱- کدام گزینه نادرست است؟

$\mathbb{Q}' - \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}'$

$\mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}' \subseteq \mathbb{Q}$

$\mathbb{Q} - \mathbb{Q}' \not\subseteq \mathbb{Q}'$

$\mathbb{Q} \cap \mathbb{Q}' \subseteq \mathbb{Q}'$

$\mathbb{Q}' - \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}'$

بازه

۲۲- چندتا از عبارت‌های مقابله‌دارست این است؟

(۱) ۳

$\frac{4}{3} \in [\frac{1}{2}, 2]$  ،  $-2 \subseteq \{-2, 0\}$  ،  $1 \in \{0, 2\}$  ،  $[-1, 2] \subseteq (-1, 2)$  ،  $\{0, 1\} \subseteq [-1, 2]$

۱

(۳) ۴

(۲) ۳

(۴) ۲

کتاب درسی

۱۳

(کتاب درسی)	- اگر $A = \left(-\frac{5}{3}, \sqrt{6}\right]$ و $B = \left(-\frac{5}{3}, \frac{4}{3}\right]$ آن‌گاه در $A - B$ چند عدد صحیح وجود دارد؟	۲۳	۲۴
(۴) صفر	۳ (۳)	۲ (۲)	۱ (۱)
(کتاب درسی)	- کدام بازه، بسته است؟	۲۵	۲۶
$(-\infty, 2) \cap (-3, +\infty)$ (۴)	$[1, 3) - (2, 3)$ (۳)	$(1, +\infty) \cup (-\infty, 2)$ (۲)	$(1, 3) - (1, 2)$ (۱)
(کتاب درسی)	- حاصل کدام گزینه یک بازه نیست؟	۲۷	۲۸
$(1, 5) \cap (3, 7)$ (۴)	$(1, 5) - (3, 4)$ (۳)	$(-4, -2) - (-3, -2)$ (۲)	$(-3, 1) \cup (-2, 2)$ (۱)
۵ (۴)	۳ (۳)	۷ (۲)	۴ (۱)
(کتاب درسی)	- اشتراک دو مجموعه $\mathbb{Z} - \mathbb{W}$ و $\mathbb{W}$ چند عضوی است؟	۲۹	۳۰
$[-2, 5)$ (۴)	$(-2, 5) - \{3\}$ (۳)	$(-2, 5)$ (۲)	$(-2, 1)$ (۱)
(کتاب درسی)	- اگر $C = [-2, 2]$ و $B = [0, 4]$ ، $A = (-3, 1)$ ، آن‌گاه $A \cup C - B$ دارای چند عضو صحیح است؟	۲۸	۲۹
۱ (۴)	۲ (۳)	۳ (۲)	۴ (۱)
	- اگر $A \cap B$ چند عضو مشترک با مجموعه $C$ دارد؟	۳۰	۳۱
۵ (۴)	۴ (۳)	۳ (۲)	۲ (۱)
	- اگر $(b, 2) \cup (1, a) = (-2, \frac{14}{7})$ باشد، نمایش مجموعه $(b - 2, a + 2)$ روی محور اعداد حقیقی به کدام صورت است؟	۳۰	۳۱
(کتاب درسی)	- اگر $C = (-2, 2)$ و بازه‌های $A$ و $B$ به شکل زیر روی محور نشان داده شوند، حاصل $C - (A \cap B)$ چگونه است؟	۳۱	۳۲
	۲ (شامل عدد صحیح نیست.)	۳ (فقط یک عدد صحیح دارد.)	۴ (فقط دو عدد صحیح دارد.)
m ≥ ۳ (۴)	m ≤ ۳ (۳)	m ≥ ۱ (۲)	m ≤ ۱ (۱)
	- اگر عدد حقیقی $x$ در بازه $(2x - 1, 3x + 2)$ قرار گیرد، چند مقدار صحیح برای آن وجود دارد؟	۳۳	۳۴
۴ (۴)	۳ (۳)	۲ (۲)	۱ (۱)
	- اگر $(b - 1, 2b + 1) \cap [m + 2, +\infty) = \mathbb{R}$ ، حدود $m$ کدام است؟	۳۴	۳۵
$(3, 4)$ (۴)	$[3, 4)$ (۳)	$[2, 4)$ (۲)	$(2, 4)$ (۱)
	- اجتماع بازه‌های $A = (a, \delta)$ و $B = (b, \delta)$ است. کدام نتیجه‌گیری درست است؟	۳۵	۳۶
$ab = 15$ (۴)	$ab = -15$ (۳)	$ab = 18$ (۲)	$ab = -18$ (۱)
	- اگر $a + m$ ، مقدار $\{a\} = (-\infty, m - 2] \cap [2m + 1, +\infty)$ کدام است؟	۳۶	۳۷
-۸ (۴)	-۵ (۳)	-۳ (۲)	-۴ (۱)
	- اگر $a + b$ ، $(-1, 2] \cap (a, b) = (a + 1, a + 3)$ کدام است؟	۳۷	۳۸
-۲ (۴)	۱ (۳)	-۱ (۲)	۰ (صفر)
	- اگر $n$ عددی طبیعی و دو مجموعه $A = \left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right]$ و $B = (n - 3, n + 1)$ دارای اشتراک ناتهی باشند، جمع مقادیر $n$ کدام است؟	۳۸	۳۹
۱۵ (۴)	۳ (۳)	۶ (۲)	۱۰ (۱)
	- اگر هیچ یک از مجموعه‌های $A = (-1, 2) \cap (-1, 2)$ و $B = (-1, 2)$ تهی نباشند، کدام بازه به عنوان $A$ مورد قبول است؟	۳۹	۴۰
$(2, 3)$ (۴)	$(-1, 1)$ (۳)	$(0, 2)$ (۲)	$(0, 3)$ (۱)
	- به ازای چند مقدار صحیح $m$ ، بازه $(10, m)$ شامل دقیقاً سه عدد مضرب ۴ است؟	۴۰	۴۱
۵ (۴)	۴ (۳)	۳ (۲)	۲ (۱)
	- اگر $\mathbb{Z} - \mathbb{W} = \emptyset$ ، بازه $(3 - a, +\infty) \cap (-\infty, 4)$ حداکثر شامل چند عدد طبیعی است؟	۴۱	۴۲
۶ (۴)	۵ (۳)	۴ (۲)	۳ (۱)



۴۲ - اگر $\frac{5}{3}a + 1 \leq (-2, 2)$ ، عدد $a$ متعلق به کدام بازه است؟	$[0, 2]$ (۴)	$[-1, 2]$ (۳)	$[1, 4]$ (۲)	$(0, 3)$ (۱)
۴۳ - اگر $a < 0$ باشد، مجموعه $(a, -\frac{1}{a}) \cap (\frac{1}{a}, -a)$ برابر با کدام است؟	$(-a, -\frac{1}{a})$ (۴)	$(a, -\frac{1}{a})$ (۳)	$(a, -a)$ (۲)	$(\frac{1}{a}, -\frac{1}{a})$ (۱)
۴۴ - اگر $[a-2, a] \cap [a+2, 5] = [3a-1, 4]$ ، کدام یک از اعداد زیر عضو بازه $(a-2, a)$ است؟	۴ (۴)	-۲ (۳)	۲ (۲)	۱ (۱) صفر
۴۵ - به ازای چند $n$ طبیعی، $\frac{2}{n+1}$ نمایش یک بازه <u>نیست</u> ؟	۲ (۴)	۱ (۳)	۱ (۲)	۰ (۱) صفر
۴۶ - اگر $A_1 \cup A_2 \cap A_3$ حاصل $A_i = (-i, i)$ کدام است؟	(-۱, ۲) (۴)	(-۳, ۳) (۳)	(-۲, ۲) (۲)	(-۱, ۱) (۱)
۴۷ - اگر $A_4 - A_1 - A_n = (-n, 1)$ ، مجموعه $A_n$ شامل چند عدد صحیح است؟	۵ (۴)	۴ (۳)	۳ (۲)	۲ (۱)
۴۸ - اگر $i \in \{1, 2, 3, \dots, 9\}$ و $A_i = [-i, \frac{9-i}{2}]$ ، آن گاه مجموعه $(A_1 \cap A_5) - (A_1 \cap A_7)$ به کدام صورت است؟	$\emptyset$ (۴)	[-۱, ۱] (۳)	[-۲, -۱] $\cup$ [۱, ۲] (۲)	[-۲, -۱] $\cup$ (۱, ۲) (۱)
۴۹ - اگر $n$ عدد طبیعی و $A_n = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4$ باشد، چند عدد صحیح به $\bigcup_{n=1}^4 A_n$ تعلق دارد؟	۱۱ (۴)	۱۰ (۳)	۹ (۲)	۸ (۱)
۵۰ - اگر $A_n = [n-1, n+1]$ باشد، آن گاه مجموعه $\bigcup_{n=1}^3 A_n - \bigcap_{n=1}^3 A_n$ با کدام مجموعه برابر است؟	$\{x : 1 \leq x \leq 5, x \neq 2\}$ (۴)	$\{x : 0 \leq x \leq 5, x \neq 2\}$ (۳)	$\{x : 0 \leq x \leq 5\}$ (۲)	$\{x : 1 \leq x \leq 5\}$ (۱)

### (درس ۳)

## مجموعه‌های متناهی و نامتناهی

تعداد اعضای مجموعه  $A$  را با  $n(A)$  نشان می‌دهیم.

اگر  $n(A) = 0$  باشد،  $A$  تهی است.

اگر  $n(A) = k$  باشد، مجموعه  $A$  را متناهی (**اعضوی**) می‌نامیم. گاهی به جای «متناهی» می‌گوییم «باپایان».

اگر  $n(A)$  از هر عددی بزرگ‌تر باشد، آن را نامتناهی می‌نامیم.

تعداد عضوهای یک مجموعه متناهی عددی حسابی است.

نمونه‌هایی از مجموعه‌های نامتناهی بینید:

$\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}, \mathbb{W}, \mathbb{N}$  و  $\mathbb{Q}'$  نامتناهی‌اند.

۱ تمام بازه‌های اعداد حقیقی مثلاً  $[1, 2]$  یا  $(-\infty, 0)$  نامتناهی‌اند.

۲ مجموعه شکل‌های هندسی مختلف (مثلاً خطوط با شیب ۲ یا دایره‌ها به مرکز مبدأ) معمولاً نامتناهی‌اند.

کتاب درسی تأکید دارد که مجموعه درختان، اتم‌ها، مولکول‌ها، انسان‌ها و ... همیشه متناهی‌اند. با این‌که تعداد خیلی زیادی عضو دارند، اما با داشتن وقت کافی می‌توان اعضای آن‌ها را شمرد و به پایان رسید.

تست کدام متناهی است؟

۱) اعداد صحیح بازه  $(-1, 4)$  ۲) اعداد گویای بازه  $(-1, 4)$  ۳) اعداد گنگ در بازه  $(-1, 4)$  ۴) اعداد حقیقی بازه  $(-1, 4)$

پاسخ گزینه گفتیم که بازه‌ها همیشه نامتناهی‌اند. حالا به خاطر بسیارید که بین هر دو عدد حقیقی مختلف، بی‌شمار عدد گویا و بی‌شمار عدد گنگ وجود دارد. پس ۱)، ۲) و ۴) نامتناهی‌اند اما ۳) متناهی و فقط شامل چهار عضو، ۰، ۱، ۲ و ۳ است.



	$A \cup B$	$A \cap B$	$A - B$	$B - A$
و $A$ متناهی	متناهی	متناهی	متناهی	متناهی
و $B$ هر دو نامتناهی	نامتناهی	—	—	—
متناهی و $B$ نامتناهی	نامتناهی	متناهی	متناهی	نامتناهی

این طوری هم بگوییم: اشتراک یک مجموعه متناهی با هر مجموعه دیگری قطعاً متناهی است. اگر  $A$  متناهی باشد،  $B - A$  قطعاً متناهی است.

تست اگر  $A = \{1, 2, 3\}$ ،  $B = \{1, 2, 3\}$  باشد، چندتا از مجموعه های  $C$  و  $E$  قطعاً متناهی اند؟

۴) هیچ

۳

۲

۱

پاسخ گزینه **C** زیرمجموعه  $A$  است و چون  $A$  متناهی است  $C$  هم حتماً متناهی است.

**D** زیرمجموعه باز  $B$  است، می تواند متناهی باشد، مثلاً  $\{1\} = D$  یا نامتناهی باشد، مثلاً  $(1, 2) = D$ .

**E** زیرمجموعه  $B$  را دارد، پس تمام  $B$  را در خودش دارد و از يك مجموعه نامتناهی بیشتر است! پس نامتناهی است.

خلاصه فقط يكی از مجموعه ها یعنی  $E$  قطعاً نامتناهی شد و فقط مجموعه  $C$  قطعاً متناهی شد.

نتیجه این مثال را به خاطر بسپاریم:

هر زیرمجموعه از يك مجموعه متناهی، متناهی است.

اگر مجموعه ای يك زیرمجموعه نامتناهی دارد، حتماً نامتناهی است.

زیرمجموعه های يك مجموعه نامتناهی، می توانند متناهی یا نامتناهی باشند.

تست کدام وجود ندارد؟

۱) دو مجموعه نامتناهی  $A$  و  $B$  که  $A - B$  یک عضوی و  $B - A$  دو عضوی باشد.

۲) سه زیرمجموعه از  $\mathbb{N}$  که هر سه نامتناهی اند و دو بهدو اشتراک ندارند.

۳) دو زیرمجموعه نامتناهی از  $\mathbb{Z}$  که يكی زیرمجموعه دیگری است.

۴) مجموعه متناهی که شامل تمام اعداد گویای بين  $\frac{1}{71}$  و  $\frac{1}{7}$  باشد.

پاسخ گزینه **E** همین اول بگوییم که اعداد گویای بين  $\frac{1}{71}$  و  $\frac{1}{7}$  نامتناهی است. اما بررسی سایر گزینه ها:

۱) دو مجموعه  $\{-1, -2, -3\} = A$  و  $\{-2, -3, -4\} = B$  را در نظر بگیرید.  $A - B = \{-1\}$  است؛ پس وجود دارد.

۲) مجموعه های  $\{\dots, 1, 4, 7, \dots\}$ ،  $\{\dots, 2, 5, 8, \dots\}$  و  $\{\dots, 3, 6, 9, \dots\}$  را در نظر بگیرید که هر سه نامتناهی اند و اشتراک هم ندارند. يك مثال دیگر

مجموعه های اعداد طبیعی با رقم یکان ۱، رقم یکان ۲ و رقم یکان ۳ هستند.

۳)  $\mathbb{N}$  و  $\mathbb{W}$  را ببینید. هر دو زیرمجموعه  $\mathbb{Z}$  هستند و  $\mathbb{W} \subseteq \mathbb{N}$  است.

مثال دیگر می تواند مجموعه اعداد زوج و اعداد مضرب ۶ باشد. (کدام زیرمجموعه دیگری است؟)

تست کدام متناهی است؟

۱) مجموعه مثلث های قائم الزاویه با وتر ۵

۳) مجموعه اعداد ارقامی


پاسخ گزینه **۱** نامتناهی است. این مثلث ها به شکل رو به رو هستند:

و  $X$  می تواند هر عدد حقیقی از صفر تا ۵ باشد.

**۲** نامتناهی است. چون این مجموعه به صورت  $\{\frac{2}{n} | n \in \mathbb{N}\}$  بیان می شود و بی شمار عضو دارد.

**۳** مجموعه اعداد ارقامی از ۱۰۰۰۰۰۰۰ تا ۱۱۱۱۱۱۱۱ محدود است. بعداً خواهید دید که تعداد آنها  $10^{18}$  است.

**۴** دایره ها با مرکز  $(1, 2)$  می توانند شاعع های مختلف در فاصله  $(-\infty, +\infty)$  داشته باشند؛ پس نامتناهی است!



۲) مجموعه کسر های مثبت با صورت  $\frac{2}{x}$

۴) مجموعه دایره ها به مرکز  $(1, 2)$

## پرسش‌های چهارگزینه‌ای

(کتاب درسی)

- ۲) اعداد طبیعی کمتر از ۱۰۰  
۴) اعداد حقیقی بین ۱ و ۲

(کتاب درسی)

- ۲) درختان جنگل‌های ایران  
۴) تمام دایره‌های قابل رسم به مرکز (۱، ۲)

(کتاب درسی)

- ۲) مربع‌ها با مساحت ۶ و یک رأس روی مبدأ  
۴) خط‌های گذرنده از مبدأ

(کتاب درسی)

- ۳) مقسوم‌علیه‌های مشترک ۷ و ۶    ۴) مقسوم‌علیه‌های اول عدد ۱

(کتاب درسی)

- ۴) کسرهای بین صفر و ۱ با مخرج ۷

- ۲) اعداد طبیعی مربع کامل کمتر از ۷۰    ۳) مقسوم‌علیه‌های صحیح ۶

(کتاب درسی)

$$3k+1 \quad (4)$$

$$3k-1 \quad (3)$$

$$2k+6 \quad (2)$$

$$2k-5 \quad (1)$$

$$\{x \in \mathbb{Q} \mid x < 3\} \quad (4)$$

$$\{x \in \mathbb{Q} \mid x \leq 4\} \quad (3)$$

$$\mathbb{Z} \quad (1)$$

$$B = \{x \mid x = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}\} \quad (2)$$

$$C = \{x \mid x = \frac{(-1)^n}{n}, n \in \mathbb{N}\} \quad (3)$$

(کتاب درسی)

- ۲) بین هر دو عدد گنج بین نهایت عدد گویا وجود دارد.  
۴) بین هر دو عدد گنج بین نهایت عدد صحیح وجود دارد.

- ۱) بین هر دو عدد طبیعی بین نهایت عدد گویا وجود دارد.  
۳) بین هر دو عدد گنج بین نهایت عدد صحیح وجود دارد.

B - A

A - B

A ∩ B

A ∪ B

(1)

۴) صفر

۳ (۳)

۲ (۲)

(کتاب درسی)

۶۱) کدام جمله درست است؟ (۱) مجموعه مرجع است.

(۱) اگر A نامتناهی باشد، A' حتماً نامتناهی است.

(۲) اگر A ⊆ B و مجموعه B نامتناهی باشد، A هم نامتناهی است.

(۳) اگر A و B هر دو نامتناهی باشند، A ∪ B برابر با  $\mathbb{N}$  است.

(۴) اگر A ⊆ B و مجموعه A نامتناهی باشد، آن‌گاه B هم نامتناهی است.

۶۲) کدام جمله نادرست است؟

(۱) اگر مجموعه‌های A و B هر دو نامتناهی باشند، اشتراک آن‌ها ممکن است متناهی باشد.

(۲) می‌توان سه زیرمجموعه نامتناهی از اعداد طبیعی یافت که هیچ‌کدام با هم اشتراک نداشته باشند.

(۳) اگر A ⊆ B و A مجموعه‌ای نامتناهی باشد، ممکن است B متناهی باشد.

(۴) اگر A ∪ B نامتناهی باشد، حداقل یکی از A یا B نامتناهی بوده است.

۶۳) اگر A مجموعه اعداد طبیعی فرد و B مجموعه اعداد اول باشند، کدام مجموعه متناهی و غیرمتناهی است؟

$$A - (A \cup B) \quad (4)$$

$$A \cap B \quad (3)$$

$$B - A \quad (2)$$

$$A - B \quad (1)$$

۶۴) کدام مجموعه متناهی است؟

$$(\mathbb{N} - \mathbb{Q})' \cap \mathbb{Z}' \quad (4)$$

$$(\mathbb{Z} - \mathbb{N}) \cap (\mathbb{Q} - \mathbb{Q}') \quad (3)$$

$$(\mathbb{Q} - \mathbb{R}) \cap (\mathbb{Q}' - \mathbb{Z}) \quad (2)$$

$$\mathbb{Q}' - \mathbb{Q} \quad (1)$$

۶۵) اگر A مجموعه اعداد صحیح مضرب ۳ و B مجموعه اعداد صحیح با قدر مطلق کمتر از ۱۰۰ باشد، کدام مجموعه در  $\mathbb{Z}$  با پایان است؟


$$A \cup B \quad (4)$$

$$A \cap B \quad (3)$$

$$A' \cup B \quad (2)$$

$$A \cap B' \quad (1)$$

# مجموعه مرجع و متتم



مجموعه مرجع، مجموعه‌ای است که تمام مجموعه‌های مسئله زیرمجموعه آن باشند. اسمش را مجموعه جهانی یا عام می‌گذاریم و با  $U$  نشان می‌دهیم. این شکل را ببینید:  
می‌گوید  $A, B, C$  سه زیرمجموعه از مرجع هستند و  $C$  با  $A$  و  $B$  اشتراک ندارد.  
فایده اصلی مجموعه مرجع، تعریف متتم مجموعه  $A$  است. اگر  $U \subseteq A$  باشد، اگر  $A' = U^c$  یا  $A' = \{x \in U \mid x \notin A\}$  که متتم مجموعه  $A$  است. احتمالاً این طوری راحت‌تر هستید که متتم یک مجموعه، شامل اعضایی از  $U$  است که آن مجموعه ندارد. به زبان ریاضی:

مثالاً متتم مجموعه  $\{1, 2, 3\} = A$  را نسبت به مراجعه‌های مختلف می‌نویسیم:

$$U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\} \Rightarrow A' = U - A = \{0, 4, 5\}$$

$$U = \mathbb{N} \Rightarrow A' = \mathbb{N} - \{1, 2, 3\} = \{4, 5, 6, \dots\}$$

$$U = [1, 4] \Rightarrow A' = [1, 4] - \{1, 2, 3\} = \begin{array}{ccccccc} & & & & \textcolor{blue}{\circ} & \textcolor{blue}{\circ} & \textcolor{blue}{\circ} \\ & & & & | & | & | \\ & & & & 1 & 2 & 3 \\ & & & & \textcolor{blue}{\circ} & \textcolor{blue}{\circ} & \textcolor{blue}{\circ} \end{array}$$

$$U = \{2, 4, 5, 6\} \Rightarrow A' \subsetneq U \text{ نیست.} \quad \text{چون } A' \text{ وجود ندارد.}$$

خاصیت‌های مجموعه متتم را با هم ببینیم:

$$(A')' = A, \emptyset' = U, \emptyset' = \emptyset$$

اگر  $A \subseteq B$  باشد،  $A' \subseteq B'$  است.

متتم  $A \cup B$  می‌شود  $A' \cap B'$ ؛ یعنی تک‌تک مجموعه‌ها متتم می‌شوند و اجتماع به اشتراک تبدیل می‌شود.

متتم  $A \cap B$  می‌شود  $A' \cup B'$ ؛ باز هم تک‌تک مجموعه‌ها متتم شده و علامت برعکس می‌شود.

اسم  $A'$  و قوانین دمورگان است.

را به صورت  $A \cap B'$  هم می‌توان نوشت (یادتان هست که  $A - B = A - B'$  یعنی در  $A$  هست و در  $B$  نیست).

همان  $B - A = B \cap A'$  است.

$A \cup A' = \emptyset$  و  $A \cap A' = \emptyset$  و اجتماعشان می‌شود  $U = A \cup A'$ .

و  $A' - B' = B - A$  می‌شود  $A' - B'$  خودتان بگید چرا!!

مثال اگر  $\mathbb{R}$  را به عنوان مجموعه مرجع در نظر بگیریم، متتم مجموعه‌های زیر را نشان دهید.

$$\text{الف) } W = (-\infty, -2] \quad \text{ب) } (1, +\infty) \quad \text{پ) } (-\infty, -2)$$


$$\text{ث) } [-2, 5] \quad \text{ت) } [-1, 4]$$

پاسخ الف)  $W$  شامل اعداد حقیقی و غیرحسابی است:

ب) متتم بازه نیم باز  $[-2, +\infty)$  به صورت  $(-\infty, -2)$  است:

پ) متتم  $(1, +\infty)$  به صورت  $(-\infty, 1)$  بیان می‌شود:

ت) متتم بازه  $[-1, 4)$  به صورت اجتماعی از دو بازه است:



مثال اگر  $\{4, 5\} = U$  مجموعه مرجع و  $\{x \mid 1 \leq x \leq 5\} = A$  و  $\{x \mid x^2 \leq 5\} = B$  دو زیرمجموعه از  $U$  باشند، مجموعه‌های  $A'$  و  $B'$  را با اعضا مشخص کرده و درستی روابط زیر را بررسی کنید.

$$(A' \cap B)' = B' \cup A$$

$$A' - B' = (A - B)'$$

$$A - B = A \cap B'$$

پاسخ در مجموعه  $A$  باید اعدادی باشند که مربع آن‌ها از ۵ کمتر یا مساوی است، پس  $\{0, \pm 1, \pm 2\} = A$ . در مجموعه  $B$  هم اعداد بین ۱ و ۵ و خود آن‌ها را داریم، پس  $\{1, 2, 3, 4\} = B$ .

$$A' = U - A = \{3, 4\}$$

$$B' = U - B = \{0, -1, -2\}$$

حالا با توجه به مجموعه مرجع:

$$(A' \cap B)' = (\{3, 4\} \cap \{1, 2, 3, 4\})' = (\{3, 4\})' = \{0, \pm 1, \pm 2\}$$

و می توانیم روابط را کنترل کنیم:

$$B' \cup A = \{0, -1, -2\} \cup \{0, \pm 1, \pm 2\} = \{0, \pm 1, \pm 2\}$$

دو طرف برابر شدند، پس رابطه «الف» در این مسئله درست است. (همیشه درست است!)

$$A' - B' = \{3, 4\} - \{0, -1, -2\} = \{3, 4\}$$

$$(A - B)' = (\{0, \pm 1, \pm 2\} - \{1, 2, 3, 4\})' = (\{0, -1, -2\})' = \{1, 2, 3, 4\}$$

دو طرف مساوی نیستند؛ پس این رابطه درست نیست.

$$A - B = \{0, -1, -2\}$$

$$A \cap B' = \{0, \pm 1, \pm 2\} \cap \{0, -1, -2\} = \{0, -1, -2\}$$

دو طرف برابرند. پس رابطه «ب» در این مجموعه ها درست است. (همواره درست است).

**تست** اگر  $\mathbb{R}$  مجموعه مرجع باشد، متمم مجموعه  $\{2\} \cup \{3, 4\} \cup \{1, 0, -1\}$  به کدام شکل است؟

(1) دو بازه نیم باز


(2) یک بازه نیم باز و یک بازه باز

(3) دو بازه باز و یک بازه نیم باز

(4) دو بازه نیم باز و یک بازه باز

پاسخ گزینه

خود این مجموعه روی محور به شکل رویه را است:



پس متمم آن می شود:

که به صورت  $(-\infty, +\infty) \setminus [1, 2] \cup [3, 4]$  بیان می شود و از دو بازه نیم باز و یک بازه باز ساخته شده است.

**تست** اگر  $\{1, 0, -1\}, U = \{0, \pm 1, \pm 2, 3\}$  و  $A = \{1, 0, -1\}$ ،  $B = \{0, 1, 2, 3\}$ ،  $((A' - B)' \cup A)$  کدام است؟

{ } (4)

{ } (3)

{ } (2)

{ } (1)

پاسخ گزینه

راه اول سعی می کنیم با خواص متمم و قواعدی که در بالا دیدیم عبارت را ساده کنیم.

$$\begin{aligned} ((A' - B) \cup A)' &= ((A' \cap B')' \cup A)' = (A' \cap B')' \cap A' = A' \cap B' = (A \cup B)' \\ &\text{تبديل} \\ &\text{تفاضل} \\ &\text{به اشتراک} \end{aligned}$$

پس جواب متمم  $A \cup B$  است.  $A \cup B$  می شود  $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$  و متمم آن  $\{-2\}$  است.

$$\begin{aligned} A = \{1, 0, -1\} \Rightarrow A' = \{2, -2, 3\} \Rightarrow A' - B = \{2, -2, 3\} - \{0, 1, 2, 3\} &\xrightarrow{\text{متمم}} (A' - B)' = \{0, \pm 1, 2, 3\} \\ \Rightarrow (A' - B)' \cup A = \{0, \pm 1, 2, 3\} \cup \{1, 0, -1\} &= \{0, \pm 1, 2, 3\} \xrightarrow{\text{متمم}} ((A' - B)' \cup A)' = \{-2\} \end{aligned}$$

این را هم ببینید:



اگر  $U$  متناهی باشد  $A$  و  $A'$  متناهی نباشد. اگر  $U$  نامتناهی باشد،  $A$  و  $A'$  هر دو متناهی نیستند! یا یکی نامتناهی است یا هر دو.

مثلاً با مجموعه مرجع  $\mathbb{N}$ ، متمم هر مجموعه متناهی، نامتناهی است اما متمم یک مجموعه نامتناهی می تواند متناهی باشد یا نباشد. مثلاً متمم  $\{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$  می شود  $\{1, 2, 3, 5, 7, \dots\}$  و متمم  $\{1, 3, 5, 7, \dots\}$  می شود  $\{2, 4, 6, \dots\}$ . دیدید؟!

## پرسش های چهار گزینه ای

(کتاب درسی)

- ۶۶- در مورد کدام دو مجموعه زیر، متمم  $A$  نسبت به  $B$  قابل تعریف است؟

$$B = \{1, 2, 3, 4\}, A = \{1, 5\}$$

$$B = \{1, 4\}, A = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$B = \{2, 5, 7, 9, 10\}, A = \{1, 3, 5, 7\}$$

$$B = \{1, 5, 6, 9\}, A = \{5, 6\}$$

(کتاب درسی)

- ۶۷- فرض کنیم  $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  مجموعه مرجع باشد و  $A = \{1, 2, 3\}$  و  $B = \{2, 4\}$ ، کدام عبارت نادرست است؟

$$A' \cup B' = \{5, 2\}$$

$$A - (A \cap B) = \{1, 3\}$$

$$A' \cap B' = (A \cup B)'$$

$$B' - A' = \{1, 3\}$$

- ۶۸- اگر  $U = \{1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9\}$  مجموعه مرجع و  $C = \{5, 6\}$ ،  $B = \{3, 6\}$ ،  $A = \{1, 3, 7, 8, 9\}$  باشد، مجموعه  $(B' \cap C') \cap A$  چند عضو دارد؟

(کتاب درسی)

$$5$$

$$4$$

$$3$$

$$2$$

(کتاب درسی)	$A = \{2x + 3 \mid -1 \leq x < 7\}$ کدام است؟	$\mathbb{R}$ مجموعه مرجع باشد، متمم مجموعه $\{2x + 3 \mid -1 \leq x < 7\}$
( $-\infty, -1) \cup (17, +\infty)$ ) ۴	( $-\infty, 1] \cup [17, +\infty)$ ) ۳	( $-\infty, 1] \cup [17, +\infty)$ ) ۲
(کتاب درسی)	$A = \{-1, -2, -3\}$ کدام است؟	$\mathbb{Z} - \mathbb{W}$ مجموعه مرجع باشد، متمم مجموعه $\{-1, -2, -3\}$
$\{\dots, -5, -4, 1, 2, \dots\}$ ) ۴	$\{0, 1, 2, \dots\}$ ) ۳	$\{\dots, -5, -4, 0, 1, 2, \dots\}$ ) ۲
- ۶۹	- ۷۰	- ۷۱
- ۷۰	- ۷۱	- ۷۲
- ۷۱	- ۷۲	- ۷۳
- ۷۲	- ۷۳	- ۷۴
- ۷۳	- ۷۴	- ۷۵
- ۷۴	- ۷۵	- ۷۶
- ۷۵	- ۷۶	- ۷۷
$A \cap B = A \Rightarrow A \subset B$ ) ۴	$A \cap C = B \cap C \Rightarrow A = B$ ) ۳	$A - B = \emptyset \Rightarrow A \subset B$ ) ۲
$A \subset B \Leftrightarrow B' \subset A'$ ) ۱	$A' \cap B$ ) ۲	$A' \cap B$ ) ۱
$A' \cap B'$ ) ۴	$A' \cap B'$ ) ۳	$A' \cap B'$ ) ۳
- ۷۶	- ۷۷	- ۷۸
- ۷۷	- ۷۸	- ۷۹
- ۷۸	- ۷۹	- ۸۰
- ۷۹	- ۸۰	- ۸۱
- ۸۰	- ۸۱	- ۸۲
- ۸۱	- ۸۲	- ۸۳
- ۸۲	- ۸۳	- ۸۴
- ۸۳	- ۸۴	- ۸۵
- ۸۴	- ۸۵	- ۸۶
- ۸۵	- ۸۶	- ۸۷
- ۸۶	- ۸۷	- ۸۸
- ۸۷	- ۸۸	- ۸۹
- ۸۸	- ۸۹	- ۹۰



- ۸۸ اگر  $x \in (B - A) \cap (C \cup D)$  باشد، کدام گزاره می‌تواند نادرست باشد؟
- $x \notin C' \cap D'$  (۴)       $x \in D$  (۳)       $x \in B$  (۲)       $x \notin A$  (۱)
- ۸۹ اگر  $\mathbb{N}$  مجموعه مرجع باشد، چندتا از عبارت‌های زیر درست است؟
- (الف) اگر مجموعه  $A$  نامتناهی باشد،  $A'$  متناهی است.  
 (پ) اگر مجموعه  $A$  نامتناهی و مجموعه  $B$  متناهی باشد، مجموعه  $B' \cup A'$  نامتناهی است.
- ۲ (۴)      ۲ (۳)      ۱ (۲)      ۱ (صفر)
- ۹۰ اگر مجموعه  $A$  نامتناهی باشد و هر عضو  $B$ ، عضوی از  $A$  نیز باشد، کدام دو مجموعه زیر اشتراکی ندارند؟
- $B, A' \cup B'$  (۴)       $B', A' \cap B$  (۳)       $B', A - B$  (۲)       $A \cup B', A \cap B$  (۱)
- ۹۱ مجموعه  $A$  دارای ۵۱۲ زیرمجموعه است. مجموعه  $A \cap B$  دارای ۳ عضو است. تعداد زیرمجموعه‌های  $(B \cup A')$  کدام است؟ (فقر ریاضی ۹۱)
- ۶۴ (۴)      ۴۸ (۳)      ۳۲ (۲)      ۱۶ (۱)
- ۹۲ اگر  $\mathbb{N}$  مجموعه مرجع و  $\{1\}$  مجموعه  $A_1 = \{2, 3\}$ ،  $A_2 = \{4, 5, 6\}$ ،  $A_3 = \{7, 8, 9, 10\}$  و  $A_4 = \{1, 2, 3\}$  باشند، مجموعه  $A'$  چند عضو دورقمی و مضرب ۵ دارد؟
- ۱۷ (۴)      ۱۶ (۳)      ۱۵ (۲)      ۱۴ (۱)

## (درس ۵)

## تعداد اعضای اجتماع دو مجموعه

اگر  $A$  و  $B$  دو مجموعه باشند، تعداد اعضای  $A \cup B$  معمولاً از جمع تعداد اعضاهای  $A$  و  $B$  کمتر است! چون عضوهای مشترک  $A$  و  $B$  را در  $A \cup B$  یک بار می‌نویسیم!

با کمی دقت داریم:  
 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$   
 $n(A \cap B) = ۰ \Rightarrow n(A \cup B) = n(A) + n(B)$

پس برای دو مجموعه جدا از هم (که اشتراک ندارند) می‌توان نوشت:

در صورت سؤال  $A \cup B$  به صورت «اعضایی که در  $A$  یا  $B$  هستند» یا «عضو حداقل یکی از دو مجموعه» می‌آید.

تست در یک کلاس ۳۰ نفری ۱۷ نفر در فیزیک، ۲۰ نفر در ریاضی و ۱۱ نفر در هر دو درس به کلاس تقویتی می‌روند. چند نفر در حداقل یکی از دو درس به کلاس تقویتی می‌روند؟


۲۸ (۴)      ۲۷ (۳)      ۲۶ (۲)      ۲۵ (۱)

اگر ریاضی را با  $A$  و فیزیک را با  $B$  نشان دهیم، داریم:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) \Rightarrow n(A \cup B) = ۲۰ + ۱۷ - ۱۱ = ۲۶$$


ریاضی      فیزیک  
هر دو      حداقل یکی از  
دو درس

پاسخ گزینه: ۲۶ ون را ببینید:




حالا به این‌ها دقت کنید:


$n(A - B) = ۲۰ - ۱۱ = ۹$ : تعداد افرادی که فقط به کلاس ریاضی می‌روند.




$n(B - A) = ۱۷ - ۱۱ = ۶$ : تعداد افرادی که فقط به کلاس فیزیک می‌روند.




$n(A - B) + n(B - A) = ۹ + ۶ = ۱۵$ : تعداد افرادی که فقط به یک کلاس می‌روند.




$n(A \cup B) = 26$ : تعداد افرادی که حداقل به یک کلاس می‌روند.




$n(A' \cap B') = n(A \cup B)' = n(U) - n(A \cup B) = 30 - 26 = 4$ : تعداد افرادی که به هیچ کلاسی نمی‌روند.  
نه ریاضی  
و نه فیزیک




$n(A') = n(U) - n(A) = 30 - 20 = 10$ : تعداد افرادی که به کلاس ریاضی نمی‌روند.



$n(B') = n(U) - n(B) = 30 - 17 = 13$ : تعداد افرادی که به کلاس فیزیک نمی‌روند.



$n(A \cap B)' = n(U) - n(A \cap B) = 30 - 11 = 19$ : تعداد افرادی که حداکثر به یک کلاس می‌روند.  
به هردو کلاس  
نمی‌روند.




کیف کردید؟ تمام این سوال‌ها را با نمودار ون جواب دادیم، ولی اگر دوست دارد حفظ کنید، این‌ها هم هست:  
 $n(A' \cap B') = n(U) - n(A \cup B)$        $n(A') = n(U) - n(A)$        $n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$

**تست** اگر A مجموعه اعداد زوج دورقی و B مجموعه اعداد فرد کمتر از ۱۰۰ باشد،  $A \cup B$  چند عضو دارد؟  
 ۹۶ (۴)      ۹۵ (۳)      ۹۴ (۲)      ۹۰ (۱)

**پاسخ گزینه** A دارای ۴۵ عضو است (کل ۹۹ تا عدد دورقی از ۱۰ تا ۹۹ داریم که ۴۵ تای آن‌ها زوج‌اند). B دارای ۵۰ عضو است (از ۱ تا ۱۰۰ پنجاه‌تا عدد فرد داریم).

اما مهم‌تر از هر چیز، A و B عضو مشترکی ندارند، چون اعضای A زوج و اعضای B فرد هستند. پس دو مجموعه مجزا داریم. پس:  
 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) = 45 + 50 = 95$

می‌شود از آن طرف هم به ماجرا نگاه کرد. اگر  $A \cup B$  را بنویسیم اعداد زوج دورقی و اعداد فرد کمتر از ۱۰۰ می‌آیند. پس از بین ۱ تا ۹۹  $99 - 4 = 95$  فقط اعداد زوج یک رقمی یعنی ۲، ۴، ۶ و ۸ غایب هستند. بنابراین تعداد اعضای اجتماع می‌شود:



برای دو مجموعه جدا از هم A و B داریم:  $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$   
 $A - B = A$  ،  $B - A = B$   
 $A \subseteq B'$  ،  $B \subseteq A'$   
 هم‌چنین:  
 و نیز:

**تست** اگر اجتماع دو مجموعه A و B دارای ۳۰ عضو بوده و ۵ عضو بوده، آن‌گاه چند عضو فقط به A تعلق دارند؟  
 ۲۰ (۴)      ۱۵ (۳)      ۱۰ (۲)      ۵ (۱)


$$\begin{cases} n(A) = 4n(A \cap B) = 4x \\ n(B) + 5 = 4x \Rightarrow n(B) = 4x - 5 \end{cases}$$

اگر تعداد اعضای B را  $x$  بنامیم، داریم:  
 پس:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$30 = 4x + 4x - 5 - x \Rightarrow 30 = 7x - 5 \Rightarrow x = 5$$

پس مجموعه A دارای  $4 \times 5 = 20$  عضو است که ۵ تای آن‌ها با B مشترک‌اند و  $15$  عضو فقط به A تعلق دارند.  
 $n(A - B) = 20 - 5 = 15$   
 یعنی ۱۵ عضو فقط به A تعلق دارند.



تست اگر  $n(U) = 100$  و  $n(A \cap B) = 12$ ، آن‌گاه کدام نادرست است؟

$$n(A' \cup B') = 86 \quad (4)$$

$$n(A' \cap B') = 16 \quad (3)$$

$$n(B' \cap A) = 6 \quad (2)$$


$$n(A' \cap B) = 20 \quad (1)$$

$$n(B) = 2 \times 12 = 24$$

$$\frac{n(B)}{2} = \frac{n(A')}{3} = 3n(A \cap B) = 12 \text{، پس داریم:}$$

$$\frac{n(A')}{3} = 12 \Rightarrow n(A) = n(U) - n(A') = 100 - 36 = 64$$


$$3n(A \cap B) = 12 \Rightarrow n(A \cap B) = 4$$



اعداد را در نمودار ون می‌آوریم:

پس در  $A \cup B$ ، جمماً  $60 + 4 + 20 = 84$  عضو داریم. این جویی هم ببینید:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 64 + 24 - 4 = 84$$



بنابراین متمم  $A \cup B$  یعنی  $A' \cap B'$  دارای  $100 - 84 = 16$  عضو است.

$$n(B' \cap A) = 6 \quad \text{و} \quad n(A' \cap B) = 20$$

همان                          همان

$$n(A' \cup B') = n(U) - n(A \cap B) = 100 - 4 = 96$$

بنابراین حتماً نادرست است. ببینید:

در درس شما نیست، اما ببینید که: (۱)

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C)$$

و در حالتی که مجموعه‌ها دوبعدی هستند:

تست در میان دانشآموزان سال دهم ۲۸ نفر عضو تیم والیبال، ۱۶ نفر بسکتبال و ۳۰ نفر فوتبال هستند. اگر ۴ نفر در هر دو تیم بسکتبال و والیبال، ۳ نفر در فوتبال و والیبال و ۲ نفر در بسکتبال و فوتبال مشترک باشند و فقط ۱ نفر عضو هر سه تیم باشد، چند نفر عضو حداقل یک تیم هستند؟

$$65 \quad (4)$$

$$66 \quad (3)$$

$$67 \quad (2)$$

$$74 \quad (1)$$

سوال این را می‌خواهد:

$$n(F \cup V \cup B) = n(F) + n(V) + n(B) - n(F \cap V) - n(B \cap V) - n(F \cap B) + n(F \cap V \cap B) = 30 + 28 + 16 - 3 - 4 - 2 + 1 = 66$$

حوصله چالش بیشتر دارید؟ به ون نگاه کنید:

به این سوالات جواب دهید!

۱ چند نفر فقط عضو تیم فوتبال اند؟ ۲۶

۲ چند نفر فقط عضو یک تیم‌اند؟ ۵۹

۳ چند نفر عضو تیم والیبال هستند و در فوتبال نیستند؟ ۲۵

۴ چند نفر عضو دقیقاً ۲ تیم هستند؟ ۶

۵ چند نفر عضو حداقل ۲ تیم هستند؟ ۷



## پرسش‌های چهارگزینه‌ای

(کتاب درسی)

-۹۳ اگر  $n(A \cup B) = 30$  و  $n(A \cap B) = 5$ ،  $n(A) = 15$  و  $n(B) = 20$ ، آن‌گاه  $n(A \cap B)$  کدام است؟

$$20 \quad (4)$$

$$15 \quad (3)$$

$$10 \quad (2)$$

$$5 \quad (1)$$

-۹۴ در یک کلاس ۳۱ نفری، تعداد ۱۴ نفر از دانشآموزان عضو گروه سرود و ۱۹ نفر از آن‌ها عضو گروه تئاترند. اگر ۵ نفر از دانشآموزان این کلاس عضو هر دو گروه باشند، چند نفر از دانشآموزان حداقل در یکی از دو گروه قرار دارند؟ (کتاب درسی)

$$29 \quad (4)$$

$$28 \quad (3)$$

$$19 \quad (2)$$

$$26 \quad (1)$$

-۹۵ اگر دو مجموعه  $A$  و  $B$  دارای تعداد عضو مساوی باشند و تعداد اعضای  $A$ ، چهار برابر تعداد اعضای مشترک  $A$  و  $B$  باشد، تعداد عضوهای  $A \cup B$  کدام می‌تواند باشد؟

$$14 \quad (4)$$

$$13 \quad (3)$$

$$12 \quad (2)$$

$$11 \quad (1)$$

-۹۶ اگر  $A$  و  $B$  دو زیرمجموعه از مجموعه مرجع  $U$  باشند و بدانیم که:  $n(A') = 12$ ،  $n(A) = 10$ ،  $n(B') = 7$  و  $n(B) = 6$ ، آن‌گاه  $n(A \cap B')$  کدام است؟

$$15 \quad (4)$$

$$13 \quad (3)$$

$$11 \quad (2)$$

$$9 \quad (1)$$

۹۷- اگر  $A$  و  $B$  زیرمجموعه‌هایی از مجموعه مرجع  $U$  باشند، به طوری که  $n(U) = 100$ ،  $n(A) = 60$ ،  $n(B) = 40$  و  $n(A \cap B) = 20$ ، تعداد اعضای  $n(A' \cap B')$  است؟  
 کتاب درسی

۲۰ (۴)

۱۵ (۳)

۱۰ (۲)

۵ (۱)

$$n(A-B) = n(A) - n(A \cap B) = 60 - 20 = 40$$

$$n(B-A) = n(B) - n(A \cap B) = 40 - 20 = 20$$

$$\frac{n(A-B)}{n(B-A)} = \frac{40}{20} = 2$$

 $\frac{2}{3}$  (۴) $\frac{1}{3}$  (۳) $\frac{1}{2}$  (۲)

۱ (۱)

۹۸- اگر  $A$  چه قدر بیشتر از تعداد اعضای مجموعه  $A' \cap B'$  است؟  
 خوب باش

۱/۶۶ (۴)

۱/۵۵ (۳)

۱/۴۴ (۲)

۱/۳۳ (۱)

۹۹- مجموعه  $A$  دارای ۱۴ عضو و مجموعه  $B$  دارای ۱۷ عضو است، چند عضو فقط در یکی از این دو مجموعه هستند؟  
 کتاب درسی

۲۲ (۴)

۲۱ (۳)

۲۰ (۲)

۱۹ (۱)

۱۰۱- در یک نظرسنجی از ۱۱۰ مشتری یک فروشگاه زنجیره‌ای، مشخص شد که ۷۰ نفر آن‌ها در یک ماه گذشته از محصولات شرکت  $A$  و ۵۷ نفر از محصولات شرکت  $B$  خرید کرده‌اند. هم‌چنین ۳۲ نفر از آنان نیز در این مدت از هر دو شرکت خرید کرده‌اند. چه تعداد از این ۱۱۰ نفر دقیقاً از یکی از این دو شرکت خرید کرده‌اند؟  
 کتاب درسی

۱۰۳ (۴)

۹۵ (۳)

۷۷ (۲)

۶۳ (۱)

۱۰۲- یک دوره جشنواره فیلم کوتاه با شرکت ۲۱ فیلم در موضوعات مختلف در حال برگزاری است که در بین آن‌ها ۷ فیلم پویانمایی و ۸ فیلم طنز وجود دارد، به طوری که ۳ تا از فیلم‌های پویانمایی با مضمون طنز می‌باشند. چند فیلم این جشنواره پویانمایی یا غیرطنز است؟  
 کتاب درسی

۱۳ (۴)

۱۶ (۳)

۱۵ (۲)

۱۲ (۱)

۱۰۳- در یک کلاس ۳۹ نفری، ۱۶ نفر در گروه ورزش، ۱۲ نفر در گروه روزنامه‌دیواری و ۹ نفر فقط در گروه ورزش هستند. چند نفر آنان عضو هیچ یک از این دو گروه نیستند?  
 سراسری ریاضی ۹۱

۱۸ (۴)

۱۷ (۳)

۱۶ (۲)

۱۵ (۱)

۱۰۴- در یک کلاس ۴۲ نفری، ۱۵ نفر عضو گروه آزمایشگاهی و ۱۲ نفر عضو گروه فوتبال و ۷ نفر آنان عضو هر دو گروه هستند. چند نفر از آنان عضو هیچ یک از این دو گروه نیستند?  
 فارج ریاضی ۹۱

۲۲ (۴)

۲۱ (۳)

۱۸ (۲)

۱۵ (۱)

۱۰۵- در یک کلاس ۲۵ نفری، تعداد ۱۵ نفر عضو تیم فوتبال و ۱۱ نفر عضو تیم بسکتبال کلاس هستند. اگر ۵ نفر از دانشآموزان این کلاس عضو هیچ یک از این دو تیم نباشند، چند نفر از آن‌ها عضو هر دو تیم هستند؟  
 کتاب درسی

۳ (۴)

۴ (۳)

۵ (۲)

۶ (۱)

۱۰۶- در یک روز از بین ۱۰۴ مورد جرم گزارش شده به کلانتری، ۷۰ مورد در شب و ۶۱ مورد در حومه شهر بوده است. حداقل چند مورد جرم در شب و درون شهر گزارش شده است؟  
 کتاب درسی

۲۹ (۴)

۲۱ (۳)

۲۷ (۲)

۹ (۱)

۱۰۷- اگر  $A$  و  $B$  مجموعه‌هایی باشند، چند عضو از مجموعه مرجع در  $A$  هست ولی در  $B$  نیست؟  
 کتاب درسی

۵۵ (۴)

۵۰ (۳)

۴۵ (۲)

۴۰ (۱)

۱۰۸- در نمودار ون مقابله تعداد اعضای هر قسمت درون آن نوشته شده است. اگر  $n(A' \cap B) = 10$  باشد، چند عضو حداقل به یکی از مجموعه‌های  $A$  و  $B$  تعلق دارند؟  
 کتاب درسی

۸ (۲)

۱۵ (۴)

۹ (۱)

۱۳ (۳)

۱۰۹- اگر  $n(B-A) = 7$  و  $n(A-B) = 3$  و تعداد اعضای  $B$  دقیقاً دو برابر تعداد اعضای  $A$  باشد،  $A$  و  $B$  چند عضو مشترک دارند؟  
 کتاب درسی

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۱۰- اگر مجموعه  $A$  دارای ۵ عضو، مجموعه  $B$  دارای ۶ عضو و مجموعه  $A \cap B$  دارای ۲ عضو باشد، مجموعه  $(A \cup B)' \cap (B \cup A)'$  چند عضو دارد؟  
 کتاب درسی

۱۰ (۴)

۸ (۳)

۹ (۲)

۷ (۱)

۱۱۱- سارا می‌خواهد هم‌کلاسی‌های خود در مدرسه و کلاس زبان را به تولدش دعوت کند. اگر در مدرسه ۲۴ هم‌کلاسی داشته باشد و در کل ۴۷ نفر مهمنان داشته باشد، تعداد هم‌کلاسی‌های کلاس زبان او حتماً در کدام بازه است؟  
 کتاب درسی

[۲۳, ۲۴] (۴)

[۲۳, ۴۷] (۳)

[۰, ۴۷] (۲)

[۰, ۲۳] (۱)

۱۱۲- در یک نظرسنجی از ۵۰ نفر، ۲۸ نفر به بستنی و ۳۲ نفر به آبمیوه علاقه دارند. حداقل چند نفر به هیچ کدام علاقه ندازند؟  
 خوب باش

۲۰ (۴)

۱۸ (۳)

۱۵ (۲)

۱۰ (۱)

۱۱۳- اگر مجموعه مرجع دارای ۲۲ عضو و دو زیرمجموعه  $A$  و  $B$  در آن دارای ۱۷ و ۱۲ عضو باشند،  $A - B$  حداقل چند عضو دارد؟

۷ (۴)

۱۷ (۳)

۱۰ (۲)

۱۲ (۱)

۱۱۴- مجموعه  $A$  دارای ۳۶ عضو و مجموعه  $B$  دارای ۲۸ عضو است. اشتراک آن‌ها ۱۵ عضو دارد. اگر ۱۶ عضو از مجموعه  $A$  حذف شود، از اشتراک آن‌ها ۹ عضو حذف می‌شود. تعداد عضوهای اجتماع مجموعه جدید با مجموعه  $B$ ، کدام است؟

۳۵ (۴)

۳۳ (۳)

۴۲ (۲)

۴۰ (۱)

۱۱۵- اجتماع دو مجموعه  $A$  و  $B$  دارای ۴۰ عضو است. مجموعه‌های  $(A - B)$  و  $(B - A)$  به ترتیب ۱۲ و ۱۸ عضو دارند. اگر از هر یک از مجموعه‌های  $A$  و  $B$ ، ۹ عضو برداشته شود، از مجموعه‌های اشتراک آن‌ها ۴ عضو کم می‌شود. تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه جدید، کدام است؟

۲۶ (۴)

۲۴ (۳)

۲۳ (۲)

۲۲ (۱)

۱۱۶- در بیمارستانی با ۴۰۰ بیمار، بیماران ممکن است دارای سه بیماری  $A$ ،  $B$  و  $C$  باشند. اگر ۱۶۰ نفر مبتلا به  $A$ ، ۳۰۰ نفر مبتلا به  $B$  و  $C$ ، ۹۰ نفر مبتلا به  $B$  و  $C$ ، ۱۰۰ نفر مبتلا به  $A$  و  $B$  و ۵۰ نفر مبتلا به  $A$  و  $C$  باشند، چند بیمار فقط بیماری  $C$  را دارند؟

۴۰ (۴)

۶۰ (۳)

۹۰ (۲)

۱۶۰ (۱)

۱۱۷- دو مجموعه  $A = \{1, 4, 7\}$  و  $B = \{x \in U \mid x < 3\}$  و  $U$  جدا از هم هستند. کدام نمی‌تواند باشد؟

$\mathbb{Z} \cap \mathbb{N}$  (۴)

$\mathbb{Q} - \mathbb{Z}$  (۳)

$\mathbb{Z} - \mathbb{W}$  (۲)

$\mathbb{Q}'$  (۱)

۱۱۸- چند عدد طبیعی کمتر یا مساوی ۱۰۰ بر ۲ یا ۳ بخش پذیرند؟

۸۸ (۴)


۶۶ (۳)

۶۷ (۲)

۸۷ (۱)



## پاسخ نامه تشریحی



- ۸ **گزینه ۱** باید اول سؤال را با نمودار بررسی کنیم:  
 $A - (A \cap B) = A - B$ . حالا  $A \cup B$  و این مجموعه را می‌خواهد، یعنی  $(A \cup B) - (A - B)$ . پس:  $(A \cup B) - [A - (A \cap B)] = (A \cup B) - (A - B) = B = \{2, 4, 5, 6\}$  و دارای ۴ عضو است.


- ۹ **گزینه ۲** اعضاي A عبارت‌اند از:  $A = \{10, 11, 12, \dots, 98, 99\}$   
 $B = \{70, 77, 84, \dots, 69\}$   
 حالا B شامل ۷ برابر اعضاي A است: عضوهای مشترک A و B عبارت‌اند از اعداد دورقمی مضرب ۷ با شروع از ۷۰، یعنی  $A \cap B = \{70, 77, 84, 91, 98\}$  پنج عضو دارد.

بدون شرح!

- ۱۰ **گزینه ۳** اگر  $A \cup B$  را با هاشور (/ $\diagup$ / $\diagdown$ /) و  $C$  را با هاشور (/ $\equiv$ /) مشخص کنیم ناحیه مشخص شده می‌شود:  $(A \cup B) \cap C$ .

- ۱۱ **گزینه ۴** طبق نمودار رویه‌رو همان  $B - (A \cap B)$  است.  $B - A$  را پس  $A - (B - A) = A$  می‌خواهیم و چون A و B - A اشتراکی ندارند، جواب تفاضل همان  $A - (B - A) = A$  می‌شود:

- ۱۲ **گزینه ۵** اول یک نمودار را با توجه به شرایط سوال می‌کشیم:  
 دقت کنید که A زیرمجموعه B است و باید درون  $A \cap B \cap C$  ناحیه سایه‌زده از A است و قرار گیرد. حالا  $A \cap (B - C)$  ناحیه سایه‌زده از A است که اشتراکی ندارند، پس جواب می‌شود همان  $A \cap (B - C)$  که با توجه به شکل A ∩ C' است (همان).



- ۱۴ **گزینه ۶** همان  $A \cup B$  است:  $A \cup B = B$  و در درس نامه دیدیم که این یعنی  $A \subseteq B$ .

- ۱۵ **گزینه ۷** با هیچ کدام از مجموعه‌های B و C اشتراک ندارد. این شکلی:  
 $A \cap (B \cup C) = \emptyset$  پس A با اجتماع آن‌ها هم اشتراکی ندارد:  
 در مورد اشتراک B و C نظری نمی‌توان داد (۱) و (۲) نیستند) و چون  $B - C$  قسمتی از B است با A اشتراکی ندارد.

- ۱۶ **گزینه ۸** مجموعه‌های  $A_4$  و  $A_{۲۴}$  را می‌نویسیم (به جای n اعداد ۳ و ۴ را می‌گذاریم):  $A_4 = \{m \in \mathbb{Z} | m \geq -3, 2^m \leq 3\} = \{-3, -2, -1, 0, 1\}$

- ۱ **گزینه ۹** با توجه به شکل،  $A \subseteq C \subseteq (A \cup B)$  درست است، اما  $A \subseteq A$  درست نیست؛ چون ۳ عضو است و در رابطه  $\subseteq$  باید مجموعه داشته باشیم و  $(A \cup B) \subseteq A$  هم درست نیست، چون ۲ خارج از A و B است؛ پس می‌شود ۲ گزاره نادرست.

- ۲ **گزینه ۱۰** اگر گزینه‌ها را بررسی کنیم، می‌بینیم که  $\{1\} \subseteq A$  نادرست است، چون {1} عضوی از مجموعه A است. درستی بقیه گزینه‌ها را خودتان بررسی کنید!

- ۳ **گزینه ۱۱** زیرمجموعه C نیست، چون ۲ عضو مجموعه B است که آن را در C نمی‌بینیم (به عنوان عضو نمی‌بینیم).  
**گزینه ۱۲** زیرمجموعه B است، چون تنها عضو A را در B می‌بینیم.  
**گزینه ۱۳** عضو B هم هست، چون A به صورت عضو در B داریم، بینید:  $B = \{2, \{2\}\} = \{2, A\}$  این A است

- گزینه ۱۴** عضو C است، چون خود B را به طور کامل در C داریم:  $C = \{\{2\}, \{2, \{2\}\}\} = \{A, B\}$

- ۴ **گزینه ۱۵** تک تک گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:  
**گزینه ۱۶** مجموعه A - B شامل عضوهایی از A است که در B نباشند. فقط عضو سوم یعنی {1, 2, 3} در مجموعه A در B نیست (اعضاي ۱ و ۲ از A در B هم هستند)، پس  $A - B = \{1, 2, 3\}$  که با C مساوی نیست.  
**گزینه ۱۷** در واقع  $A - B = \{C\}$  و درست است.  
**گزینه ۱۸** B - C مجموعه اعضای است که در B هستند و در C نیستند که {1, 2} این طور است، پس  $B - C = \{1, 2\}$  و تهی نیست.  
**گزینه ۱۹** همان طور که دیدیم  $B - C = \{1, 2\}$  پس درست شد!

- ۵ **گزینه ۲۰** راه اول کافی است  $A \cup B$  و  $A \cap B$  را پیدا کنیم:  

$$\begin{aligned} A = \{1, 2, 3, 4\} &\Rightarrow A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 8\} \\ B = \{2, 4, 6, 8\} &\Rightarrow A \cap B = \{2, 4\} \\ \Rightarrow (A \cup B) - (A \cap B) &= \{1, 3, 6, 8\} \Rightarrow \text{چهار عضو} \\ (A \cup B) - (A \cap B) &= (A - B) \cup (B - A) \end{aligned}$$
 می‌دانیم (راه دوم)  


$$\begin{aligned} A - B &= \{1, 3\} \Rightarrow (A - B) \cup (B - A) = \{1, 3, 6, 8\} \\ B - A &= \{6, 8\} \Rightarrow \text{چهار عضو} \end{aligned}$$

- ۶ **گزینه ۲۱** بهتر است مجموعه‌ها را با نمودار و نشان دهیم که بررسی گزینه‌ها راحت‌تر باشد:  
 حالا برویم سراغ گزینه‌ها: در  $((A \cup B) - C) = \{6, 9, 10, 11\}$  نادرست است. درستی بقیه گزینه‌هارا خودتان بررسی کنید.

- ۷ **گزینه ۲۲** همان  $A - (A - B)$  است.  $A \cap B$  نیز همان  $A \cap B$  است. علت‌ش هم این نمودار، پس در واقع  $A \cap B$  با خودش را می‌خواهیم که همان  $A \cap B = \{3, 6\}$  می‌شود که دو عضو دارد.

بازه (4) به صورت  $\{-5, -4, -3, -2, -1\}$  است که ۵ عضو دارد.


۲۷- گزینه از محور اعداد کمک می‌گیریم:



داریم:

$$(-2, 5) \cup [(\frac{4}{3}, 5) \cap (3, 10)] = (-2, 5) \cup (3, 5) = (-2, 5) - \{3\}$$

۲۸- گزینه بازه‌ها را روی محور بینید:



پس  $A \cup C$  به صورت بازه  $(-3, 2)$  است و اگر از آن B را برداریم، تفاضل موردنظر  $(-3, 0)$  خواهد بود که ۳ عضو صحیح  $\{-2, -1, 0\}$  را دارد.

۲۹- گزینه اول محدوده X را در هر مجموعه تعیین می‌کنیم:

$$A = \{x \mid 1 < \frac{2x+1}{3} \leq 5, x \in \mathbb{Q}\} \Rightarrow 1 < \frac{2x+1}{3} \leq 5$$

$$\Rightarrow 3 < 2x+1 \leq 15 \Rightarrow 2 < 2x \leq 14 \Rightarrow 1 < x \leq 7$$

$$\Rightarrow A = \{x \mid 1 < x \leq 7, x \in \mathbb{Q}\}$$


$$B = \{x \mid 1 < \frac{x+5}{7} < 3, x \in \mathbb{N}\} \Rightarrow 1 < \frac{x+5}{7} < 3$$

$$\Rightarrow 7 < x+5 < 21 \Rightarrow 2 < x < 16$$

$$\Rightarrow B = \{x \mid 2 < x < 16, x \in \mathbb{N}\} = \{3, 4, 5, \dots, 14, 15\}$$

حالا چون اعضای B اعداد طبیعی هستند، پس  $\{3, 4, \dots, 7\}$  حالا  $A \cap B = \{3, 4, \dots, 7\}$

C را روی محور مشخص می‌کنیم و اشتراک A ∩ B و C را پیدا می‌کنیم:



$$\Rightarrow C = [4, 8)$$


$$(A \cap B) \cap C = \{4, 5, 6, 7\}$$

پس  $\{4, 5, 6, 7\}$  عضو مشترک داریم.

۳۰- گزینه اجتماع (1) ∪ (2) برابر  $(-\frac{15}{7}, -2)$  شده است.

پس کوچکترین عدد یعنی b باید برابر -2 و بزرگترین عدد یعنی a باید برابر  $\frac{15}{7}$  باشد. حالا مجموعه خواسته شده را روی محور نشان می‌دهیم:

$$(a-2, b+3) \cap (b-2, a+2) = (\frac{1}{7}, 1) \cap (-4, \frac{29}{7})$$



پس اشتراک دو بازه برابر  $(1, \frac{29}{7})$  است که در ۱ نشان داده شد.

۳۱- گزینه با توجه به شکل داده شده در سؤال A ∩ B به صورت  $(-\sqrt{3}, \sqrt{5})$  است، پس داریم:

$$(A \cap B) - C = (-\sqrt{3}, \sqrt{5}) - (-2, 2] = (2, \sqrt{5})$$

که شامل هیچ عدد صحیحی نیست.

۳۲- گزینه اگر بخواهیم اجتماع دو بازه  $[-\infty, 2m-1] \cup [m+2, +\infty)$  و

شود، باید طبق شکل‌های زیر:



$$A_4 = \{m \in \mathbb{Z} \mid m \geq -4, 2^m \leq 4\} = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2\}$$

پس  $A_4 \subseteq A_3$  و اشتراک آنها می‌شود،  $A_3$  که ۵ عضو و ۳۲ زیرمجموعه دارد.

۳۷- گزینه  $\sqrt{2}$  را که می‌دانیم گنج است، اما سایر اعداد که نمایش اعشاری با ارقام مشخص دارند گویا هستند.

۳۸- گزینه درستی را در درس‌نامه دیدیم.

۳۹- گزینه تمام اعداد حسابی، صحیح هم هستند، پس  $\mathbb{W} - \mathbb{Z}$  عضوی ندارد. عدد صحیح بین ۲ و ۳ هم نداریم، اما در  $\mathbb{W}$  اعداد طبیعی بین ۲ و ۲ عبارت‌اند از:  $\{1, 2\}$

۴۰- گزینه با توجه به رابطه  $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{W} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$  و هر کدام از مجموعه‌های داده شده درستی هر کدام از گزاره‌ها را بررسی می‌کنیم:

۱ نادرست  $\mathbb{Z} \cap \mathbb{W} = \mathbb{N}$       ۲ درست  $\mathbb{W} - \mathbb{Z} = \mathbb{Q} - \mathbb{Q}'$

۳ نادرست  $\mathbb{W} \cap \mathbb{Q} = \mathbb{N}$       ۴ نادرست  $\mathbb{Z} \cup \mathbb{Q} = \mathbb{R}$

پس هر چهار گزاره نادرست‌اند.


۴۱- گزینه درستی هر کدام از گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:

۱ درست  $\mathbb{Q}' - \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}'$       ۲ درست  $\mathbb{Q} \cap \mathbb{Q}' \subseteq \mathbb{Q}'$

۳ نادرست  $\mathbb{Q} - \mathbb{Q}' \not\subseteq \mathbb{Q}'$       ۴ درست  $\mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}' \subseteq \mathbb{Q}$

۴۲- گزینه از بین گزاره‌های داده شده  $\frac{4}{3} \in [\frac{1}{2}, 2]$  درست‌اند. خودتان بگویید چرا بقیه نادرست‌اند!

۴۳- گزینه A-B شامل اعضاًی است که در A هستند و در B نیستند. اگر محور را رسم کنیم،



می‌بینیم اعداد  $\pm 2$  در A هستند و در B قرار نیستند؛ بنابراین ۲ عدد صحیح در A - B هست.

۴۴- گزینه اول حاصل هر کدام از گزینه‌ها را پیدا می‌کنیم:

۱ بازه  $(2, 3)$  است:

۲ بازه  $(-\infty, +\infty)$  یعنی کل  $\mathbb{R}$  است:

۳ به صورت  $[1, 2]$  است:

۴ بازه  $(-3, 2)$  است:

پس ۴ بسته است.

۴۵- گزینه اول حاصل هر کدام از گزینه‌ها را پیدا می‌کنیم:

۱  $(-3, 2) = (2, -2) \cup (-2, 2)$

۲  $(-4, -2) = (-4, -3) \cup (-3, -2)$

۳  $(1, 5) = (1, 3) \cup (3, 5)$

۴  $(1, 5) = (3, 5) \cup (3, 7)$

پس حاصل ۴ یک بازه نیست بلکه اجتماع دو بازه است.

۴۶- گزینه  $\mathbb{Z}$  مجموعه اعداد صحیح و  $\mathbb{W}$  مجموعه اعدادی هست که اعداد صحیح منفی است و اشتراک آن با حسابی‌اند، پس  $\mathbb{Z} - \mathbb{W}$  شامل اعداد صحیح منفی است و اشتراک آن با

**۴۰- گزینه** مضربهای صحیح عدد ۴ که بزرگتر از ۱۰ هستند، عبارت‌اند از  $12, 16, 20, 24$  و چون سه مضرب می‌خواهیم، پس  $12, 16, 20$  حالا باید بازه  $(10, m)$  شامل هر سه عدد بالا باشد، پس  $m > 20$ . از طرف دیگر چون فقط ۳ مضرب می‌خواهیم باید  $m \leq 24$ . پس  $20 < m \leq 24$  و در نتیجه مقادرهای صحیح  $m$  برابرند با  $24, 22, 21$  که می‌شوند چهارتا.

**۴۱- گزینه** اشتراک  $(-\infty, 4] \cap (-\infty, -a) \cup (-a, +\infty)$  برابر تهی است، پس  $-a \geq 4$  باشد؛ یعنی  $a \leq -4$ ، پس حداقل طول بازه  $(-1, a+5)$  به ازای  $a = -1$  به دست می‌آید که می‌شود  $(4, -1)$  که دارای اعداد طبیعی  $1, 2, 3$  یعنی ۳ عدد طبیعی است.

**۴۲- گزینه** چون  $\{a \mid -2 < a < 1\} \subseteq \{a \mid -2 < a < 2\}$  است، پس باید داشته باشیم:

$$\begin{cases} 4a - 2 \geq -2 \Rightarrow a \geq 0 \\ a + 1 \leq 2 \Rightarrow a \leq 1 \end{cases} \Rightarrow 0 \leq a \leq 1$$

حالا حدود عدد  $1$  را پیدا می‌کنیم:

$$0 \leq a \leq 1 \Rightarrow 0 \leq \frac{5}{2}a \leq \frac{5}{2} \Rightarrow 1 \leq \frac{5}{2}a + 1 \leq \frac{7}{2}$$

حالا با توجه به این که  $\frac{5}{2}a + 1 \leq \frac{7}{2}$  است، حتماً متعلق به بازه  $[1, 4]$  هست.

**۴۳- گزینه** با توجه به این که  $a < -1$  است، داریم:

$$0 < -a < 1, \frac{1}{a} < -1, -\frac{1}{a} > 1$$

بازه‌ها را روی محور مشخص می‌کنیم:

پس اشتراک دو بازه برابر است با  $(a, -a)$ .

**۴۴- گزینه** چون  $(a-2, a+5) \cap [a+2, 5] = [3a-1, 4]$  شده است،

پس باید  $3a-1=4$  برابر  $-2$  باشد و یا برابر  $a+2$ ، هر کدام را بررسی می‌کنیم:

$$3a-1=a+2 \Rightarrow a=\frac{3}{2} \Rightarrow [-2, 4] \cap [\frac{7}{2}, 5] = [\frac{7}{2}, 4] \checkmark$$

$$3a-1=-2 \Rightarrow a=-\frac{1}{3} \Rightarrow [-2, 4] \cap [-\frac{5}{3}, 5] = [-2, 4] \times$$

پس باید  $\frac{3}{2}$  باشد و در نتیجه  $(a-2, a) = (-\frac{1}{3}, \frac{3}{2})$  و از بین گزینه‌ها فقط ۱ یعنی صفر، عضو این بازه است.

**۴۵- گزینه**  $\frac{2}{n+1} < \frac{5}{2n+1}$  وقتی بازه است که

باشد، پس وقتی بازه نیست که  $\frac{2}{n+1} \geq \frac{5}{2n+1}$  باشد، در نتیجه:

$$\frac{2}{n+1} \geq \frac{5}{2n+1} \xrightarrow{\text{معکوس}} \frac{n+1}{2} \leq \frac{5}{2}$$

$$\Rightarrow 5n+5 \leq 4n+2 \Rightarrow n \leq -3$$

حالا چون  $n \leq -3$  شده است، مقدار طبیعی برای  $n$  وجود ندارد.

**۴۶- گزینه** اول  $A_1, A_2, A_3$  و  $A_4$  را پیدا می‌کنیم.  $(i) = (-i)$

$A_1 = (-1, 1), A_2 = (-2, 2), A_3 = (-3, 3)$  پس:

یا  $m+2 = 2m-1$  باشد یا  $m+2 < 2m-1 \Rightarrow -m \leq -3 \Rightarrow m \geq 3$  می‌توانیم بنویسیم:

**۴۷- گزینه**  $x$  متعلق به بازه  $(2x-1, 3x+2)$  است؛ بنابراین باید  $2x-1 \leq x < 3x+2$  باشد، پس داریم:

$$\begin{cases} 2x-1 \leq x \Rightarrow x \leq 1 \\ x < 3x+2 \Rightarrow 2x > -2 \Rightarrow x > -1 \end{cases} \Rightarrow -1 < x \leq 1$$

پس فقط دو مقدار صحیح صفر و ۱ داریم.

**۴۸- گزینه** از  $(b-1, 2b+1)$  نتیجه می‌گیریم:

$b-1 < 3 < 2b+1$  و از  $(b-1, 2b+1)$  نتیجه می‌گیریم یا  $2 \leq b-1 \leq 2$  یا  $+1 \leq b-1 \leq 2$ ، این نامعادله‌ها را حل می‌کنیم:

$$b-1 < 3 < 2b+1 \Rightarrow \begin{cases} b-1 < 3 \Rightarrow b < 4 \\ 2b+1 > 3 \Rightarrow b > 1 \end{cases} \Rightarrow 1 < b < 4 \quad (\text{I})$$

$$2 \leq b-1 \Rightarrow b \geq 3$$

$$\text{یا} \quad (\text{II})$$

$$2 \geq 2b+1 \Rightarrow b \leq \frac{1}{2}$$

حالا اشتراک (I) و (II) را به دست می‌آوریم:

پس محدوده قابل قبول  $b$  برابر است با:

**۴۹- گزینه** به شکل دقت کنید:

حاصل اجتماع تا ۶ رفته است، پس حتماً  $b=6$  است. از طرف دیگر

اجتماع از  $-3$  شروع شده، پس  $a=-3$  است. بنابراین بازه‌های اولیه  $B=(-3, 5)$  و  $ab=-18$  هستند و داریم:  $A=(-2, 6)$

**۵۰- گزینه** اشتراک این دو بازه، تک عضوی است، پس باید با توجه

به محور مقابل،  $m-2=2m+1$  باشد:

$$\frac{-\infty}{m-2} \xrightarrow{\bullet} \frac{+\infty}{2m+1} \Rightarrow m=-3 \Rightarrow m-2=2m+1=a=-5$$

و داریم:

**۵۱- گزینه** بازه اشتراک دو بازه  $(-1, 2) \cap (a, b)$  با عدد  $a+1=b$  باشد:

شروع می‌شود، پس  $a+1=a$  است که ممکن نیست یا  $=-1$

است که در این صورت  $a=-2$ . حالا به جای  $a$  می‌گذاریم  $-2$ :  $(-1, 2) \cap (-2, b) = (-1, 1)$

و چون آخر بازه اشتراک ۱ است، پس باید  $b=1$  باشد، بنابراین:  $a+b=(-2)+1=-1$

**۵۲- گزینه** باید چند بازه اول برای  $B$  را بنویسیم:

$$n=1 \Rightarrow B=(-2, 2), \quad n=2 \Rightarrow B=(-1, 3)$$

$$n=3 \Rightarrow B=(0, 4), \quad n=4 \Rightarrow B=(1, 5)$$

می‌بینیم پس از  $n=4$  و به بعد، شروع بازه  $B$  عددی بعد از ۱ است و

قطعًا با  $A=[-\frac{1}{3}, 1]$  اشتراک ندارد، پس فقط  $n=1, 2, 3$  قابل قبول است.

و جمع مقادیر  $n$  می‌شود  $1+2+3=6$ .

**۵۳- گزینه** بازه  $A$  حتماً با  $(-1, 2)$  اشتراک دارد و حتماً قسمتی دارد

که در  $(-1, 2)$  نیست. پس از بین گزینه‌ها فقط ۱ مناسب است.

مقسوم‌علیه‌های مشترک ۶ و ۷ اعداد  $\pm 1$  هستند. (نمتأهی است)  
مجموعه مقسوم‌علیه‌های اول عدد ۱ هم تهی است. چون ۱ هیچ مقسوم‌علیه اولی ندارد.

- ۵۵ مجموعه اعداد اول کمتر از  $2^0$ ، هشت‌عضوی است:  
 $A = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$

مجموعه اعداد طبیعی مریع کامل و کمتر از  $7^0$  نیز هشت‌عضوی است:  
 $B = \{1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64\}$

مجموعه مقسوم‌علیه‌های صحیح ۶ نیز هشت‌عضو دارد:  
 $C = \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6\}$

اما مجموعه کسرهای بین صفر و ۱ با مخرج ۷ دارای شش‌عضو است:  
 $D = \left\{ \frac{1}{7}, \frac{2}{7}, \frac{3}{7}, \dots, \frac{6}{7} \right\}$

- ۵۶ اعداد  $2k+6=2(k+3)$  همواره زوج‌اند. اعداد  $3k+1$  یا  $1-3k$  می‌توانند زوج یا فرد باشند. اما اعداد  $5-2k$  همیشه فرد هستند، چون:  
 $2k-5=2k-6+1=\overbrace{2(k-3)}^{k'}+1=2k'+1$

- ۵۷ بزرگ‌ترین عدد صحیح یا بزرگ‌ترین عدد بازه  $(2, +\infty)$  وجود ندارد، پس ۱ و ۲ نادرست است. بزرگ‌ترین عدد گویای کمتر از ۳ هم وجود ندارد، پس ۳ نادرست است. بزرگ‌ترین عدد گویای کمتر از یا مساوی ۴، برابر ۴ است و وجود دارد!

- ۵۸  $A = \{x \mid x = 2n-1, n \in \mathbb{N}\}$  یعنی مجموعه اعداد فرد که نامتأهی است، پس ۱ نادرست است.

$B = \{x \mid x = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}\}$  به صورت  $\{\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}\}$  و نامتأهی است، پس ۲ نادرست است.  $C = \{x \mid x = \frac{(-1)^n}{n}, n \in \mathbb{N}\}$  برابر است با  $\{-\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \dots\}$  که دو عضو دارد، پس متنه‌ی است، یعنی جواب، ۳ است. در مورد ۴ هم خودتان برسی کنید.

- ۵۹ درست است، چون دو عدد طبیعی، دو عدد گویا هم هستند و بینشان بی شمار عدد گویا وجود دارد. ۱ را هم در درس نامه دیدیم که درست است، یعنی بین دو هر عدد گنگ بین نهایت عدد گویا وجود دارد. ۲ نادرست است. چون مثلاً بین دو عدد گنگ  $\sqrt{2}$  و  $\sqrt{3}$  هیچ عدد صحیحی وجود ندارد. در مورد درستی ۳ هم خودتان توضیح دهید!

- ۶۰  $A$  نامتأهی و  $B$  نامتأهی است. پس  $A \cup B$  و  $A \cap B$  نامتأهی‌اند چون اولی شامل تمام  $M$  می‌شود و دومی دقیقاً قسمتی از  $R$  را دارد که در  $A$  نیست. اما  $A - B$  و  $A \cap B$  حتماً نامتأهی‌اند چون قسمتی از  $A$  هستند.

- ۶۱  $A$  نادرست است. مثلاً اگر  $A$  مجموعه اعداد زوج باشد،  $A'$  مجموعه اعداد فرد است و هر دو نامتأهی‌اند.

در ۱ اگر  $B$  نامتأهی باشد، زیرمجموعه آن یعنی  $A$  می‌تواند نامتأهی باشد. مثلاً  $B$  اعداد فرد ولی  $\{1\} = A = A'$  زیرمجموعه آن نامتأهی است.

۲ نیز نادرست است. مثلاً  $A$  مجموعه مضارب ۵ و  $B$  مجموعه اعداد اول است و هر دو نامتأهی‌اند و اجتماع آن‌ها  $\mathbb{N}$  نیست.

۳ درست است. وقتی  $A$  نامتأهی‌اند چون  $B$  هم نامتأهی است چون  $B$  تمام اعضوهای  $A$  را دارد!

- ۶۲ درست است، مثلاً مجموعه  $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$  هم مثبت و هم منفی) هستند. (نامتأهی)  $B = \{0, -1, -2, \dots\}$  هر دو نامتأهی‌اند، اما اشتراکشان برابر  $\{0\}$  و نامتأهی است.

حالا حاصل عبارت خواسته شده را پیدا می‌کنیم:  
$$(A_1 \cup A_2) \cap A_3 = (-2, 2)$$

- ۴۷ گزینه



- ۴۸ گزینه بازه‌های  $A_1, A_2, A_5$  و  $A_7$  را می‌نویسیم:


$$A_1 = [-i, \frac{9-i}{2}] \Rightarrow A_1 = [-1, 4], A_2 = [-2, \frac{7}{2}]$$

$$A_5 = [-5, 2], A_7 = [-7, 1]$$

$$A_2 \cap A_5 = [-2, \frac{7}{2}] \cap [-5, 2] = [-2, 2]$$

$$A_1 \cap A_7 = [-1, 4] \cap [-7, 1] = [-1, 1]$$

$$[-2, 2] - [-1, 1] = [-2, -1] \cup (1, 2]$$




تفاضل آن‌ها برابر است با:

- ۴۹ گزینه بیاید ۴ بازه اول را بنویسیم:

$$A_n = ((-1)^n n, 2n) \Rightarrow A_1 = (-1, 2), A_2 = (2, 4)$$

$$A_3 = (-3, 6), A_4 = (4, 8)$$

اجتماع این‌ها می‌شود  $(-3, 8)$




که در آن اعداد صحیح  $-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$  هستند، یعنی ۱۰ عدد صحیح دارد.

- ۵۰ گزینه بیاید مجموعه‌های  $A_1$  تا  $A_4$  را بنویسیم:

$$A_n = [n-1, n+1]$$

$$A_1 = [0, 2], A_2 = [1, 3], A_3 = [2, 4], A_4 = [3, 5]$$

اشتراک ۳ تایی اول برابر است با:



اجتماع ۴ تایی اول هم برابر است با: و تفاضل این‌ها  $\{2\} - \{0, 5\}$  است که در ۲ آمده است.

- ۵۱ گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:

در ۱ اعداد صحیح کمتر از  $10^0$  تا  $-\infty$  می‌روند، پس نامتأهی است.

در ۲ اعداد گویای بین  $\sqrt{2}$  و  $\sqrt{5}$  نامتأهی‌اند. چون بین هر دو عدد گنگ، بی شمار عدد گویای دیگر وجود دارد، پس نامتأهی است. در ۳ هم بی شمار عدد حقیقی در  $(2, 1)$  وجود دارد، پس نامتأهی است؛ اما در ۴ اعداد طبیعی کمتر از  $10^0$ ، دقیقاً از ۱ تا ۹۹ هستند که مجموعه‌ای نامتأهی با ۹۹ عضو است.

- ۵۲ گزینه مجموعه اتمها، درختان یا حشرات قطعاً انتهای دارد و تعداد اعضای آن‌ها عددی مشخص است (هر چه قدر بزرگ باشد باز هم محدود است)؛ اما تعداد تمام دایره‌های قلیل رسم به مرکز  $(1, 2)$  تا نهایت می‌رود و نامتأهی نیست.

- ۵۳ گزینه فقط یک خط با شیب ۲ و گذرنده از مبدأ وجود دارد. اما تعداد «مثلث‌ها با مساحت ۶»، «مربع‌ها با مساحت ۶ و رأس روی مبدأ» و «خط‌های گذرنده از مبدأ» نامتأهی است.


- ۵۴ گزینه مضارب ۶، کلیه اعداد به صورت  $6k$  (هم مثبت و هم منفی) هستند. (نامتأهی)

مضارب مشترک ۶ و ۷، تمام اعداد به صورت  $42k$  هستند. (نامتأهی)

$(-\infty, 1) \cup [17, +\infty)$

پس  $A'$  برابر است با:

- ۷۰- **گزینه**  $\mathbb{Z} - W$  برابر است با:  $\{-1, -2, -3, -4, \dots\}$   
 پس متمم مجموعه  $\{-1, -2, -3\}$  برابر است با:  $A = \{-4, -5, \dots\}$   
 حواسمن باشد که نوع نوشتن  $\{-4, -5, \dots\}$  یا  $\{-4, -5, \dots\}$  با هم فرقی ندارد!




اول بازه  $[\frac{1}{2}, 4]$ , را رسم می‌کنیم:

اگر اعداد ۱، ۲، ۳ و ۴ را حذف کنیم، داریم:

این مجموعه از اجتماع ۴ بازه  $(1, 2), (2, 3), (3, 4)$  و  $(1, \frac{1}{2})$  ساخته شده است.

- ۷۱- **گزینه** اول بازه‌ها را روی محور رسم می‌کنیم:  
 $A' \cup B = [-2, 3] \cup (-1, 5) = [-2, 5]$  ،  $A \cap B = (3, 5]$




پس بزرگترین عنصر هر دو مجموعه، ۵ است و اختلاف آن‌ها صفر می‌شود.

- ۷۲- **گزینه** اول با توجه به  $U = (2, +\infty)$ ،  $B = (3, 5]$ ،  $C = \{x | x \geq 9, x \in U\} = (9, +\infty)$ ،  $A = \{x | x \leq 9, x \in U\} = (2, 9]$ ، مجموعه‌ای  $B' = (2, 3] \cup (5, +\infty)$  و  $C' = (2, 7)$  را پیدا می‌کنیم:  
 پس حاصل عبارت خواسته شده برابر است با:  
 $(A - C') \cap B' = ((2, 9] - (2, 7)) \cap ((2, 3] \cup (5, +\infty)) = ([7, 9] \cap ((2, 3] \cup (5, +\infty))) = [7, 9]$

- ۷۳- **گزینه** عضوهای  $A$ ، اعدادی هستند که مرتعشان از ۵ بیشتر نباشد، پس با توجه به مجموعه مرجع داریم:  
 $A = \{0, 1, -1, 2, -2\}$   
 در مجموعه  $B$  هم باید  $x$ ‌های مثبت قرار دهیم که  $\sqrt{x} - 5$  کامل شود، پس:  
 $B = \{\}$   
 $A' = U - A = \{3, 4\}$   
 $B - A = \emptyset \Rightarrow A' - (B - A) = \{3, 4\} - \emptyset = \{3, 4\}$


يعني دو عضوي است.

- ۷۴- **گزینه** درست است. می‌دانیم اگر در رابطه زیرمجموعه‌بودن، مجموعه‌ها را متمم کنیم جهت برعکس می‌شود یعنی از رابطه  $A \subset B$  نتیجه می‌شود  $B' \subset A'$ . (خیلی هم مهم است، حتیً بادمان بماند!) درست است. اگر  $A - B$  تهی باشد، تمام اعضای  $A$  در  $B$  هستند و در نتیجه  $A$  زیرمجموعه  $B$  خواهد بود.



يعني تمام اعضای  $A$  با  $B$  مشترک‌اند، پس  $A$  زیرمجموعه  $B$  است.

- ۷۶- **گزینه** در شکل رویه را  $A'$  با  $B$  را با هاشور (////) مشخص کرده‌ایم، پس ناحیه سایه خود را می‌شود  $.A' \cup B$ .



- ۷۷- هم درست است، چون مجموعه‌های  $\{1, 4, 7, 10, \dots\}$ ،  $B = \{2, 5, 8, 11, \dots\}$  و  $C = \{3, 6, 9, 12, \dots\}$  هر سه نامتناهی‌اند و هیچ کدام با هم اشتراک ندارند.
- ۷۸- نادرست است، چون اگر  $A \subseteq B$  و  $A$  نامتناهی باشد، حتماً  $B$  نامتناهی است. در مورد درستی  $\mathbb{N}$  خودتان توضیح دهید.

- ۷۹- **گزینه**  $A$  یعنی اعداد فرد برابر است با  $A = \{1, 3, 5, 7, \dots\}$  و  $B$  یعنی اعداد اول برابر است با  $B = \{2, 3, 5, 7, 11, \dots\}$  حالا گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:  
 $B - A = \{1, 9, 15, \dots\}$  نامتناهی است،  $A - B = \{2\}$  که هم نامتناهی است و هم غیرتنهی، پس جواب  $\mathbb{N}$  است. در مورد  $\mathbb{N}$  و  $\mathbb{F}$  هم خودتان توضیح دهید.

- ۸۰- **گزینه** هر کدام از گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:

۸۱-  $Q' - Q = Q'$  نامتناهی  
 $(\mathbb{Q} - \mathbb{R}) \cap (\overline{Q' - \mathbb{Z}}) = \emptyset \cap Q' = \emptyset$  نامتناهی  
 $(\mathbb{Z} - \mathbb{N}) \cap (\overline{Q - \mathbb{Q}}) = \{..., -3, -2, -1, 0\} \cap \mathbb{Q} = \{..., -3, -2, -1, 0\}$  نامتناهی

- ۸۲-  $(\mathbb{N} - \mathbb{Q})' \cap \mathbb{Z}' = \mathbb{U} \cap \mathbb{Z}' = \mathbb{Z}'$  نامتناهی  
 حواسمن باشد که  $\mathbb{Z}'$  برابر است با تهی و مجموعه تهی صفر عضو دارد و نامتناهی است.

- ۸۳- **گزینه**  $A$  شامل تمام اعداد صحیح صفر،  $\pm 3, \pm 6, \pm 9, \dots$  و ... است و در  $B$  اعداد صحیح بین  $-99$  تا  $99$  را داریم. پس  $A \cap B$  شامل اعداد صحیح مضرب ۳ بین  $-99$  تا  $99$  است که تعدادشان محدود می‌شود (۶۷ هستند).

- در بررسی گزینه‌ها،  $A \cap B'$  نامتناهی است (مضارب بزرگتر از ۱۰۰ عدد ۳ را دارد)،  $Q' - Q$  نامتناهی است (اعداد صحیح خیلی بزرگ که مضرب ۳ نیستند و در  $A \cap B'$  نیز همین طور است).

- ۸۴- **گزینه**  $A$  نسبت به مجموعه  $B$  قابل تعريف است که  $A \subseteq B$  باشد، که از بین گزینه‌ها فقط  $\mathbb{N}$  چنین است.

- ۸۵- **گزینه** با توجه به  $\{1, 2, 3\}$ ،  $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  و  $B = \{2, 4\}$ ، گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم.  
 $B' - A' = \{1, 3\}$  ✓  
 $A' \cap B' = (A \cup B)' \Rightarrow$  همواره درست است. ✓  
 $A - (A \cap B) = A - B = \{1, 3\}$  ✓  
 $A' \cup B' = \{1, 3, 4, 5\}$  نادرست

- ۸۶- **گزینه**  $U = \{1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9\}$  داریم:  $C = \{5, 9\}$  و  $B = \{3, 6\}$ ،  $A = \{1, 3, 7, 8\}$   
 $B' = \{1, 2, 5, 7, 8, 9\}$  و  $C' = \{1, 2, 3, 6, 7, 8\}$   $\Rightarrow B' \cap C' = \{1, 2, 7, 8\}$

- حالا  $(B' \cap C') \cap A$  را پیدا می‌کنیم:  
 $\{1, 2, 7, 8\} \cap \{1, 3, 7, 8\} = \{1, 7, 8\}$  سه عضو دارد

- ۸۷- **گزینه** اول محدوده اعضای مجموعه  $A$  را پیدا می‌کنیم:  
 $A = \{2x + 3 \mid -1 \leq x < 7\}$   
 $-1 \leq x < 7 \Rightarrow -2 \leq 2x < 14 \Rightarrow 1 \leq 2x + 3 < 17 \Rightarrow A = [1, 17)$

**راه‌افرم** از روابط مجموعه‌ها داریم:


$$(B-A)' - A \xrightarrow{\text{تعريف تفاضل}} = (B \cap A')' \cap A'$$

$$\xrightarrow{\text{دموگان}} = (B' \cup A) \cap A'$$

$$\xrightarrow{\text{پخشی}} = (B' \cap A') \cup (\underbrace{A \cap A'}_{\emptyset}) = B' \cap A'$$


$$\xrightarrow{\text{متتم}} = B \cup A$$

**۸۱- گزینه** نمودار ون دو مجموعه را رسم می‌کنیم:



$A-B$  ناحیه ۱ است، پس  $(A-B)'$  نواحی ۳، ۲ و ۴ است.  $A \cup B$  نواحی ۳ و ۰، ۱ است و  $A'$  ناحیه ۲ و ۴ است، بنابراین اشتراک این‌ها می‌شود ناحیه ۳ که همان  $B-A$  است.


**۸۲- گزینه** طبق نمودار ون،  $A-(A-B) = A \cap B$  است:




پس متمم  $(A \cap B) \cup (A \cap B)'$  را این برابر مجموعه مرجع است.  
می‌خواهیم و جواب می‌شود  $U' = \emptyset$ .

**۸۳- گزینه** از نمودار ون استفاده کنیم:

$$\begin{aligned} & (3, 4) \cup ((2) \cap [(1, 2, 3) \cap (2, 3)]) \\ &= (3, 4) \cup (2 \cap (2, 3)) \\ &= (3, 4) \cup (2) = 1' = (A-B)' \end{aligned}$$



**۸۴- گزینه** گزینه‌ها را یکی‌یکی بررسی می‌کنیم. برای سادگی کار، می‌توانیم از نمودار ون روبه‌رو هم استفاده کنیم. چون دو مجموعه  $A$  و  $B$  جدا از هم، مجموعه مرجع را به ۳ ناحیه جدا از هم افزار می‌کنند.



۱)  $A \subset B' \Rightarrow \{1\} \subset \{1, 3\}$  درست است.

۲)  $A-B' = \emptyset \Rightarrow \{1\} - \{1, 3\} = \emptyset$  درست است.

۳)  $A \cap B' = A \Rightarrow \{1\} \cap \{1, 3\} = \{1\}$  درست است.

۴)  $(A \cup B)' = \emptyset \Rightarrow \{1, 2\}' = \emptyset \neq \emptyset$  نادرست است.

**۸۵- گزینه**

گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:

$$1) B-A' = B \cap (A')'$$

درست است.

۱)  $A-B' = A \cap (B')' = A \cap B = A$  درست است.

۲)  $A \cap B' = A - B = \emptyset$  درست است.

۳)  $B \cap A' = B - A$  دلیلی ندارد تهی باشد.

**۸۶- گزینه** از رابطه  $A' \cap B = A' \cap B' = A'$  داریم:

$$A' \cup B = A' - B$$

پس مجموعه  $B$  این‌طوری است که اگر با آن اجتماع بگیریم یا آن را حذف کنیم، فرقی نمی‌کند؛ پس  $B = \emptyset$ .

در واقع این متمم  $(A-B)$  است که می‌شود:

$$(A-B)' = (A \cap B')' = A' \cup B$$

**۷۷- گزینه**

**راه‌افرم** در شکل مقابل  $A' = \{1, 2, 3, 7, 8\}$  و  $B-A = \{7, 8\}$ ، پس:

$$\begin{aligned} A' \cap (B-A)' &= \{1, 2, 3, 7, 8\} \cap (\{7, 8\})' \\ &= \{1, 2, 3, 7, 8\} \cap \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = \{1, 2, 3\} \end{aligned}$$

**راه‌افرم** اول از قوانین مجموعه استفاده می‌کنیم:


$$A' \cap (B-A)' = A' \cap (B \cap A')' = A' \cap (B' \cup A)$$

$$= A' \cap B' = (A \cup B)'$$

حالا از روی شکل  $(A \cup B)'$  برابر است با:  $\{1, 2, 3\}$ .

**۷۸- گزینه** نمودارهای هر چهار گزینه را رسم می‌کنیم، فقط

حوالستان باشد که در ۲ به جای  $(B \cap C)'$  از  $B' \cup C'$  استفاده کردیم:



**تکه** در مجموعه‌ها داریم:

$$(A \cap B)' = A' \cup B', (A \cup B)' = A' \cap B'$$

گزینه‌های ۳ و ۴ را مثل ۱ و ۲ توضیح ندادیم.



فقط نمودار ۱ با نمودار داده شده، یکسان نیست.

**۷۹- گزینه**  $A \cap B'$  همان  $A-B$  است، پس  $(A-B)-(B-A)$  را می‌خواهیم، چون  $B-A$  و  $A-B$  اشتراک ندارند، تفاضل آن‌ها همان  $A-B$  خواهد بود.

**۸۰- گزینه** **راه‌افرم** اول نمودار ون دو

مجموعه را رسم می‌کنیم:


$B-A$  ناحیه ۳ است؛ پس  $(B-A)'$  نواحی ۱، ۲ و ۴ است؛ حالا  $(B-A)'$  می‌شود

$\{1, 2, 4\} - \{1, 2\} = \{4\}$ ، یعنی ۴.

صورت سؤال متمم این را می‌خواهد، متمم ناحیه ۴ می‌شود نواحی ۱، ۲ و

۳ یعنی  $A \cup B$ .

**راهنمای** نمودار ون را ببینید:



$A' \cap B'$  نواحی ۲، ۳ و ۴ و مجموعه'  $A' \cap B'$  ناحیه ۴ است. این‌ها مساوی شده‌اند؛ پس ۲ و ۳ وجود نداشته؛ یعنی  $B = \emptyset$ .

و در نتیجه  $k \leq 19$ ؛ از این اعضا عدد ۵۵ و ۵۰،  $A$  هستند، پس'  $A'$  دارای شانزده عدد دورقی مضرب ۵ است.

**گزینه ۹۳**

نمودار ون را رسم می‌کنیم: **راه اول** می‌دانیم  $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ ، پس:  
 $30 = 15 + n(B) - 5 \Rightarrow n(B) = 20$

نمودار ون را رسم می‌کنیم: **راه دوم**  $10 + 5 + x = 30 \Rightarrow x = 15$   
 $n(B) = x + 5 = 15 + 5 = 20$

از نمودار ون استفاده می‌کنیم: **گزینه ۹۴**  
 $\left. \begin{array}{l} n(S) = 14 \\ n(T) = 19 \\ n(S \cap T) = 5 \end{array} \right\}$  سروд تناور

$\Rightarrow n(T \cup S) = 14 + 5 + 9 = 28$  عضو حداقل یکی از این‌گروه

نمودار دو مجموعه را رسم می‌کنیم: **گزینه ۹۵**  
 $\left. \begin{array}{l} n(A) = n(B) = 4x \\ 3x + x + 3x = 7x \end{array} \right\}$  تعداد اعضای  $A$  و  $B$ ، برابر است و تعداد اعضای مشترک برابر  $x$  است. پس داریم:  
 $n(A \cup B) = 3x + x + 3x = 7x$

عنی جواب، مضرب ۷ است که در بین گزینه‌ها فقط **F** مناسب است.

وقتی **گزینه ۹۶**  $n(A') = 12$  و  $n(A) = 10$  است، چون  $A$  و  $A'$  هیچ عضو مشترکی ندارند، پس:  
 $n(U) = n(A \cup A') = n(A) + n(A') = 10 + 12 = 22$

پس حالا که  $n(B) = 7$  است، در نتیجه:  
 $n(B') = n(U) - n(B) = 22 - 7 = 15$

نمودار ون دو مجموعه را رسم می‌کنیم: **گزینه ۹۷**  
 $\left. \begin{array}{l} n(A) = 60, n(B) = 40, n(A \cap B) = 20 \\ 40 + 20 + 20 + x = 100 \Rightarrow x = 20 \end{array} \right\}$

حالا تعداد اعضای  $A - B$  برابر است با  $40 - 20 = 20$  و تعداد اعضای  $A' \cap B' = (A \cup B)'$  برابر است با  $20 - 20 = 0$ . پس تعداد اعضای  $A - B$  بیشتر است. تعداد اعضای  $(A \cup B)'$  بیشتر است.

اول فرض می‌کنیم  $n(A \cap B) = x$  و نمودار ون دو مجموعه را رسم می‌کنیم: **گزینه ۹۸**

$n(A) = 2n(B) = 6n(A \cap B) = 6x$

$$\Rightarrow \begin{cases} n(A) = 2x \\ n(B) = x \\ n(A \cap B) = x \end{cases}$$



پس حاصل عبارت داده شده برابر است با:

$$\frac{n(A - B)}{n(B \cap A')} = \frac{n(A - B)}{n(B - A)} = \frac{x}{2x} = \frac{1}{2}$$

تعداد اعضوهای هر قسمت را در **گزینه ۹۹** نمودار ون می‌نویسیم:  
 $n(A \cap B) = n(A) - n(A - B) = 32 - 14 = 18$   
 $n(B - A) = 60 - 32 = 28$

پس نسبت تعداد اعضوهای  $A \cap B$  به  $B - A$  برابر است با:  
 $\frac{n(B - A)}{n(A \cap B)} = \frac{28}{18} = \frac{14}{9} \approx 1/55$

قسمت اول عبارت با توجه به نمودار ون برابر تهی است:  
 $(A \cap B) - B = \emptyset \Rightarrow (\emptyset)' = U$



در قسمت دوم عبارت هم با استفاده از نمودار:  
 $(A \cap B) \cup (A - B) = A$   
پس حاصل عبارت، برابر است با:  
 $U \cap A = A$

باید  $x$  عضو هر دو مجموعه  $B - A$  و  $C \cup D$  باشد، پس  $x \in B - A$  نیست و در حداقل یکی از دو مجموعه  $C$  و  $D$  هم  $x \in C \cup D$  می‌تواند نادرست باشد. در مورد **F** دقت کنید که:  
 $x \in C \cup D \Rightarrow x \notin (C \cup D)' = C' \cap D'$

**گزینه ۹۹** الف) نادرست است، چون مثلاً اگر  $A$  مجموعه اعداد فرد باشد **A'** می‌شود مجموعه اعداد زوج و **A'** هر دو نامتناهی‌اند.  
ب) درست است، چون وقتی **B** متناهی است، یعنی تعداد اعضای **B** مشخص است (باپایان)، پس از آن جا که  $\mathbb{N}$  بی‌شمار اعضو دارد، تعداد اعضای **B'** هم می‌شود بی‌شمار، یعنی **B'** نامتناهی است.  
پ) درست است، چون ممکن است **A** نامتناهی و **A'** متناهی باشد، ولی **B** متناهی است، پس **B'** نامتناهی است و در نتیجه  $A' \cup B'$  به علت نامتناهی بودن **B'**، حتماً نامتناهی است.

**گزینه ۹۰** وقتی هر عضو **B**، عضوی از **A** هست، پس **A** اشتراک دارند. حالا گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:

**۱**  $A \cap B = B, A \cup B' = U \Rightarrow$  اشتراک دارند.

**۲**  $A - B = A \cap B', B' \Rightarrow$  اشتراک دارند.

**۳**  $A', B' \xrightarrow{A' \subset B'} A' \Rightarrow$  اشتراک دارند.

**۴**  $A' \cup B' = (A \cap B)' = B', B \Rightarrow$  اشتراک ندارند.

**گزینه ۹۱** می‌دانیم تعداد زیرمجموعه‌های یک مجموعه  $n$  عضوی برابر است با  $2^n$ ؛ بنابراین:

$$2^{n(A)} = 512 \Rightarrow n(A) = 9 \Rightarrow n(A) = 9$$

$$(B \cup A')' = B' \cap A = A - B$$

$$n(A - B) = n(A) - n(A \cap B) = 9 - 3 = 6 \Rightarrow 2^6 = 64$$

**گزینه ۹۲** اگر  $A_2 = \{4, 5, 6\}$ ،  $A_1 = \{1\}$  و  $A_4 = \{7, 8, 9, 10\}$  توجه کنیم، می‌بینیم که مجموعه  $A_n$  اولاً  $n$  عضو (عدد متولی طبیعی) دارد و ثانیاً بزرگ‌ترین عضوش برابر  $\frac{n(n+1)}{2}$  است،  $A_{10} = \{46, 47, \dots, 55\}$  پس:

بنابراین  $A'_1$  برابر مجموعه اعداد طبیعی است که با اعضای دورقی اش کار داریم. تعداد مضارب دورقی ۵ برابر است با  $18$ ، چون داریم  $10 \leq 5k \leq 95$



کافی است رابطه زیر را بنویسیم:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

و سپس با معادله  $2x + 2y = 2x + 2y + 5 - (x + y - 20)$  داریم:

$$\Rightarrow 2x + y = 40 \Rightarrow \begin{cases} 2x + y = 40 \\ 2x - 2y = 0 \end{cases} \rightarrow 4y = 40$$

$$\Rightarrow y = 10 \Rightarrow x = 15$$

حالا داریم:

$$n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$$

$$= (3x + 10) - (x + y - 20) \xrightarrow[y=10]{} 55 - 5 = 50$$

B' عضوهایی است که در A' هستند و در A نیستند. پس عضوهایی را می‌خواهیم که نه در A و نه در B باشند که تعداد آنها  $x + 10$  است. بنابراین:

$$n(A' - B) = n(A' \cap B') = 3x + 10 = 10 \Rightarrow x = 3$$

حالا  $x = 3$  را قرار دهیم:

بنابراین تعداد عضوهایی که به حداقل یکی از دو مجموعه تعلق دارند، یعنی  $n(A \cup B)$  برابر است با:

$$n(A \cup B) = 2 + 6 + 7 = 15$$

نمودار ون دو مجموعه را رسم می‌کنیم:

$$A \quad B$$

$$n(A - B) = 3, n(B - A) = 7$$

$$n(B) = 2n(A) \Rightarrow 7 + x = 2(3 + x) \Rightarrow x = 1$$

نمودار ون دو مجموعه را رسم می‌کنیم: بس  $A - B$  دارای ۳ و  $B - A$  دارای ۴ عضو است. حالا خواسته سؤال:  $(A \cap B') \cup (A \cup B')$

$$= (A - B) \cup (A' \cap B) = (A - B) \cup (B - A)$$

$$\text{B-A}$$

$$= 5 \text{ عضو}$$

که با توجه به شکل،  $3 + 4 = 7$  عضو دارد.

مهمنهای ساره، هم‌کلاسی‌های مدرسه یا زبان هستند، پس  $n(A \cup B) = 47$  و  $n(A) = 24$ ، پس داریم:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$47 = 24 + n(B) - n(A \cap B) \Rightarrow n(B) - n(A \cap B) = 23$$


$$\Rightarrow n(B) = n(A \cap B) + 23$$

پس تعداد هم‌کلاسی‌های زبان حداقل ۲۳ نفر است. از طرف دیگر چون تعداد هم‌کلاسی‌های مدرسه ۲۴ نفر بود، تعداد مهمانهای مشترک یعنی  $n(A \cap B)$  نمی‌تواند بیشتر از ۲۴ باشد. پس  $n(B) = 24 + 23 = 47$  حداکثر برابر است با:

یعنی تعداد هم‌کلاسی‌های زبان حتماً در فاصله  $[23, 47]$  است.

اگر مجموعه کسانی را که به بستنی علاقه دارند با A و مجموعه آن‌هایی را که به آمیخته علاقه دارند B بنامیم، نمودار ون دو مجموعه A و B به صورت رویه‌رو است:

حالا برای این که تعداد کسانی که به هیچ کدام علاقه ندارند حداکثر شود باید  $28 - x = 0$  را پیدا کنیم، حداکثر X با توجه به این که باید  $28 - x \geq 0$  باشد.




اول نمودار ون دو مجموعه را رسم می‌کنیم:

عضو در ناحیه مشترک آن دو مجموعه است:  $14 - 5 = 9$

عضو فقط در A قرار دارند و  $17 - 5 = 12$

عضو فقط در B هستند:  $21 = 9 + 12$

بنابراین  $9 + 12 = 21$  عضو فقط در یکی از دو مجموعه هستند.



نمودار ون دو مجموعه A و B را رسم می‌کنیم:

$$n(A - B) + n(B - A) = 70 - 32 + 57 - 32 = 63$$

اگر فرض کنیم A مجموعه فیلم‌های پویانمایی و B مجموعه فیلم‌های طنز است. طبق داده‌های سؤال داریم:

$$n(A \cap B) = 3, n(B) = 8, n(A) = 7$$

حالا نمودار ون دو مجموعه را رسم می‌کنیم:

$$4 + 3 + 5 + x = 21 \Rightarrow x = 9$$

تعداد فیلم‌های پویانمایی یا غیرطنز می‌شود:  $n(A \cup B)' = 16$  که طبق شکل برابر است با:

$$7 + x = 7 + 9 = 16$$

افرادی که در گروه ورزش هستند را با A و آن‌هایی که در گروه روزنامنگاری اند را با B نشان می‌دهیم. ۹ نفر فقط در گروه ورزش اند، بنابراین  $n(A - B) = 9$ . از طرفی و بنا به اطلاعات داده شده،  $n(B) = 12$ ،  $n(A) = 16$  می‌خواهیم  $n(A' \cap B')$  را به دست آوریم، داریم:

$$n(A - B) = 9 \Rightarrow n(A) - n(A \cap B) = 9$$

$$\Rightarrow 16 - n(A \cap B) = 9 \Rightarrow n(A \cap B) = 7$$

$$A \quad B$$

$$n(A' \cap B') = \text{کل} - n(A \cup B)$$

$$= \text{کل} - n(A) - n(B) + n(A \cap B)$$

$$= 39 - 16 - 12 + 7 = 18$$

اعضای گروه آزمایشگاهی را با A و اعضای گروه فوتیال را با B نشان می‌دهیم. می‌خواهیم  $n(A' \cap B')$  را پیدا کنیم، می‌دانیم که:

$$n(A' \cap B') = n(S) - n(A) - n(B) + n(A \cap B)$$

$$n(A' \cap B') = 42 - 15 - 12 + 7 = 22$$

نمودار ون دو مجموعه را رسم می‌کنیم، داریم:

$$F \quad U$$

$$n(F) = 15, n(B) = 11, n(U) = 25$$

$$n(F \cup B)' = 5$$

$$15 - x + x + 11 - x + 5 = 25 \Rightarrow x = 6$$

اگر شب را با A و درون شهر را با B نشان دهیم، داریم:

$$n(A) = 70, n(B') = 61 \Rightarrow n(B) = n(U) - n(B')$$

$$= 104 - 61 = 43$$


حالا به  $n(A \cup B)$  دقت کنید:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 70 + 43 - x = 113 - x$$

این تعداد جرم‌هایی است که در شب یا درون شهر انجام شده و باید از  $104$  بیشتر نباشد:  $113 - x \leq 104 \Rightarrow x \geq 9$

یعنی تعداد جرم‌های درون شهر و در شب (مشترک A و B) حداقل ۹ است.

این طوری به موضوع نگاه کنید که شرط  $B$ , کمتر از ۳ را می‌پذیرد و در  $A$  فقط عضو ۱ این شرط را دارد، پس  $A \cap B$  وقتی جدا از هم هستند که در  $B$  عدد ۱ نباشد، پس مرجع  $B$  یعنی  $U$  شامل ۱ نیست.



**118- گزینه:** اگر  $A$  و  $B$  به ترتیب مجموعه مضارب ۲ و مضارب ۳ باشند، تعداد عضوهای  $A \cup B$  را می‌خواهیم:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$= n(\text{مضارب } 2, 3) - n(\text{مضارب } 2 \cap \text{مضارب } 3)$$

تعداد عضوهای  $A$  یعنی تعداد مضارب ۲ در بین اعداد ۱ تا ۱۰۰ برابر است با:  $n(A) = 50$


تعداد عضوهای  $B$  یعنی تعداد مضارب ۳ برابر است با:  $A = \{2, 4, 6, \dots, 100\}$

مجموعه‌های  $A$  و  $B$  را بینید:  $B = \{3, 6, 9, \dots, 99\}$

اعضای مشترک  $A$  و  $B$ , اعداد مضرب ۶ هستند. تعداد آنها برابر است با:  $A \cap B = \{6, 12, 18, \dots, 96\} \Rightarrow n(A \cap B) = 16$


$$n(A \cup B) = 50 + 33 - 16 = 67$$

پس داریم:



و  $x \geq 32$  باشد برابر است با  $28$ , پس حداقل  $x - 10 = 18$  برابر است با  $28 - 10 = 18$ . توجه کنید که وضعیت دو مجموعه  $A$  و  $B$  با توجه به اعداد به دست آمده به صورت رویه‌رو است:

**113- گزینه:**  $A - B$  یعنی عضوهای از  $A$  که در  $B$  نباشند. برای این که تعداد عضوهای  $A - B$  حداکثر شود باید تا حد امکان  $A$  و  $B$  کمترین اشتراک را داشته باشند. اگر تعداد عضوهای مشترک را  $x$  بگیریم، داریم:



$$17 - x + x + 12 - x \leq 22$$


$$\Rightarrow 29 - x \leq 22 \Rightarrow x \geq 7$$

یعنی حداقل ۷ عضو مشترک لازم است؛ پس حداقل  $A - B$  ۱۰ عضو دارد.

**114- گزینه:** اجتماع دو مجموعه در حالت اول  $36 + 28 - 15 = 49$  عضو دارد. حالا  $16$  عضو از  $A$  کم شده که تا آن‌ها از اشتراک حذف شده‌اند.  $36 - 16 = 20$  عضو است و اشتراک جدید هم  $15 - 9 = 6$  عضو دارد. مجموعه  $B$  هم که به انداره تعداد کم شده از اشتراک  $A$  و  $B$  یعنی ۹ عضو، از دست می‌دهد، یعنی تعداد اعضای  $B$  برابر  $19$  تاست، پس تعداد اعضای اجتماع مجموعه  $A$  جدید با  $B$  برابر است با:  $20 + 19 - 6 = 33$

**115- گزینه:** به نمودار دقت کنید: پس در ناحیه وسط یعنی  $A \cap B$  باید  $40 - 12 - 18 = 10$  عضو باشد.

حالا از هر یک از مجموعه‌های  $A$  و  $B$  ته عضو برداشته شده و از اشتراک آن‌ها کم شده است. پس از قسمت غیرمشترک هر کدام ۵تا کم می‌شود.



اجتمای دو مجموعه اولیه  $40$  تا عضو دارد. ما  $9 + 9 = 18$  یعنی  $26$  تا را برداشته‌ایم که  $4$  تاییش مشترک بوده، پس  $40 + 4 = 44$  یعنی  $26$  تا می‌ماند.

**116- گزینه:** نمودار ون سه مجموعه را رسم می‌کنیم و برای پرکردن ناحیه‌ها از اشتراک هر سه مجموعه شروع می‌کنیم: برای پیدا کردن تعداد بیمارانی که فقط بیماری  $C$  را دارند باید  $X$  را پیدا کنیم، پس:

$$30 + 50 + 50 + 30 + 40 + 160 + X = 400 \Rightarrow 360 + X = 400 \Rightarrow X = 40$$

**117- گزینه:** باید به ازای هر کدام از گزینه‌ها مجموعه  $A = \{1, 4, 7\}$   $B = \{x \in U \mid x < 3\}$  را پیدا کنیم و بینیم آیا  $B$  و  $A$  جدا از هم هستند یا نه.

۱  $\mathbb{Q}' \Rightarrow B = \{x \in \mathbb{Q}' \mid x < 3\} \Rightarrow$  چون اعضای  $B$  همگی گنگ هستند  $A$  و  $B$  جدا از هم‌اند.

۲  $\mathbb{Z} - \mathbb{W} \Rightarrow B = \{x \in \mathbb{Z} - \mathbb{W} \mid x < 3\} = \{-1, -2, -3, \dots\} \Rightarrow$  جدا از هم‌اند.

۳  $\mathbb{Q} - \mathbb{Z} \Rightarrow B = \{x \in \mathbb{Q} - \mathbb{Z} \mid x < 3\}$   $B$  شامل اعداد گویای غیرصحیح کوچک‌تر از ۳ است، پس  $A$  و  $B$  عضو مشترکی ندارند. با این حساب جواب ۴ است، اما بگذارید ۴ را هم بررسی کنیم:

۴  $\mathbb{Z} \cap \mathbb{N} \Rightarrow B = \{x \in \overline{\mathbb{Z} \cap \mathbb{N}} \mid x < 3\} = \{2, 1\}$   $A$  و  $B$  عضو مشترک ۱ دارند و جدا از هم نیستند.