

فهرست

■ فصل اول

کیهان زادگاه الفبای هستی

۹

■ فصل دوم

ردپای گارها در زندگی

۸۷

■ فصل سوم

آب، آهنج زندگی

۱۶۷

■ ضمائم

ترکیبات و ساختار لغویس

۲۴۵

واکنش‌ها

۲۵۱

عناصر

۲۵۴

ترکیبات یونی

۲۵۸



کیهان زادگاه الفبای هستی درس نامه

| نام و نماد شیمیایی آنیون | | نام و نماد شیمیایی کاتیون | |
|--------------------------|------------|---------------------------|--------------|
| Br^- | یون برمید | Li^+ | یون لیتیم |
| I^- | یون یدید | K^+ | یون پتاسیم |
| N^{3-} | یون نیترید | Mg^{2+} | یون منیزیم |
| S^{2-} | یون سولفید | Ca^{2+} | یون کلسیم |
| F^- | یون فلورید | Al^{3+} | یون آلومینیم |

☞ **فرمول نویسی ترکیب‌های یونی دوتایی:** هر ترکیب یونی به لحاظ الکتریکی خنثی است؛ زیرا مجموع بار الکتریکی کاتیون‌ها با مجموع بار الکتریکی آنیون‌ها برابر است.

در این قسمت ما فقط نام‌گذاری ترکیب‌های یونی دوتایی را بررسی می‌کنیم. ترکیب‌های یونی که تنها از دو عنصر (نه دو اتم!!!) ساخته شده‌اند، ترکیب یونی دوتایی نامیده می‌شوند.


ترکیب‌های یونی دوتایی، از دو عنصر به وجود آمده‌اند ولی تعداد یون‌های موجود در آن‌ها می‌تواند هر عددی برابر و یا بزرگ‌تر از ۲ باشد. Al_2O_3 یک ترکیب یونی دوتایی است. چون از دو نوع عنصر درست شده است، ولی ۵ یون دارد.

با توجه به این‌که ترکیب‌های یونی به لحاظ الکتریکی خنثی هستند، تعداد آنیون و کاتیون طوری در نظر گرفته می‌شود تا مجموع بار کاتیون‌ها با مجموع بار آنیون‌ها برابر شود.



به عبارت دیگر، بار کاتیون را به عنوان زیروند آنیون و بار آنیون را به عنوان زیروند کاتیون قرار می‌دهیم (البته علامت $\text{Al}_{\text{Z}}^{3+}\text{O}_{\text{X}}^{2-}$ $\rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$) منفی و مثبت را در نظر نمی‌گیریم).



نکته قبل از این‌که مطابق گفته‌های بالا، جایه‌جایی بار با زیروند را انجام دهید، تا حد امکان بار کاتیون و



برای درک بهتر چگونگی تشکیل ترکیب‌های یونی دوتایی، آرایش الکترون- نقطه‌ای برخی از آن‌ها را در ادامه مشاهده می‌کنید.



نام‌گذاری ترکیب‌های یونی دوتایی: برای این کار کافی است، ابتدا نام

کاتیون و سپس نام آنیون را بدون ذکر کلمه یون بنویسیم.

آلومینیم اکسید:

سدیم کلرید:

کلسیم فلوراید:

پتاسیم فسفید:

| نام ترکیب یونی | نماد یون‌های سازنده | فرمول شیمیایی |
|----------------|---------------------------------|-----------------------|
| منیزیم اکسید | $\text{O}^{-}, \text{Mg}^{++}$ | MgO |
| کلسیم کلرید | $\text{Cl}^{-}, \text{Ca}^{++}$ | CaCl_2 |
| پتاسیم اکسید | $\text{K}^{+}, \text{O}^{-}$ | K_2O |
| سدیم فسفید | $\text{Na}^{+}, \text{P}^{--}$ | Na_3P |
| لیتیم برمید | $\text{Li}^{+}, \text{Br}^{-}$ | LiBr |

تبديل اتم‌ها به مولکول‌ها

بسیاری از ترکیب‌های شیمیایی در ساختار خود هیچ یونی ندارند و ذره‌های سازنده آن‌ها مولکول‌ها هستند. در مولکول‌ها به جای این که الکترون دادوستد شود، به اشتراک گذاشته می‌شود. به این دسته از ترکیب‌های شیمیایی، ترکیب مولکولی گفته می‌شود.

ساختار لووپیس: یکی از بهترین روش‌ها برای نمایش ساختار مولکول‌ها، استفاده از ساختار لووپیس است.

هدف از تشکیل شدن مولکول‌ها، رسیدن اتم‌ها به آرایش پایدار گازی نجیب است.


اتم کلر در آرایش الکترون - نقطه‌ای خود یک الکترون جفت‌نشده دارد. Cl_2 گاز زردرنگ که خاصیت رنگ‌بری و گندزدایی دارد، از مولکول‌های دواتمی تشکیل شده است که در آن هر اتم کلر از طریق اشتراک گذاشتن حفت‌نشده، به اتم کلر دیگر متصل است.




جفتالکترون اشتراکی میان دو اتم کلر در مولکول Cl_2 که متعلق به هر دو اتم کلر می‌باشد، نشان‌دهنده یک پیوند اشتراکی (کووالانسی) است. این پیوند باعث اتصال دو اتم که اغلب نافلز هستند به یکدیگر می‌شود.




نکته همان طور که مشاهده می‌کنید اتم H با اشتراک گذاشتن الکترون جفت نشده خود به آرایش هشت‌تایی نمی‌رسد بلکه در حقیقت دو تایی شده و آرایش گاز نجیب هلیم را پیدا می‌کند.



نکته برخی از اتم‌ها برای رسیدن به آرایش هشت‌تایی، می‌توانند با خود یا اتم‌های دیگر بیش از یک جفت الکترون به اشتراک بگذارند و تشکیل پیوندهای دوگانه یا سه‌گانه دهند.



به ساختار لوویس گونه‌های زیر، خوب توجه کنید:




نکته در رسم ساختار لوویس، هر خط معادل یک پیوند اشتراکی یعنی ۲ الکترون می‌باشد. بنابراین پیوند دوگانه ($=$) معادل ۴ الکترون و سه‌گانه (\equiv) ۶ الکترون می‌باشند.

فرمول مولکولی: به فرمول شیمیایی که افزون بر نوع عنصرهای سازنده، شمار اتم‌های هر عنصر را نشان می‌دهد، فرمول مولکولی می‌گویند. مثلاً فرمول مولکولی آب، H_2O است.

کیهان زادگاه الفبای هستی درس نامه

مدل فضایپرکن: روش فضایپرکن، نوع دیگری از نمایش مولکول‌ها است که در آن، اتم‌ها به صورت گوی‌هایی کروی‌شکل، نشان داده می‌شوند. در این نوع نمایش، علاوه بر نوع عنصرها و شمار اتم‌های هر عنصر، نحوه قرارگیری اتم‌ها نسبت به هم نیز مشخص می‌شود.



عبارت‌های مفهومی

﴿ درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید. ﴾

- ۱- فراوان ترین عنصر سیاره مشتری، نخستین عنصر به وجود آمده پس از مهبانگ است.
- ۲- فراوان ترین عنصر سیاره زمین، عنصری است که در ۸ عنصر فراوان سیاره مشتری یافت نمی‌شود.
- ۳- سحابی مجموعه‌ای متراکم از گازها با دمای بسیار بالاست که یکی از مکان‌های زایش سیاره‌ها می‌باشد.
- ۴- در تمام ایزوتوب‌های یک عنصر، $A - Z$ برابر است.
- ۵- اگر دو گونه X_a^m و Y_{q+2}^{m+3} ایزوتوب یکدیگر باشند، اختلاف نوترон‌های $X - Y$ برابر $b - m - 3$ است.
- ۶- در یک نمونه طبیعی از هیدروژن، ۷ ایزوتوب مختلف وجود دارد.
- ۷- در بین رادیوایزوتوب‌های هیدروژن، H_3 از همه پایدارتر است.
- ۸- پایدارترین ایزوتوب ساختگی هیدروژن، H_4 است.
- ۹- ایزوتوب‌های پرتوزا، بر اثر تلاشی افزون بر ذره‌های پرانرژی، مقدار زیادی آرژی آزاد می‌کنند.
- ۱۰- حدود ۷۸٪ از عناصر شناخته شده، در طبیعت یافت می‌شوند.
- ۱۱- بیشتر Tc^{99} موجود در جهان، به طور مصنوعی و در آزمایشگاه ساخته شده است.
- ۱۲- اندازه یون یدید و اتم Tc^{99}_{43} تقریباً برابر است.
- ۱۳- به گلوکزی که همه اتم‌های آن پرتوزا شده باشند، گلوکز نشان‌دار می‌گویند.
- ۱۴- خواص شیمیایی عنصرهایی که در یک دوره از جدول تناوبی قرار دارند، با یکدیگر مشابه است.

کیهان زادگاه الفبای هستی عبارت نامه

- ۱۵- جدول تناوبی شامل ۷ دوره و ۱۸ گروه است که کوچک‌ترین دوره و گروه آن به ترتیب ۲ و ۴ عنصر دارند.
- ۱۶- $\frac{1}{12}$ amu، معادل $\frac{1}{12}$ عدد جرمی ایزوتوپ کربن-۱۲ است.
- ۱۷- ترتیب دقیق جرم ذرات زیراتمی به صورت $e > p > n > p$ است.
- ۱۸- در جدول دوره‌ای، عدد جرمی به عنوان جرم عنصرها نمایش داده می‌شود.
- ۱۹- دانشمندان با استفاده از دستگاهی به نام طیف‌سنج جرمی، جرم اتم‌ها را به طور تقریبی اندازه‌گیری می‌کنند.
- ۲۰- پرآرژی ترین نور مرئی، نور بنفس و کم‌ترین طول موج امواج الکترومغناطیسی، پرتو گاما است.
- ۲۱- رنگ‌های نشرشده از هر عنصر، فقط بازیکه کوتاهی از گستره طیف مرئی را در بر می‌گیرد.
- ۲۲- نور لامپ بزرگراه‌ها، به دلیل وجود بخار لیتیم در آن‌ها است.
- ۲۳- گسیل پرتوهای الکترومغناطیسی، پس از جذب انرژی توسط عنصرها را نشر می‌گویند.
- ۲۴- همه نمک‌ها، مانند سدیم نیترات شعله رنگی ایجاد می‌کنند.
- ۲۵- در گستره امواج الکترومغناطیسی، تعداد خطوط رنگی تشکیل شده در طیف نشری خطی اتم لیتیم با هیدروژن برابر است.
- ۲۶- طیف نشری خطی دو عنصر لیتیم و هیدروژن دقیقاً شبیه به هم است.
- ۲۷- طیف نشری خطی، فقط برای عناصر فلزی قابل بررسی است.
- ۲۸- مدل اتمی بور، توانست طیف نشری خطی اتم هیدروژن را توجیه کند و برای اتم‌های سایر عناصر، توجیهی ارائه نکرد.
- ۲۹- احتمال حضور الکترون در همه فضای اطراف هسته اتم یکسان نیست.
- ۳۰- انرژی در نگاه ماکروسکوپی گسترشته و در نگاه میکروسکوپی پیوسته است.



- ۳۱- هر چه الکترون از هسته دورتر باشد، پایداری بیشتری دارد.
- ۳۲- هر نوار رنگی در طیف نشری خطی عنصرها، نشان‌دهنده انرژی جذب شده هنگام انتقال الکترون به یکی از لایه‌های بالاتر با انرژی معین است.
- ۳۳- با افزایش فاصله از هسته اتم، اختلاف انرژی بین لایه‌ها و سطح انرژی آن‌ها کاهش می‌یابد.
- ۳۴- در یک لایه الکترونی، حداکثر تعداد زیرلایه‌ها و حداکثر گنجایش الکترونی به ترتیب از رابطه n^2 و $2n^2$ به دست می‌آید.
- ۳۵- طبق قاعدة آفبا، زیرلایه‌ای که زودتر پر می‌شود انرژی بیشتری هم دارد.
- ۳۶- در اتم‌های دوره سوم جدول دوره‌ای، زیرلایه‌های $2s$ ، $2p$ و $3d$ الکترون می‌گیرند.
- ۳۷- ترتیب پرشدن زیرلایه‌ها، تنها به عدد کوانتومی اصلی (n) وابسته است.
- ۳۸- اتم $^{33}_{\text{As}}$ دارای ۱۳ الکترون با $n+1=5$ است.
- ۳۹- آرایش الکترونی فشرده $^{24}_{\text{Cr}}$ و $^{25}_{\text{Mn}}$ مشابه یکدیگر هستند.
- ۴۰- در ۲ اتم از عنصرهای دوره چهارم، زیرلایه $3d$ نیمه‌پر و در ۸ اتم کاملاً پر است.
- ۴۱- مجموع عدهای کوانتومی اصلی و فرعی الکترون‌های بیرونی ترین لایه الکترونی $^{22}_{\text{Ge}}$ ، برابر ۹ است.
- ۴۲- تعداد الکترون‌های ظرفیتی $^{44}_{\text{Si}}$ با $^{22}_{\text{Ti}}$ برابر است و آن‌ها به یک گروه جدول دوره‌ای تعلق ندارند.
- ۴۳- شمار الکترون‌های ظرفیتی در عنصر $^{32}_{\text{Ge}}$ ، $\frac{1}{2}$ برابر شمار زیرلایه‌های الکترونی اشغال شده در آن است.
- ۴۴- اگر عنصری دارای ۱۷ الکترون با عدد کوانتومی $1=1$ باشد، این عنصر در دوره چهارم و گروه ۱۷ جدول قرار گرفته است.

کیهان زادگاه الفبای هستی تست

- ۴۵- حداقل تعداد الکترون ظرفیت در عناصر دسته p، ۳ است.
- ۴۶- آرایش الکترون - نقطه‌ای اتمی که در زیرلایه ۱ = ۱ در آخرین لایه الکترونی خود ۶ الکtron دارد به صورت است.
- ۴۷- نسبت شمار کاتیون به آئیون در ترکیب منیزیم کلرید برابر ۲ است.
- ۴۸- در آرایش الکترون - نقطه‌ای هر اتم، الکترون‌های آخرین زیرلایه را به صورت نقطه کنار نماد شیمیایی عنصر نمایش می‌دهیم.
- ۴۹- آرایش الکترونی $\text{Ar} [3d^1 4s^2] X$: متعلق به یک عنصر دسته d است که می‌تواند یونی با آرایش هشت‌تایی پایدار تشکیل دهد.
- ۵۰- در مولکول CH_4 همه اتم‌ها به آرایش هشت‌تایی پایدار رسیده‌اند.

پرسش‌های تستی

- ۱- با توجه به روند تشکیل عنصرها در ستارگان، از به هم پیوستن حداقل چند اتم از فراوان‌ترین ایزوتوپ هلیم، یک اتم ایزوتوپ $^{24}_{12}\text{Mg}$ ، می‌تواند به وجود آید؟ (از تبادل انرژی و تعییرات اندک جرم صرف نظر شود).
- (سراسری ریاضی خارج از کشور ۹۸)

۱) ۱ (۲) ۴ (۳) ۸ (۴) ۱۲

- ۲- چند مورد از مطالب زیر، درباره $^{93}_{43}\text{Tc}$ درست‌اند؟

(سراسری تجربی خارج از کشور ۹۸)

- در تصویربرداری از غده تیروئید، کاربرد دارد.
- نخستین عنصری است که در واکنشگاه هسته‌ای ساخته شد.
- اندازه یون آن درست به اندازه یون یدید است و در تیروئید جذب می‌شود.
- زمان ماندگاری آن اندک است و نمی‌توان مقدار زیادی از آن را تولید و انبار کرد.

۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴



پاسخ عبارت‌های مفهومی

۱- درست فراوان‌ترین عنصر سیاره مشتری، هیدروژن است که اولین عنصر به وجود آمده پس از مهبانگ هم می‌باشد.

۲- درست فراوان‌ترین عنصر سیاره زمین، آهن است که یک عنصر فلزی است. سیاره مشتری در بین ۸ عنصر فراوان خود فاقد عنصرهای فلزی می‌باشد.

۳- نادرست سحابی یکی از مکان‌های زایش ستاره‌ها است نه سیاره‌ها!!

۴- نادرست عبارت A-Z (عدد اتمی - عدد جرمی) همان تعداد نوترون است که در ایزوتوپ‌ها، مقدار آن متغیر است.

۵- درست از آنجایی که دو ذره ایزوتوپ یکدیگر هستند؛ بنابراین تفاوت بین نوترون آن‌ها با تفاوت بین عدد جرمی آن‌ها برابر است.

۶- نادرست $X - Y = b - (m + ۳)$ اختلاف نوترون‌های

هیدروژن به طور کلی ۷ ایزوتوپ دارد.

۳ عدد از آن‌ها در طبیعت یافت می‌شوند.

۴ عدد از آن‌ها ساختگی هستند.

۷- درست H^1, H^2, H^3, H^4, H^5 و H^7 رادیوایزوتوپ‌های اتم هیدروژن

هستند که در بین آن‌ها H^3 با اختلاف زیاد، بیشترین نیم عمر را داشته (۱۲/۳۲ سال) و از بقیه رادیوایزوتوپ‌ها پایدارتر است.

۸- نادرست H^1, H^2, H^3 و H^7 ایزوتوپ‌های ساختگی هیدروژن

هستند که در بین آن‌ها H^1 به دلیل داشتن بیشترین نیم عمر، از بقیه پایدارتر است.

ترکیبات و ساختار لوویس


| نام گونه | فرمول شیمیایی | ساختار لوویس |
|--|-------------------------|---|
| — | NO^+ | $[\cdot\text{N}\equiv\text{O}\cdot]^+$ |
| — | NO_2^+ | $[\ddot{\text{O}}=\text{N}=\ddot{\text{O}}]^+$ |
| نیترات | NO_3^- | $[\ddot{\text{O}}\text{---}\overset{\cdot\cdot\text{O}:}{\underset{\ddot{\text{O}}\text{---N---}\ddot{\text{O}}}{\text{N}}]^-$ |
| آلومینیم اکسید | Al_2O_3 | — |
| کلسیم اکسید (آهک) | CaO | — |
| کربن مونواکسید | CO | $\cdot\text{C}\equiv\text{O}\cdot$ |
| توضیحات از CO_2 ناپایدارتر است. گازی بی بو، بی رنگ و سیار سمی است. چگالی کمتر از هوا و قابلیت انتشار بسیار بالایی دارد. میل ترکیبی هموگلوبین با آن بیش از ۲۰۰ برابر O_2 است. | | |
| کربن دی اکسید | CO_2 | $\ddot{\text{O}}=\text{C}=\ddot{\text{O}}$ |
| توضیحات مهم‌ترین گاز گلخانه‌ای است. | | |
| کربنات | CO_3^{2-} | $[\ddot{\text{O}}\text{---}\overset{\cdot\cdot\text{O}:}{\underset{\ddot{\text{O}}\text{---C---}\ddot{\text{O}}}{\text{C}}]^{2-}$ |
| — | CH_3O | $\begin{array}{c} \cdot\cdot\text{O}: \\ \\ \text{H---C---H} \end{array}$ |



ضمائمه واکنشها

واکنشها

واکنش



توضیحات سوختن کربن مونو اکسید



توضیحات سوختن گوگرد



توضیحات سوختن سدیم




توضیحات سوختن منیزیم



توضیحات سوختن کربن




توضیحات کاتالیزگر



توضیحات سوختن متان



توضیحات سوختن اتانول



عناصر

| عنصر | نام عنصر | ساختار الکترون - نقطه و آرایش الکترونی |
|------|----------|---|
| H | هیدروژن | $\begin{matrix} \text{H} \\ \\ \text{H}: 1s^1 \end{matrix}$ |

توضیحات

- فراوان‌ترین عنصر جهان و ساده‌ترین اتم است.
- بیشترین درصد فراوانی را در سیاره مشتری دارد.
- در طیف نشری به دست آمده از آن، ۴ خط یا نوار رنگی وجود دارد.
- در نمونه طبیعی به دست آمده از آن سه ایزوتوپ وجود دارد که در میان آن‌ها فقط یک ایزوتوپ ناپایدار است.

| | | |
|----|------|---|
| He | هلیم | $\begin{matrix} \text{He} \\ \\ \text{He}: 1s^2 \end{matrix}$ |
|----|------|---|

توضیحات

- سبک‌ترین گاز نجیب است. بی‌رنگ، بی‌بو است و تمایلی به انجم و اکنش شیمیایی ندارد.
- برای پرکردن بالنهای هواشناسی، تغیری و تبلیغاتی استفاده می‌شود. هم‌چنین در جوشکاری، کپسول غواصی، مهم‌تر از همه خنک‌کردن قطعات الکترونیکی در دستگاه تصویربرداری MRI کاربرد دارد.
- درصد حجمی از گاز طبیعی را تشکیل می‌دهد.
- علاوه بر هوای مایع از تقطیر جزء‌به‌جزء گاز طبیعی هم به دست می‌آید.

| | | |
|---|---------|--|
| N | نیتروژن | $\begin{matrix} \cdot\ddot{\text{N}}\cdot \\ \\ \text{N}: 1s^2 2s^2 2p^3 \end{matrix}$ |
|---|---------|--|

توضیحات

- به شکل دوatomی (N_2) بیشترین درصد فراوانی را در هوای دارد.
- در بسته‌بندی مواد غذایی، پرکردن تایر خودرو، انجماد مواد غذایی، نگهداری نمونه‌های بیولوژیک در پزشکی کاربرد دارد.

ترکیبات یونی

| نام ترکیب | فرمول شیمیایی |
|---|------------------------------|
| آمونیوم سولفات | $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ |
| مس (II) نیترات | $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ |
| مس (II) کلرید | CuCl_2 |
| مس (II) سولفات | CuSO_4 |
| سدیم نیترات | NaNO_3 |
| سدیم کلرید | NaCl |
| توضیحات نمودار انحلال پذیری آن بر حسب دما تقریباً افقی است. | |
| سدیم سولفات | Na_2SO_4 |
| لیتیم نیترات | LiNO_3 |
| توضیحات نمودار انحلال پذیری آن در آب بر حسب دما صعودی است. | |
| آلومینیم اکسید | Al_2O_3 |
| کلسیم اکسید (آهک) | CaO |
| توضیحات برای افزایش بهره‌وری کشاورزی و کنترل میزان اسیدی بودن آب در یاچه استفاده می‌شود. | |
| لیتیم کلرید | LiCl |
| لیتیم سولفات | Li_2SO_4 |
| توضیحات نمودار انحلال پذیری آن بر حسب دما نزولی است. | |
| نقره کلرید | AgCl |