

فهرست



۷

۲۲

فصل اول: ترسیم‌های هندسی و استدلال

پاسخ‌نامه فصل اول

۲۶

۴۲

فصل دوم: قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن

پاسخ‌نامه فصل دوم



۴۹

۵۲

آزمون‌های نیم‌سال اول

پاسخ‌نامه آزمون‌های نیم‌سال اول



۵۸

۷۸

فصل سوم: چندضلعی‌ها

پاسخ‌نامه فصل سوم

۹۴

۱۰۶

فصل چهارم: تجسم فضایی

پاسخ‌نامه فصل چهارم



۱۱۲

۱۱۹

آزمون‌های نیم‌سال دوم

پاسخ‌نامه آزمون‌های نیم‌سال دوم




ترسیم‌های هندسی

در درس اول از فصل یک، ترسیم‌های هندسی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این بحث، ابتدا چند ویژگی مهم را در ترسیم‌های هندسی، مثل نقاطی که فاصله آن‌ها از یک نقطه یا یک خط مقدار ثابتی است، بیان نموده، سپس روش رسم نیمساز، عمودمنصف، مثلث، چندضلعی‌های خاص و ... را مطالعه می‌کنیم.

یکی از مهم‌ترین مسائل مقدماتی در ترسیم، پیدا کردن مجموعه نقاطی است که از یک نقطه ثابت مثل O ، به فاصله ثابت و مشخصی باشند. مطابق شکل روبه‌رو تعدادی نقطه در نظر گرفته شده که از نقطه O به فاصله معلوم r واحد قرار دارند. با کمی دقت متوجه می‌شویم چون نقطه O ثابت و همچنین فاصله نقاط مورد نظر از O نیز ثابت و معلوم است، پس مجموعه نقاط مورد بحث روی دایره‌ای به مرکز O و شعاع r قرار می‌گیرند.

نتیجه مهم مجموعه نقاطی از صفحه که از نقطه ثابت O به فاصله ثابت R هستند، مشخص‌کننده دایره‌ای مثل C به مرکز O و شعاع R خواهند بود. این دایره را معمولاً با نماد \odot نشان می‌دهیم. (شما عزیزان در کتاب هندسه یازدهم، به طور عمیق با مبحث دایره آشنا می‌شوید.)

یادآوری فاصله یک نقطه مثل A از یک خط، برابر است با طول عمودی که از نقطه A بر خط d اخراج می‌شود. می‌توانیم بگوییم کم‌ترین فاصله نقطه A از نقاط موجود روی خط d برابر است با طول عمودی که از A بر خط d رسم می‌گردد؛ یعنی نقطه H ، نزدیکترین نقطه به نقطه A است که از خط d انتخاب می‌شود.



مثال ۱ نقطه A مطابق شکل به فاصله ۴ واحد از خط d قرار دارد. نقاطی از خط d را بیابید که به فاصله ۶ واحد از نقطه A باشند.



پاسخ مطابق شکل وقتی گفته می‌شود فاصله A از خط d برابر ۴ است، یعنی طول عمودی که از A بر خط d وارد شده برابر ۴ است. از طرفی نقاطی که از A به فاصله ۶ هستند، روی دایره‌ای به مرکز A و شعاع ۶ قرار می‌گیرند. پس به مرکز A و شعاع ۶ کماتی می‌زنیم تا خط d را در نقاط B و C قطع کند. نقاط B و C جواب مسئله هستند.



تا حالا به یک خیابان مستقیم، خط وسط آن و جدول دو طرف دقت کرده‌اید؟ هر کسی که روی جدول خیابان قرار داشته باشد تا خط وسط، فاصله‌اش یک مقدار ثابت است (مثلاً ۵ متر). حالا این مطلب را در ذهن خودتان داشته باشید و به مسئله بعدی توجه کنید:

مثال ۵ مجموعه‌ای از نقاط را چنان بیابید که از خط داده شده L به فاصله معلوم a باشند. $a > 0$



پاسخ: مطابق شکل خط L را در نظر می‌گیریم. می‌خواهیم مجموعه‌ای از نقاط را پیدا کنیم که فاصله آن‌ها از خط L عدد ثابت و معلوم a باشد. مطابق شکل (۱)، چند نقطه در نظر می‌گیریم که فاصله آن‌ها از خط L عدد معلوم a باشد.

در این صورت با اتصال این نقاط به هم معلوم می‌شود که مجموعه نقاطی که فاصله آن‌ها از خط معلوم L ، مقدار مشخص و ثابت a است، دو خط موازی L و در طرفین آن و به فاصله a از خط L می‌باشند. (شکل (۲))


در این قسمت از درس می‌خواهیم راجع به عمودمنصف بیشتر بدانیم. یعنی اول خاصیت آن، بعد هم طریقه ترسیمش. عمودمنصف برای یک پاره‌خط تعریف می‌شود و همان‌طور که از اسم آن پیداست، عمودمنصف یک پاره‌خط هم بر آن پاره‌خط عمود است و هم آن را نصف می‌کند. حالا ابتدا برویم سراغ خاصیت عمودمنصف:

خاصیت عمودمنصف یک پاره‌خط



مطابق شکل پاره‌خط AB و عمودمنصف آن یعنی نیم‌خط CM رسم شده و نقطه C را روی عمودمنصف این پاره‌خط در نظر گرفته‌ایم. می‌خواهیم ثابت کنیم فاصله این نقطه C از دو سر پاره‌خط AB برابر است.




اثبات: نقطه C را به دو سر پاره‌خط AB وصل می‌کنیم. مطابق شکل در دو مثلث قائم‌الزاویه CMA و CMB داریم:



حال در حالت برعکس، مطابق شکل نقطه C را چنان در نظر می‌گیریم که از دو نقطه A و B به فاصله یکسان باشد. می‌خواهیم ثابت کنیم نقطه C روی عمودمنصف پاره‌خط AB قرار دارد.




اثبات: مطابق شکل نقطه C را به نقطه M وسط AB وصل می‌کنیم. کافی است ثابت کنیم $CM \perp AB$ است:



و چون $CA = CB$ است پس $\angle CMA = \angle CMB = 180^\circ$ ؛ بنابراین طبق (*) نتیجه می‌گیریم $\angle CMA = \angle CMB = 90^\circ$ پس $CM \perp AB$ و چون خودمان C را به وسط AB وصل کرده‌ایم، پس CM عمودمنصف AB بوده و در نهایت C روی عمودمنصف AB قرار می‌گیرد.

نتیجه: هر نقطه روی عمودمنصف یک پاره‌خط، از دو سر آن پاره‌خط به یک فاصله است و برعکس اگر نقطه‌ای از دو سر پاره‌خطی به یک فاصله باشد روی عمودمنصف آن پاره‌خط قرار می‌گیرد.

مثال ۶ نقاط A و B را در نظر بگیرید. دهانهٔ پرگار را بیش از نصف طول $\square\square$ باز کنید و یک بار از نقطهٔ A و بار دیگر با همان شعاع از نقطهٔ B کمان بزنید تا یکدیگر را در M و M' قطع کنند. M و M' چه ویژگی مشترکی دارند؟




پاسخ مطابق شکل دو کمان با شعاع‌های مساوی هم و هر کدام بیش از $\frac{\square\square}{۲}$ ، یکی به مرکز A و دیگری به مرکز B زده شده و نقاط M و M' محل برخورد این دو کمان می‌باشند. هر کدام از نقاط روی کمان (۱) از نقطهٔ A و هر کدام از نقاط روی کمان (۲) از نقطهٔ B فاصلهٔ یکسانی دارند. بنابراین کاملاً واضح است که نقاط M و M' که روی دو کمان (۱) و (۲) قرار دارند، از هر دو نقطهٔ A و B فاصلهٔ یکسان دارند (چون شعاع دو کمان (۱) و (۲) یکسان است). پس M و M' روی عمودمنصف $\square\square$ قرار می‌گیرند.

نکته برای رسم یک خط منحصربه‌فرد، وجود دو نقطهٔ متمایز روی آن خط کافی است. یعنی اگر دو نقطهٔ متمایز از خطی را داشته باشید آن خط به راحتی رسم می‌شود. (دو نقطه را به هم وصل کرده از طرفین امتداد دهید).

مثال ۷ پاره‌خط دلخواه $\square\square$ داده شده است. مراحل رسم عمودمنصف آن را توضیح دهید.


پاسخ فرض می‌کنیم مسئله حل شده و خط d عمودمنصف پاره‌خط $\square\square$ باشد (شکل (۱)). برای این که بتوانیم خط d را رسم کنیم باید دو نقطهٔ متمایز از آن را داشته باشیم، طوری که از A و B به یک فاصله باشند. بنابراین مطابق شکل (۲)، دو کمان با شعاع‌های یکسان، یکی به مرکز A و دیگری به مرکز B می‌زنیم.



دقت کنید برای این که این دو کمان با هم متقاطع باشند، شعاع‌های آن‌ها باید بیش از $\frac{\square\square}{۲}$ باشد (باید نامساوی مثلثی $\square\square\square\square\square\square\square\square$ رعایت شود). نقاط تقاطع را M و M' می‌نامیم. چون M و M' روی دو کمان با شعاع‌های یکسان قرار دارند (به مراکز A و B)، پس $\square\square = \square\square$ و $\square\square\square\square\square\square\square\square$. بنابراین M و M' هر دو روی عمودمنصف پاره‌خط $\square\square$ قرار دارند (چون از دو سر این پاره‌خط فاصلهٔ یکسان دارند). پس با اتصال این دو نقطهٔ متمایز، عمودمنصف موردنظر رسم خواهد شد (شکل (۲)).


بعضی از مواقع لازم است خطی عمود بر یک خط داده شده یا موازی با آن را رسم نماییم. در این صورت از خواص عمودمنصف استفاده می‌کنیم. یعنی هر طور شده باید عمودمنصف با پرگار رسم شود. (این مورد یادتون نره!!! به مثال‌های بعدی توجه کنید).

مثال ۸ مراحل و روش رسم خطی عمود بر یک خط داده شده از یک نقطه روی آن را توضیح دهید.




پاسخ مطابق شکل، خط d و نقطهٔ M روی آن داده شده است. می‌خواهیم خطی رسم کنیم که از M بگذرد و بر خط d عمود باشد. اگر بتوانیم روی خط d، پاره‌خطی مثل $\square\square$ در نظر بگیریم که M وسط $\square\square$ باشد، در این صورت عمودمنصف $\square\square$ از M گذشته و خودبه‌خود بر d عمود می‌گردد. پس ابتدا به مرکز M و شعاع دلخواه کمائی می‌زنیم تا خط d را در نقطه‌های A و B قطع کند. حال به مراکز A و B و به شعاع یکسان و هر کدام بزرگ‌تر از $\frac{\square\square}{۲}$ ، کمان‌هایی می‌زنیم تا یکدیگر را در C و D قطع کنند. با اتصال C و D به یکدیگر، عمودمنصف $\square\square$ رسم شده که قطعاً از M می‌گذرد (چون M وسط $\square\square$ است پس مثل C و D از نقاط A و B به یک فاصله بوده و در نتیجه M، C و D روی یک خط قرار می‌گیرند).

مثال ۹ مراحل و روش رسم خطی عمود بر یک خط داده شده، از یک نقطه خارج آن را توضیح دهید.




پاسخ مطابق شکل نقطهٔ M خارج خط d قرار دارد. می‌خواهیم خطی بر d عمود کنیم تا از M بگذرد. فرض می‌کنیم خط L، از M گذشته و بر d عمود باشد. (شکل (۱)) مطابق شکل (۲) روی خط d پاره‌خطی مثل $\square\square$ را در نظر گرفته‌ایم که عمودمنصف آن از M گذشته است (خط L). در این صورت L خودبه‌خود بر d عمود می‌شود.

مثال ۱۱: زاویه دلخواه α داده شده است. مراحل رسم نیمساز آن را توضیح دهید.



پاسخ: فرض می‌کنیم مسئله حل شده و نیم‌خط α نیمساز آن باشد. برای این که نیم‌خط α را رسم کنیم، باید نقطه‌ای غیر از O (رأس زاویه) روی نیمساز داشته باشیم که فاصله‌اش از اضلاع زاویه α یکسان باشد. پس مطابق شکل (۱) ابتدا به مرکز O و شعاع دلخواه، کمانی می‌زنیم تا اضلاع زاویه را در نقاط A و B قطع کند. چون نقاط روی محیط یک دایره از مرکز به یک فاصله‌اند پس $OA = OB$.

حال به مراکز A و B و به شعاع یکسان و بزرگ‌تر از $\frac{\alpha}{2}$ کمان می‌زنیم تا یکدیگر را در نقطه C قطع کنند؛ پس فاصله نقطه C از A و B یکسان است. در این صورت داریم:




بنابراین از هم‌نهشتی فوق نتیجه می‌شود $\angle 1 = \angle 2$ ، پس OC یا همان α نیمساز α است.

دانش‌آموزان عزیز دقت کنید که رسم نیمساز یک زاویه، روش دیگری هم دارد که در سؤالات امتحانی مطرح شده است.

تکرار: در کتاب درسی، روش رسم چهارضلعی‌های مهم توضیح داده شده است. مهم‌ترین چهارضلعی مورد بحث، متوازی‌الاضلاع است که ترسیم آن، با داشتن اضلاع یا قطرهای آن شده است. به مثال‌های مطرح شده دقت کنید:


مثال ۱۲: متوازی‌الاضلاعی رسم کنید که طول ضلع‌های آن ۲ و ۴ باشد.



پاسخ: مطابق شکل متوازی‌الاضلاع $ABCD$ با اضلاع $AB = 4$ و $BC = 2$ رسم شده است.

بنابراین برای رسم متوازی‌الاضلاع مورد نظر، ابتدا پاره‌خط AB (به طول کم‌تر از ۶) را به عنوان قطر این متوازی‌الاضلاع رسم می‌کنیم. (دقت کنید در مثلث ABC طبق قضیه نامساوی مثلثی $AB < AC + BC$ است؛ یعنی $4 < 2 + 2$ یا $4 < 6$). از نقطه A (به مرکز A) دو کمان به شعاع‌های ۲ و ۴ و از نقطه C نیز دو کمان به شعاع‌های ۲ و ۴ رسم می‌کنیم و مانند شکل نقطه برخورد کمان‌ها را B و D می‌نامیم. چهارضلعی $ABCD$ متوازی‌الاضلاع مورد نظر است.

مثال ۱۳: متوازی‌الاضلاعی رسم کنید که طول اضلاعش ۳ و ۵ و طول یک قطر آن ۶ باشد.



پاسخ: روش اول: ابتدا قطر $AB = 6$ را رسم می‌کنیم؛ سپس به مرکز B دو کمان به شعاع‌های ۳ و ۵ (مساوی طول اضلاع متوازی‌الاضلاع) می‌زنیم و هم‌چنین به مرکز D و همین شعاع‌ها، دو کمان دیگر رسم می‌کنیم. محل برخورد یک کمان با شعاع کوچک و یک کمان با شعاع بزرگ، یکی از B و دیگری از D را نقاط A و C می‌نامیم. چهارضلعی $ABCD$ متوازی‌الاضلاع است.

یادآوری: در متوازی‌الاضلاع، قطرهای آن یکدیگر را نصف می‌کنند.

پس برای رسم متوازی‌الاضلاعی که دو قطر آن داده شده، باید به مرکز محل برخورد قطرهای و شعاعی معادل نصف قطرهای کمان بزنیم.

(i)

(ii)

مثال ۱۴ متوازی الاضلاعی رسم کنید که طول قطرهای آن ۴ و ۶ باشد. چند متوازی الاضلاع با این شرایط می توان رسم کرد؟

پاسخ مطابق شکل (۱) متوازی الاضلاع □□□□ با قطرهای ۴=□□ و ۶=□□ رسم شده است. چون قطرها منصف یکدیگرند، ۲=□□=□□ و ۳=□□=□□؛ پس برای رسم این متوازی الاضلاع، ابتدا دو خط d و d' را که در نقطه O متقاطع هستند، می کشیم. به مرکز O و شعاع ۲، دو کمان می زنیم تا خط d' را در نقاط A و C قطع کنند. هم چنین به مرکز O و شعاع ۳، دو کمان دیگر می زنیم تا خط d را در B و D قطع کنند. نقاط A، B، C، D و رأس متوازی الاضلاع مورد نظر است (شکل ۲). چون زاویه بین قطرها داده نشده است، پس بی شمار متوازی الاضلاع با این شرایط رسم می گردد.

در سؤالات امتحانی روش رسم مستطیل، لوزی و مربع با داشتن قطرها یا اضلاع توضیح داده شده است (از اول هم گفتیم سؤالات امتحانی را بخوانید!!!)

سؤال های امتحانی

- ۱- نقاط A و B به فاصله ۴ سانتی متر از هم قرار دارند. جاهای خالی را طوری پر کنید که مسئله زیر دو جواب داشته باشد: «نقطه ای بیابید که فاصله اش از نقطه A برابر و از نقطه B برابر باشد.»
- ۲- نقاط A و B به فاصله ۵ سانتی متر از هم قرار دارند. جاهای خالی را طوری پر کنید که مسئله زیر یک جواب داشته باشد: «نقطه ای بیابید که فاصله اش از نقطه A برابر و از نقطه B برابر باشد.»
- ۳- نقاط A و B به فاصله ۳ سانتی متر از هم قرار دارند. جاهای خالی را طوری پر کنید که مسئله زیر جواب نداشته باشد: «نقطه ای بیابید که فاصله اش از نقطه A برابر و از نقطه B برابر باشد.»
- ۴- مجموعه ای از نقاط را چنان بیابید که از خط داده شده L به فاصله معلوم a باشند. □□ > □.
- ۵- مثلث □□□ را با فرض ۳=□□ و ۵=□□ و ۶۰°=□ رسم کنید.
- ۶- مثلثی متساوی الاضلاع به ضلع ۴ سانتی متر رسم کنید.
- ۷- آیا مثلثی به اضلاع ۴، ۸ و ۲۰ قابل رسم است؟ چرا؟
- ۸- پاره خط دلخواه □□ داده شده است. مراحل رسم عمود منصف آن را توضیح دهید.
- ۹- مراحل و روش رسم خطی عمود بر یک خط داده شده از یک نقطه روی آن را توضیح دهید.
- ۱۰- مراحل و روش رسم خطی عمود بر یک خط داده شده، از یک نقطه خارج آن را توضیح دهید.
- ۱۱- مراحل و روش رسم خطی موازی با یک خط داده شده را توضیح دهید.
- ۱۲- دایره C را در نظر بگیرید. به کمک خط کش و پرگار، مرکز این دایره را بیابید.
- ۱۳- زاویه دلخواه □□ داده شده است. مراحل رسم نیمساز آن را توضیح دهید.
- ۱۴- دو ضلع یک زاویه را در نظر بگیرید و نقطه ای را بیابید که فاصله اش از هر دو ضلع این زاویه، یک واحد باشد. به کمک نقطه ای که یافته اید، نیمساز این زاویه را رسم نمایید.
- ۱۵- متوازی الاضلاعی رسم کنید که طول اضلاعش ۴ و ۶ و طول یک قطر آن ۸ باشد.
- ۱۶- متوازی الاضلاعی رسم کنید که طول قطرهای آن ۳ و ۴ باشد. چند متوازی الاضلاع با این شرایط می توان رسم کرد؟
- ۱۷- متوازی الاضلاعی رسم کنید که طول دو قطر آن ۶ و ۴ و زاویه بین دو قطر ۶۰° باشد.
- ۱۸- مستطیلی رسم کنید که طول هر قطر آن ۶ باشد.
- ۱۹- یک لوزی رسم کنید که طول قطرهای آن ۳ و ۴ باشد.
- ۲۰- یک لوزی به ضلع ۵ و قطر ۶ رسم کنید.
- ۲۱- طریقه رسم مربعی را که اندازه قطر آن مقدار مشخص a باشد، توضیح دهید.
- ۲۲- مربعی به ضلع ۶√۲ رسم کنید.

استدلال



به طور کلی روش نتیجه‌گیری را استدلال می‌گوییم. شیوه درست استدلال، در زندگی روزمره نقش پراهمیتی دارد. در این قسمت از درس با چند مدل از استدلال آشنا می‌شویم.

استدلال استقرایی

در این نوع از استدلال، از مشاهدات و بررسی موضوعی در چند حالت، نتیجه‌ای کلی در مورد آن موضوع گرفته می‌شود. به عبارت دیگر در این استدلال از جزء به کل می‌رسیم. البته با چنین استدلالی نمی‌توانیم همواره به درستی نتیجه گرفته‌شده مطمئن باشیم. مثلاً اگر فردی با بررسی و مشاهده این که در مربع، مستطیل و متوازی‌الاضلاع جمع زاویه‌های داخلی برابر 360° است، به این نتیجه کلی برسد که در هر چهارضلعی محدب جمع زاویه‌های داخلی 360° است، از استدلال استقرایی استفاده کرده است. از این نوع استدلال فقط می‌توان به عنوان یک کمک خوب در حل مسئله کمک گرفت.

استدلال استنتاجی

این نوع از استدلال، براساس نتیجه‌گیری منطقی از حقایقی که قبلاً درستی آن‌ها را قبول کرده‌ایم به دست می‌آید. مثلاً با توجه به این که جمع زاویه‌های داخلی مثلث 180° است، با رسم یکی از قطرهای یک چهارضلعی و تبدیل آن به دو مثلث می‌توانیم ثابت کنیم جمع زاویه‌های داخلی یک چهارضلعی محدب 360° است.


تذکره در بسیاری از مسائل به کمک استدلال استقرایی حدس‌های کلی می‌زنیم؛ سپس حدس‌های خود را دقیق و دقیق‌تر می‌کنیم و در نهایت به کمک استدلال استنتاجی درباره درستی آن مسئله به طور قطع و یقین حکم می‌کنیم.

استدلال تمثیلی

در این نوع از استدلال، در مورد دو چیز شبیه هم، حکم مشابه می‌دهیم. مثلاً یک لیوان آب را در نظر بگیرید. اگر این مقدار آب در 100° سانتی‌گراد بجوشد، با استدلال تمثیلی می‌گوییم یک لیوان از یک مایع بی‌رنگ مثل آب هم در همان دمای 100° درجه می‌جوشد. دقت کنید استدلال تمثیلی هم نمی‌تواند یک حکم را برای ما ثابت کند. حال به حل چند مثال اثباتی با استفاده از استدلال استنتاجی توجه کنید:

مثال ۱۵ ثابت کنید مجموع زاویه‌های داخلی یک چهارضلعی محدب 360° است.

پاسخ مطابق شکل روبه‌رو چهارضلعی $ABCD$ را در نظر گرفته و جدول فرض و حکم را می‌نویسیم.




حال در این چهارضلعی قطر AC را رسم می‌کنیم تا به دو مثلث تبدیل شود. در این صورت جمع زاویه‌های داخلی چهارضلعی، برابر 180° است با جمع زاویه‌های داخلی دو مثلث ایجادشده:


حال طرفین رابطه‌های (۱) و (۲) را جمع می‌بندیم (نظیربه‌نظیر):

و در نهایت حکم مسئله ثابت می‌شود.

مثال ۱۶ به کمک استدلال استنتاجی ثابت کنید مجموع زاویه‌های داخلی یک n ضلعی محدب برابر است با $180^\circ \times (n-2)$.



پاسخ مطابق شکل یک پنج‌ضلعی محدب در نظر گرفته شده و تمام قطرهای گذرنده از یک رأس آن (مثل A) رسم گردیده است. در این صورت سه مثلث پدید می‌آید. بنابراین با استدلال استقرایی می‌توان نتیجه گرفت که در صورت ترسیم تمام قطرهای گذرنده از یک رأس در n ضلعی محدب، $n-2$ مثلث پدید می‌آید و چون در هر مثلث جمع زاویه‌های داخلی 180° است، بنابراین در n ضلعی محدب جمع تمام زاویه‌های داخلی برابر است با $180^\circ \times (n-2)$.





خطوط همرس: خطوطی هستند که همگی از یک نقطه می‌گذرند. در شکل روبه‌رو خطوط d_1, d_2, d_3 در نقطه A همرس هستند.

مثال ۱۷ به کمک استدلال استنتاجی ثابت کنید هر سه نیمساز داخلی مثلث همرس‌اند.




پاسخ می‌دانیم هر نقطه روی نیمساز یک زاویه از دو ضلع آن زاویه به یک فاصله است و برعکس اگر نقطه‌ای از هر دو ضلع یک زاویه، فاصله مساوی داشته باشد، روی نیمساز آن زاویه قرار دارد. در شکل فوق نیمساز زاویه‌های A و B را رسم کرده‌ایم و این نیمسازها یکدیگر را در O قطع کرده‌اند. ثابت می‌کنیم نقطه O روی نیمساز C قرار دارد؛ به این منظور از O بر سه ضلع مثلث عمود می‌کنیم:



پس هر سه نیمساز داخلی مثلث در نقطه O متقاطع یا همرس‌اند.

مثال ۱۸ به کمک استدلال استنتاجی ثابت کنید سه عمودمنصف مثلث در یک نقطه همرس‌اند.




پاسخ می‌دانیم هر نقطه روی عمودمنصف یک پاره‌خط از دو سر آن پاره‌خط به یک فاصله است و برعکس، اگر فاصله نقطه‌ای از دو سر یک پاره‌خط مساوی هم باشد، آن نقطه روی عمودمنصف پاره‌خط مفروض قرار دارد. در شکل مقابل چون O و O' دو ضلع مثلث هستند (دو پاره‌خط متقاطع)، پس عمودمنصف‌های آن‌ها هم در نقطه‌ای مثل O متقاطع‌اند.

ثابت می‌کنیم O روی عمودمنصف ضلع BC هم قرار دارد. از O به سه رأس مثلث وصل می‌کنیم:




پس هر سه عمودمنصف در O همرس‌اند.

مثال ۱۹ به کمک استدلال استنتاجی ثابت کنید سه ارتفاع هر مثلث همرس‌اند.



پاسخ روش اول می‌دانیم عمودمنصف‌های سه ضلع در هر مثلث همرس‌اند. پس اگر ثابت کنیم ارتفاعات مثلث عمودمنصف‌های یک مثلث دیگر هستند، خودبه‌خود همرسی ارتفاع‌های آن مثلث ثابت می‌شود.



مطابق شکل از سه رأس مثلث O, O', O'' ، خطوطی به موازات ضلع روبه‌روی آن‌ها رسم می‌کنیم (از رأس A به موازات O, O' ، از رأس B به موازات O, O'' و از رأس C به موازات O, O'')؛ در این صورت مثلث $O'O''O'$ پدید می‌آید.

در چهارضلعی $O'O''O'A$ ، اضلاع روبه‌رو با هم موازی‌اند؛ پس این چهارضلعی متوازی‌الاضلاع است؛ بنابراین $O'O'' = O'A$ (*)، هم‌چنین به دلیل مشابه چهارضلعی $O'O''O'B$ متوازی‌الاضلاع است بنابراین $O'O'' = O'B$ (**). $O'A = O'B$ (*) و $O'O'' = O'A = O'B$ (**). از طرفی می‌توان گفت:

بنابراین طبق روابط (۱) و (۲) پاره‌خط $O'O''$ عمودمنصف $O'A$ (یکی از اضلاع مثلث $O'O''O'$) است.

به ترتیب مشابه می‌توان ثابت کرد بقیه ارتفاع‌های مثلث O, O', O'' ، عمودمنصف‌های اضلاع مثلث $O'O''O'$ می‌باشند ($O'O''$ عمودمنصف $O'A$ و هم‌چنین $O'O''$ عمودمنصف $O'B$ است) و در نهایت همرسی آن‌ها ثابت می‌شود.

مثال ۲۱) عکس قضیه‌های زیر را بنویسید:

(الف) هر مستطیل یک متوازی‌الاضلاع است.

(ب) در دو مثلث متشابه، اضلاع متناظر، متناسب‌اند.

(ت) در هر متوازی‌الاضلاع، قطرهای منصف یکدیگرند.

(پ) در مثلث قائم‌الزاویه $\square\square\square=90^\circ$ داریم $\square\square\square$.

پاسخ الف) عکس قضیه: هر متوازی‌الاضلاع یک مستطیل است.

ب) عکس قضیه: اگر در دو مثلث اضلاع متناظر، متناسب باشند، دو مثلث متشابه‌اند.

ت) عکس قضیه: اگر در مثلث $\square\square\square$ ، رابطه $\square\square\square$ برقرار باشد، آن گاه $\square\square\square=90^\circ$.

پ) عکس قضیه: اگر در یک چهارضلعی قطرهای منصف هم باشند، آن چهارضلعی متوازی‌الاضلاع است.

گزاره به یک جمله خبری که دقیقاً درست یا نادرست باشد گزاره گفته می‌شود.

گزاره می‌تواند تنها یک خبر را اعلام کند که به آن گزاره ساده گفته می‌شود؛ مثل «مجموع زاویه‌های خارجی هر مثلث 360° است».

یا این که می‌تواند بیش از یک خبر را اعلام کند؛ مثل «فردا جمعه است و 25 عددی مرکب است» که به آن گزاره مرکب می‌گوییم.

نقیض یک گزاره: همان طور که گفته شد ارزش یک گزاره همواره یا درست است یا نادرست. ارزش نقیض یک گزاره دقیقاً مخالف ارزش همان گزاره است.

دقت کنید در یک گزاره شرطی به جای این که درباره چیزی خبری قطعی داده شود، این خبر با یک شرط بیان می‌گردد. مثلاً «اگر فردا برف بیاید،

مدرسه تعطیل خواهد شد».

مثال ۲۲) نقیض گزاره‌های زیر را مشخص کنید:

(الف) عدد a بزرگ‌تر از b است.

(ب) مجموع زاویه‌های داخلی هر مثلث 180° است.

پاسخ الف) نقیض گزاره: «چنین نیست که عدد a بزرگ‌تر از b باشد» یا این که « a بزرگ‌تر از b نیست» یا این که « a کوچک‌تر مساوی b است».

ب) نقیض گزاره: «چنین نیست که مجموع زاویه‌های داخلی هر مثلث 180° باشد» یا این که «مثلثی وجود دارد که مجموع زاویه‌های داخلی آن 180° نیست».

برهان خلف (اثبات غیرمستقیم)

معمولاً برای اثبات قضیه‌ها، به طور مستقیم از داده‌ها که همان فرض‌های مسئله هستند شروع می‌کنیم و با استفاده از سایر قضیه‌ها و اصول بدیهی

و تعریف‌ها (یعنی حقایقی که درستی آن‌ها را پذیرفته‌ایم)، برقراری حکم را نشان می‌دهیم. اما در بعضی از مسائل نمی‌توانیم قضیه‌ها را به طور

مستقیم اثبات کنیم و بهتر است راه غیرمستقیم را پیش بگیریم. در زندگی روزانه هم از استدلال غیرمستقیم استفاده زیادی می‌کنیم؛ مثلاً ممکن

است در یک آزمون سه‌گزینه‌ای، ندانیم پاسخ درست کدام گزینه است؛ اما بتوانیم نادرستی دو گزینه را با اطمینان تشخیص دهیم. در این صورت

قطعاً گزینه باقی‌مانده صحیح است. این استدلال بر پایه استدلال غیرمستقیم خواهد بود.

به عبارت دیگر، به صورت دقیق‌تر روش اثبات غیرمستقیم بر مبنای دو اصل منطقی زیر استوار است:

۱) یک عبارت ریاضی و نقیض (خلاف) آن، هر دو درست نیستند.

۲) از بین یک عبارت ریاضی و خلاف آن، قطعاً یکی درست است.


اثبات غیرمستقیم، برهان خلف نامیده می‌شود. برای استفاده از برهان خلف گام‌های زیر را برمی‌داریم:

۱) فرض می‌کنیم نقیض حکم درست باشد (فرض خلف).

۲) نشان می‌دهیم درست بودن نقیض حکم، با حقایق دانسته‌شده یا فرض اولیه در تناقض است.

۳) با نادرست بودن نقیض حکم، نتیجه می‌گیریم که خود حکم درست است.

به حل چند مثال به کمک برهان خلف توجه کنید:



مثال ۲۳) با برهان خلف ثابت کنید اگر در مثلث $\square\square\square$ داشته باشیم $\square\square\square \neq \square\square\square$ ، آن گاه $\square\square\square \neq \square\square\square$.

$$\begin{array}{|c|c|} \hline \square\square\square & \square\square\square \neq \square\square\square \\ \hline \square\square\square & \square\square\square \neq \square\square\square \\ \hline \end{array}$$

پاسخ

طبق برهان خلف فرض می‌کنیم حکم درست نباشد؛ یعنی $\square\square\square = \square\square\square$ باشد. در این صورت مثلث $\square\square\square$

با ساق‌های $\square\square\square$ و $\square\square\square$ ، متساوی‌الساقین است پس $\square\square\square = \square\square\square$ ؛ که این خلاف فرض است. بنابراین

فرض خلف یعنی $\square\square\square = \square\square\square$ نادرست است پس $\square\square\square \neq \square\square\square$.

مثال ۲۴ با برهان خلف ثابت کنید خطی که یکی از دو خط موازی را قطع کند، دیگری را نیز قطع خواهد کرد.



پاسخ طبق برهان خلف فرض می‌کنیم حکم درست نباشد (فرض خلف) یعنی از طرفی چون طبق فرض $d_1 \parallel d_2$ بنابراین $\angle 1 = \angle 2$ (دو خط موازی با یک خط، خود با هم موازی‌اند. در این جا d_1 و d' هر دو با d_2 موازی شده‌اند پس خود با هم موازی‌اند) که این خلاف فرض است (چون در فرض آمده $d_1 \parallel d_2$) پس فرض خلف باطل بوده و $d_1 \parallel d_2$ خواهد شد.

مثال ۲۵ عکس قضیه (۱) را که قبلاً مطرح شده بود، بیان کرده و آن را ثابت کنید.



پاسخ عکس قضیه (۱): اگر در مثلثی دو زاویه نابرابر باشند، ضلع مقابل به زاویه بزرگ‌تر، بزرگ‌تر است از ضلع مقابل به زاویه کوچک‌تر.

اثبات طبق برهان خلف، فرض می‌کنیم حکم درست نباشد (فرض خلف)، یعنی $\angle A > \angle B$ نباشد $\angle A > \angle B$ ؛ پس $\angle A \leq \angle B$ خواهد بود. دو حالت در نظر می‌گیریم:

الف) $\angle A < \angle B$: طبق قضیه (۱) چون $\angle A$ کوچک‌تر از $\angle B$ شده، پس زاویه روبه‌رو به $\angle A$ یعنی BC ، کوچک‌تر است یعنی $BC < CD$ ؛ که این مورد با فرض $\angle A > \angle B$ در تناقض است.

ب) $\angle A = \angle B$: در این صورت مثلث ABC ، متساوی‌الساقین با ساق‌های AB و AC است. پس زاویه‌های روبه‌رو به دو ساق مساوی‌اند یعنی $\angle A = \angle B$ که این مورد هم با فرض $\angle A > \angle B$ در تناقض است.

پس در هر دو حالت به تناقض رسیده‌ایم. بنابراین فرض خلف یعنی $\angle A \leq \angle B$ که ابتدا در نظر گرفته بودیم نادرست است پس $\angle A > \angle B$.

قضیه نامساوی مثلثی

در هر مثلث، جمع هر دو ضلع، از ضلع سوم بزرگ‌تر است.

اثبات روشن اول





مطابق شکل (۱)، ضلع AB را از طرف A ، به اندازه AC امتداد می‌دهیم تا به نقطه D برسیم. $AD = AC$ متساوی‌الساقین است:



حال در مثلث BCD ، طبق قضیه کتاب درسی، وقتی $\angle C$ از $\angle B$ بزرگ‌تر می‌شود، ضلع روبه‌رو به $\angle C$ ، یعنی BD ، از ضلع روبه‌رو به $\angle B$ ، یعنی BC ، بزرگ‌تر است:

بقیه احکام به همین ترتیب ثابت خواهند شد.

روش دوم مطابق شکل (۲)، نیمساز زاویه $\angle A$ را رسم می‌کنیم تا ضلع BC را در نقطه D قطع کند:



با جمع کردن طرفین نامساوی (۱) و (۲) داریم:

نکته بسیار مهم در هر مثلث طول هر کدام از اضلاع بین جمع و تفریق طول دو ضلع دیگر قرار می‌گیرد.

مثال ۲۶ سه پاره خط به طول های $6x$ ، $x+7$ و $4x-1$ مفروض اند. اگر جمع طول این سه پاره خط ۳۶ باشد، آیا این پاره خطها می توانند اضلاع یک مثلث باشند؟ چرا؟

پاسخ فرض می کنیم $4x-1=6$ ، $7 < x+7$ و $1 < 4x-1$ در این صورت داریم:

$$8 < 10 < 18 \quad 3 < 36 \quad 4 < 4 \quad 7 < 4 \quad 6 < 36$$

حال با توجه به این که جمع هر دو ضلع مثلث، از ضلع سوم بزرگ تر است (قضیه نامساوی مثلثی) برای بررسی، جمع دو ضلع کوچک تر را از ضلع بزرگ تر، بزرگ تر قرار می دهیم. اگر نامساوی درست بود، مثلث تشکیل می شود:

$$10 < 8 < 18 \quad 10 < 8 < 18$$

مثال ۲۷ حدود x را چنان بیابید که $2x-4$ ، 10 و 12 ، اضلاع یک مثلث باشند.

پاسخ اولاً بدیهی است که هر ضلع، طول مثبت دارد، دوماً نامساوی مثلثی

را بین سه ضلع می نویسیم:

$$\begin{aligned} 1 < 2 < 4 & 0 < 2 \\ 2 < 10 < 12 & 2 < 4 & 2 < 26 & 3 < 13 \\ 3 < 10 < 2 & 4 < 12 & 3 < 3 \\ 4 < 12 < 2 & 2 < 4 & 10 < 1 & 1 < 1 \end{aligned}$$

قضیه دوشروطی

تعریف قضیه دوشروطی: اگر عکس یک قضیه شرطی درست باشد (یعنی خودش هم یک قضیه شرطی باشد)، این دو قضیه شرطی را می توان به صورت یک قضیه بیان کرد که به آن قضیه دوشروطی می گوئیم.

به عبارت دیگر: فرض می کنیم عبارت $p \Rightarrow q$ یک قضیه شرطی باشد (گزاره p فرض قضیه و گزاره q حکم آن است). در این صورت اگر عکس

قضیه مذکور یعنی $q \Rightarrow p$ هم درست باشد، از ترکیب این دو قضیه عبارتی به صورت $p \Leftrightarrow q$ حاصل می شود که آن را قضیه دوشروطی می نامیم.


$p \Leftrightarrow q$ خوانده می شود «اگر p آن گاه q و برعکس» یا « p اگر و تنها اگر q ». مثلاً می دانیم در هر مثلث متساوی الساقین، زاویه های روبه رو به دو

ساق مساوی اند (قضیه). یا اگر در مثلثی دو زاویه با هم مساوی باشند، مثلث متساوی الساقین است (عکس قضیه). پس با ترکیب قضیه و عکس

آن داریم:

در هر مثلث متساوی الساقین، زاویه های روبه رو به دو ساق برابرند و برعکس.

$$\square \Leftrightarrow \square$$



مثال ۲۸ عکس هر کدام از قضیه های زیر را نوشته و در صورت امکان آن ها را به صورت قضیه دوشروطی بنویسید.

(الف) در هر متوازی الاضلاع، قطرهای آن یکدیگر را نصف می کنند.

پاسخ الف عکس قضیه هم درست است. یعنی اگر قطرهای یک چهارضلعی همدیگر را نصف کنند، چهارضلعی متوازی الاضلاع است (اثبات در فصل

۲ آمده است). بنابراین می توان گفت «در هر متوازی الاضلاع قطرهای آن یکدیگر را نصف می کنند و برعکس» یا «یک چهارضلعی متوازی الاضلاع است اگر و تنها

اگر قطرهای آن یکدیگر را نصف کنند».

(ب) عکس قضیه هم درست است. پس می توان گفت: «اگر دو مثلث متشابه باشند، اضلاع نظیر به نظیر متناسبند و برعکس» یا «دو مثلث متشابه اند،

اگر و تنها اگر اضلاعشان نظیر به نظیر متناسب باشد».

مثال نقض

تعریف مثال نقض: به مثالی که نشان می دهد یک نتیجه گیری یا حدس کلی نادرست است، مثال نقض گفته می شود. به موارد زیر توجه کنید:

۱) تمام اعداد صحیح منفی هستند. (یک حکم کلی در مورد اعداد صحیح)

۲) برای هر دو عدد حقیقی a و b ، $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ و $n \in \mathbb{N}$. (حکمی کلی در مورد ضرب رادیکال ها)

۳) جمع زاویه های خارجی هر مثلث 360° است. (حکمی کلی در مورد تمام مثلث ها)


۴) به ازای هر عدد طبیعی n ، عدد $7^n - 1$ مضرب ۶ است.

- ۲۸- عکس قضیه‌های زیر را بنویسید:
- الف) هر مستطیل یک متوازی‌الاضلاع است.
- ب) در دو مثلث متشابه، اضلاع متناظر، متناسب‌اند.
- پ) در مثلث قائم‌الزاویه $\triangle ABC$ که $\angle C = 90^\circ$ داریم $\frac{AC}{AB} = \frac{BC}{AB}$.
- ت) در هر متوازی‌الاضلاع، قطرهای آن یکدیگر را نصف می‌کنند.
- ۲۹- با برهان خلف ثابت کنید اگر در مثلث $\triangle ABC$ داشته باشیم $\angle A \neq \angle B$ ، آن گاه $a \neq b$.
- ۳۰- با برهان خلف ثابت کنید خطی که یکی از دو خط موازی را قطع کند، دیگری را نیز قطع خواهد کرد.
- ۳۱- عکس قضیه (۱) را که قبلاً مطرح شده بود، بیان کرده و آن را ثابت کنید.
- ۳۲- ثابت کنید از نقطه A نمی‌توان بیش از یک عمود بر خط l رسم نمود.
- ۳۳- در دو مثلث $\triangle ABC$ و $\triangle A'B'C'$ ، اگر $\angle A = \angle A'$ ، $\angle B = \angle B'$ و $\angle C = \angle C'$ ثابت کنید $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$.
- ۳۴- در مثلث $\triangle ABC$ ، پاره‌خط AD نیمساز $\angle A$ است. اگر $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$ به کمک برهان خلف ثابت کنید: $\angle B = \angle C$.
- ۳۵- اندازه اضلاع مثلثی اعداد طبیعی بوده و طول دو ضلع آن ۳ و ۸ است. برای طول بزرگ‌ترین ضلع چند جواب وجود دارد؟
- ۳۶- عکس هر کدام از قضیه‌های زیر را نوشته و در صورت امکان آن‌ها را به صورت قضیه دوشرطی بنویسید.
- الف) در هر متوازی‌الاضلاع، قطرهای آن یکدیگر را نصف می‌کنند.
- ب) اگر دو مثلث متشابه باشند، اضلاع نظیر به نظیر متناسب‌اند.
- ۳۷- برای رد حدس‌های زیر مثال نقض بزنید:
- الف) نقطه هم‌مرسی عمودمنصف‌های سه ضلع یک مثلث همواره داخل مثلث قرار می‌گیرد.
- ب) ارتفاع‌های هر مثلث داخل مثلث واقع است.
- پ) هر زاویه خارجی یک چندضلعی، از هر زاویه داخلی آن بزرگ‌تر است.
- ۳۸- قضیه‌های زیر را ثابت کنید:
- الف) اگر در مثلثی دو ضلع نابرابر باشند، زاویه روبه‌رو به ضلع بزرگ‌تر، بزرگ‌تر است از زاویه روبه‌رو به ضلع کوچک‌تر.
- ب) در هر مثلث، جمع دو ضلع، از ضلع سوم بزرگ‌تر است. (قضیه نامساوی مثلثی)


پاسخ سؤال‌های امتحانی

۱- مطابق شکل نقاط A و B به فاصله ۴ سانتی‌متر از هم واقع‌اند. برای این که دو نقطه در صفحه وجود داشته باشد که از A، فاصله x و هم‌چنین از B، فاصله y داشته باشد، باید $\square + \square$ از فاصله A و B بزرگ‌تر باشد، یعنی ۴ $\square \square \square$. مثلاً فرض می‌کنیم $x = 3$ و $y = 2$ ؛ یعنی اگر به مرکز A و شعاع ۳ و به مرکز B و شعاع ۲ کمان‌هایی بزنیم، یکدیگر را در M و N قطع می‌کنند، این دو نقطه جواب مسئله‌اند.

۲- مطابق شکل نقاط A و B به فاصله ۵ سانتی‌متر از هم واقع‌اند. برای این که یک نقطه در صفحه داشته باشیم که فاصله‌اش از A برابر x و هم‌چنین از B برابر y باشد، باید $\square + \square$ با فاصله A و B مساوی باشد. مثلاً $x = 1$ و $y = 4$ یعنی اگر به مرکز A و شعاع ۱ و به مرکز B و شعاع ۴ کمان‌هایی بزنیم، بر یکدیگر در نقطه M مماس می‌شوند و M جواب مسئله است.




۳- مطابق شکل نقاط A و B به فاصله ۳ سانتی‌متر از هم واقع‌اند. برای این که نقطه‌ای در صفحه وجود نداشته باشد که فاصله‌اش از A و B به ترتیب x و y باشد، باید $\square + \square$ از فاصله A و B کم‌تر باشد؛ یعنی ۳ $\square \square \square$ ، مثلاً $x = 1$ و $y = 1$.



۴- پاسخ در مثال ۵ صفحه ۹

۵- فرض می‌کنیم مسئله حل شده و مثلث $\square \square \square$ جواب آن باشد. بنابراین مطابق شکل، زاویه $\square \square = 60^\circ$ را رسم می‌کنیم و برای مشخص شدن دو رأس B و C، به مرکز A و شعاع‌های ۳ و ۵ دو کمان می‌زنیم تا اضلاع $\square \square$ و $\square \square$ را به ترتیب در B و C قطع کنند. مثلث $\square \square \square$ جواب مسئله است.



۶- فرض می‌کنیم مسئله حل شده و جواب آن مثلث $\square \square \square$ (شکل (۱)) باشد. در این صورت ابتدا پاره‌خط $\square \square = 4$ را رسم می‌کنیم.

حالا به مراکز B و C و شعاع‌های ۴ $\square \square$ ، دو کمان می‌زنیم تا یکدیگر را در نقطه A قطع کنند. مثلث $\square \square \square$ جواب مسئله است (شکل (۲)).

۷- خیر. زیرا جمع دو ضلع کوچک آن، بزرگ‌تر از بزرگ‌ترین ضلع مثلث نیست (حتی اگر مساوی هم باشند، مثلثی رسم نخواهد شد). دقت کنید در این مسئله، حتی برقراری شرط‌های 4 $\square \square$ 8 و 20 $\square \square$ 4 کمکی به رسم مثلث نمی‌کند.


۸- پاسخ در مثال ۷ صفحه ۱۰

۹- پاسخ در مثال ۸ صفحه ۱۰

۱۰- پاسخ در مثال ۹ صفحه ۱۰

۱۱- پاسخ در مثال ۱۰ صفحه ۱۱


۱۲- می‌دانیم عمودمنصف هر وتر درون یک دایره، از مرکز دایره می‌گذرد. پس مطابق شکل روبه‌رو، دو وتر دلخواه AB و CD را درون دایره رسم می‌کنیم (بهتر است این دو وتر، نقطه اشتراکی نداشته باشند، البته برای رسم جذاب‌تر، سپس عمودمنصف وترهای ذکر شده را رسم می‌نماییم تا یکدیگر را در O قطع کنند؛ این نقطه مرکز دایره است.




(روش رسم عمودمنصف یک پاره‌خط، باید کاملاً در ذهن شما نهادینه شود.)

۱۳- پاسخ در مثال ۱۱ صفحه ۱۲

۱۴- مطابق شکل (۱) زاویه $\square \square \square$ را در نظر می‌گیریم و فرض می‌کنیم فاصله نقطه M از هر دو ضلع زاویه، برابر یک باشد. در این صورت طول عمود اخراج شده از M بر هر کدام از اضلاع زاویه $\square \square \square$ برابر یک است. می‌دانیم مجموعه نقاطی از صفحه، که از خط d به فاصله معلوم l قرار دارند، دو خط به موازات d است که از این خط، فاصله l دارند.









پس مطابق شکل (۲)، خطی به موازات ضلع $\square\square$ و فاصله یک از آن، درون زاویه $\square\square$ و هم‌چنین خطی به موازات $\square\square$ و همین فاصله از آن، باز هم درون زاویه $\square\square$ رسم می‌کنیم. محل برخورد دو خط جدید، نقطه M خواهد بود. چون فاصله این نقطه از دو ضلع مساوی است، پس \square روی نیمساز زاویه $\square\square$ واقع است. با اتصال نقطه M به رأس O ، نیمساز $\square\square$ رسم می‌شود.

روش دوم: ابتدا به روش قبل مثلث $\square\square$ را رسم می‌کنیم. با توجه به این که قطرهای متوازی‌الاضلاع منصف یکدیگرند، پس از رأس A به نقطه O وسط قطر $\square\square$ وصل کرده و به اندازه $\square\square$ (از طرف O) امتداد می‌دهیم تا به رأس چهارم متوازی‌الاضلاع (نقطه C) برسیم.


۱۵- روش اول: ابتدا قطر $\square\square = ۸$ را رسم می‌کنیم. سپس به مرکز B ، دو کمان به شعاع‌های ۴ و ۶ (اضلاع متوازی‌الاضلاع) و هم‌چنین به مرکز D و همین شعاع‌ها نیز دو کمان دیگر می‌زنیم. محل برخورد یک کمان با شعاع کوچک و یک کمان با شعاع بزرگ، یکی از B و دیگری از D را نقاط A و C می‌نامیم. چهارضلعی $\square\square\square\square$ متوازی‌الاضلاع است.




۱۶- مطابق شکل (۱) متوازی‌الاضلاع $\square\square\square\square$ با قطرهای $\square\square = ۳$ و $\square\square = ۴$ رسم شده است. چون قطرهای منصف یکدیگرند، $1.5 = \square\square = \square\square = ۲$ ؛ پس برای رسم این متوازی‌الاضلاع، ابتدا دو خط d و d' را که در نقطه O متقاطع هستند، می‌کشیم. به مرکز O شعاع $1/5$ ، دو کمان می‌زنیم تا خط d' را در نقاط A و C قطع کنند.




هم‌چنین به مرکز O و شعاع ۲ ، دو کمان دیگر می‌زنیم تا خط d را در B و D قطع کنند. نقاط A ، B ، C و D رؤس متوازی‌الاضلاع موردنظر است (شکل (۲)). بی‌شمار متوازی‌الاضلاع با این شرایط می‌توان رسم کرد.



۱۷- فرض می‌کنیم مسئله حل شده و شکل روبه‌رو جواب آن باشد. در این صورت با فرض این که طول دو قطر $\square\square = ۶$ و $\square\square = ۴$ است و قطرهای منصف یکدیگرند، نتیجه می‌گیریم $\square\square = \square\square = ۲$ و $\square\square = \square\square = ۳$.



از طرفی زاویه حاده بین دو قطر 60° است. پس برای رسم این متوازی‌الاضلاع ابتدا دو خط متقاطع d و d' را با زاویه 60° نسبت به هم رسم می‌کنیم، سپس از نقطه O محل تقاطع این دو قطر، یک بار به شعاع ۲ و بار دیگر به شعاع ۳ ، کمان‌هایی می‌زنیم تا چهار رأس متوازی‌الاضلاع موردنظر مشخص شوند.




۱۸- مطابق شکل مستطیل $\square\square\square\square$ با قطرهای $\square\square = \square\square = ۶$ رسم شده است. چون قطرهای مساوی و منصف یکدیگرند، پس $\square\square = \square\square = \square\square = \square\square = ۳$ خواهد بود.




بنابراین برای رسم این مستطیل، دو خط متقاطع d و d' را در نقطه O رسم کرده و به مرکز O و شعاع ۳ دایره‌ای می‌زنیم تا این دو خط را در نقاط A ، B ، C و D قطع کند. با اتصال این چهار نقطه به هم، مستطیل رسم می‌شود. با این شرایط هم بی‌شمار مستطیل قابل رسم است.

۱۹- مطابق شکل لوزی □□□□ با قطرهای ۳ و ۴ رسم شده است.




می‌دانیم در لوزی قطرهای عمودمنصف یکدیگرند؛ یعنی هم □□ ⊥ □□ و هم نقطه برخورد دو قطر □□ [وسط دو قطر است. بنابراین ابتدا یکی از قطرهای (مثل □□ = ۴) را رسم می‌کنیم. سپس عمودمنصف این قطر را می‌کشیم (خط d) و به مرکز O وسط قطر □□ و به شعاع نصف قطر دیگر یعنی $\frac{3}{2} = \frac{\square\square}{2}$ ، دو کمان (یا یک دایره) می‌زنیم تا این عمودمنصف را در B و D قطع کنند.

۲۰- مطابق شکل لوزی □□□□ با قطر ۶ = □□ و ضلع ۵ = □□ رسم شده است. چون در لوزی قطرهای منصف یکدیگرند، پس در مثل قائم‌الزاویه □□□، طبق قضیه فیثاغورس داریم:




$$\square\square \sqrt{\square\square^2 - \square\square^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} \square 4$$

بنابراین ابتدا قطر □□ به طول $2\square\square = 8$ را رسم می‌کنیم. سپس عمودمنصف این قطر را می‌کشیم و به مرکز O وسط قطر □□ و شعاع ۳ کمانی می‌زنیم تا این عمودمنصف را در B و D قطع کند. چهارضلعی □□□□ لوزی موردنظر است.



۲۱- مطابق شکل ابتدا پاره‌خط □□ را که اندازه‌اش برابر طول قطر مربع است رسم می‌کنیم. □□ = □□ = □□ = □□ = □□ پس □□ = □□ = □□ = □□ زیرا فاصله مرکز تا نقاط روی دایره ثابت است. پس قطرهای منصف هم بوده و اندازه آن‌ها با هم مساوی است، بنابراین چهارضلعی □□□□ یک مربع خواهد بود. محل برخورد این عمودمنصف با پاره‌خط □□ را نقطه M می‌گیریم.



۲۲- **نکته** طول قطر مربع، $\sqrt{2}$ برابر طول ضلع آن است.

برای رسم مربع، باید قطر آن را داشته باشیم. چون ضلع مربع $6\sqrt{2}$ است، پس قطر مربع $12 = 6\sqrt{2} \times \sqrt{2}$ است.

حال ابتدا قطر $\square\square = 12$ را رسم می‌کنیم، سپس عمودمنصف این قطر را می‌کشیم (خط d)؛ سپس به مرکز نقطه M (محل برخورد d و □□) و به شعاع نصف قطر $\frac{12}{2} = 6$ دایره‌ای می‌زنیم تا d را در نقاط C و D قطع کند. چهارضلعی □□□□ مربع است.

۲۳- پاسخ در مثال ۱۵ صفحه ۱۴

۲۴- پاسخ در مثال ۱۶ صفحه ۱۴

